

ڪيرتر جو سفر

ياڻوپهريون

ارضيات، جاگرافي، ثقافتي ماڳ جهنگلي جيوت ۽ نباتات

بدرابڙو



سنڌي ادبي بورڊ

ڪيرٿر جو سفر

(ڀاڱو پهريون)

ارضيات، جاگرافي، ثقافتي ماڳ جهنگلي جيوت ۽ نباتات

ڪيرٿر جو سفر

(ڀاڱو پهريون)

ارضيات، جاگرافي، ثقافتي ماڳ جهنگلي جيوت ۽ نباتات

بدر ابڙو



سنڌي ادبي بورڊ

ڄام شورو، سنڌ

2010ع

ڪتاب جا حق واسطا محفوظ

چاپو پهريون سال 2010ع تعداد هڪ هزار

هن ڪتاب جي ڪنهن به حصي کي، ناشر کان اڳواٽ حاصل ڪيل اجازت کان سواءِ، اليڪٽرانڪ يا ٻئي ڪنهن به طريقي جنهن ۾ اسٽوريج ۽ ريتريول سسٽم شامل آهي، استعمال نٿو ڪري سگهجي.

قيمت. ٽي سؤ رپيا

(Price. Rs: 300-00)

خريداري لاءِ رابطو:

سنڌي ادبي بورڊ ڪتاب گهر

تلڪ ڇاڙهي، حيدرآباد سنڌ

(Ph: 022-2633679, Fax: 022-2771602)

Email: sindhiab@yahoo.com

[www. Sindhiadabiboard.org](http://www.Sindhiadabiboard.org)

هيءُ ڪتاب سنڌي ادبي بورڊ پرتنگ پريس ڄام شوري ۾ انچارج مئنيجر خضر خان وگهڻي ڇپيو ۽ پروفيسر سيد زوار حسين شاهه نقوي، سيڪريٽري سنڌي ادبي بورڊ ان کي پڌرو ڪيو

چيائيندڙ پاران

”ڪيرتر جو سفر“ سنڌيءَ ۾ لکيل واحد ۽ منفرد سفرنامو آهي، جنهن جي پڙهڻ سان نه صرف سڄو ڪيرتر اڪين جي آڏو ڦرڻ لڳي ٿو، پر پڙهندڙ حضرات فاضل ليکڪ سان گڏوگڏ انهن ماڳن ۽ مڪانن کي پنهنجي تصور جي اک سان چٽو پٽو ڏسندا اڳتي وڌندا رهن ٿا.

هن ڪتاب جي ليکڪ بدر ابڙي جو شمار سنڌي ٻوليءَ جي انهن نامور ليکڪن ۾ ٿئي ٿو، جن هميشه هٿن سان نه پر پٿون پيرن سان محسوس ڪري ماڳن مڪانن کي لکيو آهي. سندس هر لفظ ۽ جملو پنهنجي معزز پڙهندڙن سان گڏ ساھ کڻي ٿو. سندس تحقيق ۽ مشاهدي تي ٻڌل هيءُ ڪتاب يقيناً معزز پڙهندڙن کي لطيف احساس سان گڏ اهر جاڻ پڻ ڏئي ٿو.

بدر ابڙو، سنڌ جي انهن چند ڪاهوڙين مان آهي. جيڪي سنڌ جي هر تاريخي ماڳ کي پرکڻ ۽ پڙهڻ ۾ پنهنجي تحرير جو بقا سمجهن ٿا. هن محترم محقق سنڌ جي ڪنڊ ڪنڊ ووڙي آهي ۽ انهن بابت پنهنجا اهر رايا ڏنا آهن. بدر ابڙي صاحب جي تحقيق نج سائنسي بنيادن تي ٻڌل آهي. هو تحقيق ۾ مبالغوي آرائي کان ڪم وٺڻ بجاءِ نج ۽ چٽي راءِ رکي ٿو.

سنڌي ادبي بورڊ جي هميشه کان اها ڪوشش رهي آهي ته هو پنهنجي معزز پڙهندڙن کي سنو ۽ ڄاڻ ڏيندڙ مواد پڙهڻ لاءِ پيش ڪري. اميد آهي ته اسان جا لائق پڙهندڙ هن ڪتاب مان بيحد مفيد ڄاڻ حاصل ڪندا ۽ پنهنجن قيمتي مشورن کان اسان کي ضرور واقف ڪندا، جيئن سندن قيمتي مشورن جي روشنيءَ ۾ اسان بهتر ۽ وڌيڪ ڪم ڪري سگهون.

پروفيسر سيد زوار حسين شاهه نقوي
سيڪريٽري

13- مئي 2010ع
بمطابق 28 جمادي الاول 1431ھ

ستاء

9	 انتساب	
11	 مهاڳ	
17	 ٻه اکر ليکڪ پاران	
19 - 56	 کيرٿر جي ارضياتي تاريخ	*
21	 کيرٿر جو جنم	
21	 کيرٿر ڪوهستان جي جوڙجڪ تي ڪم	
22	 اپکنڊ جو جنم	
23	 سنڌ جي ارضياتي ارتقا	
25	 کيرٿر جي جوڙجڪ	
27	 اپکنڊ	
29	 کيرٿر	
32	 ارضياتي ور، درجيبندي ۽ جوڙجڪ	
32	 جوراسڪ زمانو	
32	 ڪرتيئشس زمانو	
33	 تريشري زمانو	
34	 سنڌ جي جبلن جي جوڙجڪ ۽ ٻيون وصفون	
34	 رني ڪوٽ جوڙجڪ	
36	 لڪي چُن پٿر جوڙجڪ	
37	 ٿيئون جوڙجڪ	
37	 کيرٿر جوڙجڪ	
38	 ناڙي جوڙجڪ	
39	 گاج جوڙجڪ	
40	 منڇر جوڙجڪ	

41	برفاني دور
41	تازي جوڙ جڪ.....
42	کيرٿر ۾ پٿرن جا قسم (ٽيبل)
43	قدرتي وسيلا ۽ معدنيات
43	زلزلن ۽ جوالاڻي سرگرمين جو سلسلو
46	پاڪستان ۾ زلزلن جي تاريخ ۽ انهن جا ارضياتي خطا
48	ارضياتي خلل وارا خطا
48	سندوماڻڙي ۽ پرياسي ۾ سڀ کان وڏا زلزلا.....
54	ثقافتون ۽ تهذيبن.....
55	سندو ۽ سمنڊ
57 - 100	کيرٿر جي جاگرافي
59	کيرٿر جون چوٽيون، لڪ ماڻيون ۽ نئون
59	ونگو لڪ کان گاج تائين.....
71	گورڪ کان لڪيءَ تائين
78	ڪوهستان، نئ بارڻ ۽ ٻيا سرشتا
79	ڪي مختصر سلسلا
82	جبل ۽ پاڻي
83	کيرٿر ۾ پاڻيءَ جا ذخيرا
84	چشمين جي ثقافتي تاريخ
86	گرم چشما
87	کيرٿر ڪوهستان جا چشما (ٽيبل)
90	کيرٿر جون موسمي حالتون
90	گرميءَ جي صورتحال
91	برسات جو مزاج.....
92	هوائون
93	ڪي ٻيا تفصيل.....

93	برسات سبب کاڌا.....	
94	قدرتي وسيلو ٻوٽا ۽ بقا	
97	ڪوهستان ۾ موسمن جو چارٽ.....	
98	کيرٿر ۾ موسمن جو چارٽ	
99	کيرٿر ۾ مختلف نئن جي ڪئچمينٽ	
100	ڪوهستان ۾ مختلف نئن جي ڪئچمينٽ.....	
101 - 156	کيرٿر جي حياتياتي دنيا	*
103	نباتات ۽ جانور	
103	کيرٿر ۾ حياتياتي چڪر	
105	وڻ ۽ ٻوٽا.....	
	کيردار/ماليه جانورن جي دنيا	
112	ماليه	
116	جيتن جي دنيا	
123	پکي	
129	مڇيون	
135	ڪرڙانگ	
139	صحرائي زندگي	
145	ڪوهستان ۾ نباتات	
148	ڪوهستان جي ايراضي	
149	صحرائي معيشت	
150	ٻوٽو پاڻ کي صحرائي حالتن ۾ ڪيئن ٿو بچائي؟	
151	انسان صحرا وڌائي ٿو	
152	ست صحرائي ماحول ۽ جهنگلي جيوت	
154	ماحول جي بحاليءَ لاءِ تجويزون	
157-182	کيرٿر جو ثقافتي سفر	*
159	قديم ثقافتي سفر	

160	 عقیدن جي ارتقا	
162	 ثقافتون ۽ تهذيبون	
163	 کيرٿر ۾ قديم ماڳن جي فهرست - 1	
168	 کيرٿر ۾ قديم ماڳن جي فهرست - 2	
183 - 278	 جهنگلي جيوت (فوٽو گراف)	✽
185	 مماليه	
196	 نابود ٿيل مماليه	
198	 ڪرڙاڻگ	
218	 شڪاري يا ڍونڍ خور	
226	 خشڪي جا عام پکي	
254	 کيرٿر جا جهنگلي جيوت	
260	 آبي پکي	
279 - 296	 نباتات	✽
297	 حوالا	

انتساب

دبليو ٽي بلائفورڊ، ايڇ ٽي لمبرڪ، ايڇ ٽي سورلي
ايم ايڇ پنهور ۽ ٽاچ صحرائي، جي نالي
جن کيرٿر سان عشق ڪيو

ڪيرٿر جي جابلو لوڪن جي نالي
جيڪي کيرٿر جي سخت دنيا ۾ ٻاهري ٻاري وينا آهن.

مهاڳ

اوائلي انسان جون شروعاتي پناه گاهون جبل ۽ غارون رهيون آهن. انهن جابلو گڻائڻ ۾ انسان، پنهنجي ابتدائي ڄمار جا ٽيهه لک سال زميني خطرن ۽ آسماني آفتن کان لڪي گذاريا. غارن جي پراسرار اونداهين ۽ ور وراڪن ۾ هن کي سڪون ۽ سانت جو احساس ٿيندو هو. ان وحشي دور جي انسان جبلن ۽ گڻائڻ ۾ رهي موسمي مصيبتن ۽ خونخوار جانورن سان مقابلي جا گُر ۽ باهه پارڻ جو هنر سکيو.

ماڻهو ڪجهه سمجهه ڀريو ٿيو ته پهاڙن کي اُپ سان مٿو گسائيندڙ ۽ حشمت واري هستي سمجهي، انهن جي چوڻين تي هن کي ڪنهن ڳجهي طاقت جو وجود ۽ ديوتائن جا آستانا نظر آيا. اڄ به مختلف مذهبن ۾ پهاڙن کي وڏي مڃتا آهي. اهڙي طرح دنيا جي هر پنٿ سان ڪونه ڪو پهاڙ ۽ غار منسوب آهي.

هونئن به دنيا جي هر خطي جا ماڻهو، پنهنجي جبلن ۽ ٽڪرن کي ديوتائن جيان ماڻُ ڏيندا آهن. اتان جي جهنگلي جيوت انهن علائقن جي سڃاڻپ هوندي آهي. ساڳي وقت فطرت جي شيدائين جا تفريح توڙي مهر جوئي ڪري انهن پهاڙن تي پيچرا ٺهي ويندا آهن. اسان جي سنڌ جي اولهه ۾ به آسمان کي چُهَندڙ کيرٿر نالي هڪ خوبصورت جابلو سلسلو آهي. پر افسوس جو ڪن سببن ڪري سنڌ جا عام ماڻهو کيرٿر جي انهن دلڪش چوڻين ۽ من موهيندڙ ماڻرين جي سونهن ڏسڻ کان محروم رهيا آهن. اسان جا فقط چند ماڻهوئي اهي پُر پيچ پيچرا پار ڪري ان جابلو ڇت تي پهتا آهن. جتي سرهن ۽ گبن جا ٺينگ ٽپا ڏسڻ سان گڏ اتان جي قدرتي گلن ۽ ولڙين جو واس ورتو آهي.

بدر ابڙو، سنڌ جي آگرين تي ڳڻڻ جيترو ليکڪن مان آهي. جنهن اتر کان وٺي ڏکڻ تائين کيرٿر جون چوٽيون ۽ واديون ووڙيون آهن. هو سنڌ جي چند جنوني محققن، مؤرخن مان آهي، جنهن کيرٿر جي هر شيءِ کي پنهنجي محققانه اک سان ڏٺو آهي. نه ته هن کان اڳ ائين ٿيندو رهيو آهي ته جن ماڻهن کي آثار قديمه سان شوق رهيو آهي، اهي صرف اهي ماڳ ڏسي واپس وريا آهن. جهنگلي جيوت وارن جو واسطو صرف جانورن تائين رهيو. جاگرافي ۽ جيالاجي جي شاگردن به پنهنجي ڪم سان ڪم رکيو. مطلب ته هر هڪ پنهنجي شعبي تائين محدود رهيو آهي. هي پهريون دفعو آهي جو بدر ابڙو ايڏو ڀرپور ۽ وسيع مواد سهيڙي پڙهندڙن جي صدين جي آڇ لائي آهي.

کيرٿر تي تمام ٿورو لکيو ويو آهي. مرزا قليچ بيگ، ايڇ ٽي لئمبرڪ، تاج صحرائي، انور پيرزادو، حاڪم علي شاهه بخاري جو ٿورو گهڻو ڪم نظر اچي ٿو. منهنجي به گذريل ويهن سالن کان کيرٿر سان ياري آهي. پنهنجي حال سارو روه رلا ڪري ڪجهه نه ڪجهه لکندو رهيو آهيان. پر بدر ابڙو هن ڪتاب ۾ کيرٿر جي ديومالائي دنيا کي سنڌ واسين اڳيان هٿ جي لکين جيان کولي رکيو آهي. ان جستجو دوران هن ڪيترائي لک لتاڙيا. انيڪ ڪُنن ۽ چشمن ۾ پير پسايا ۽ هيبتناڪ اونداهين غارن ۾ لٿو آهي.

سنڌ جي سياسي ۽ حڪمرانيءَ جي تاريخ تي گهڻو ڪجهه لکيو ويو آهي. پر سنڌ جي جاگرافي ۽ ارضياتي تاريخ اڃا بانبڙا پائي رهي آهي. ڪو زمانو هو جو سنڌ جي تاريخ کي محمد بن قاسم جي فتح کان شروع ڪيو ويندو هو. پر موهن جي دڙي يا ٻين قديم آثارن جي کوجنائن بعد اسان جي تاريخي سڃاڻپ هزارين سال پوئتي هلي وئي. هاڻي ”کيرٿر جو سفر“ کان پوءِ اسان سيني تي هٿ هڻي پنهنجي تاريخ جي عمر، پٿر جي دور تائين ٻڌائي سگهون ٿا.

اها پڻ حقيقت آهي ته هن کان پهريان سنڌي ۾ کيرٿر جي ارضياتي جوڙجڪ بابت ڪوبه مواد تفصيلي ۽ سولي انداز ۾ لکيل ڪونه آهي. هي ڪتاب اسان کي اڻڪنڊ جي جنم کان وٺي ارضياتي ارتقا جي درجيبندي ۽ جوڙجڪ سان گڏ اهو پڻ ٻڌائي ٿو ته سنڌ وارو علائقو اڳي مها ساگر ٿيٿيس Tethys جي پيٽ ۾ ستو پيو هو. سنڌ جا جبل ان ٿيٿيس سمنڊ جي تري ۾ ڪروڙن سالن جي سامونڊي جيتامڙي مخلوق جي ڪوپن مان ٺهيل آهن. سنڌ ۾ سڀ کان پهريائين چار ارب ستر ڪروڙ سال اڳ ڪارونجهر سمنڊ مان منهن ڪڍيو پڻ ۽ لڪي، بلو جبل ڇهه ڪروڙ ستر لک سال اڳ نروار ٿيا. اهڙي طرح سمنڊ آهستي آهستي پوئتي هٽندو سنڌ جي سرزمين ظاهر ڪندو ويو، جيئن ڏهه هزار ق.م سمنڊ لاڙڪاڻي وٽ هو، ساڍا يارهن هزار سال ق.م اڳ سامونڊي لهرون رک وٽ هيون. ويهه هزار سال ق.م سمنڊ ملتان کي ٻوڙيو بيٺو هو. اهڙي طرح پنجاهه هزار ق.م ڌاري سنڌو درياھ ڪالاباغ وٽ، سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪندو هو.

ڪتاب جي هڪ حصي ۾ کيرٿر جي جاگرافي جو ذڪر اهڙي ته وڻندڙ پيرائي ۾ ڪيو ويو آهي، جو ڄڻ کيرٿر اسان سان هٿ هٿ ۾ ڏيو، پاڻ پنهنجي زندگي جي باري ۾ ڳالهائيندو ٿو هلي. ان سفر دوران هو ٻڌائي ٿو ته اتر کان ڏکڻ ويندي ڪهڙا لڪ لتاڙڻا پوندا، رستي ۾ ڪيتريون ماٿريون اينديون. جبلن جي ڪلهن تان لهندڙ ڪيتريون نئون دڳ جهلينديون. ٿڪ ڀڄڻ لاءِ ڪٿي پيئڻ لاءِ پاڻي ملندو. ان سفر جي خاص ڳالهه کيرٿر ۽ ڪوهستان جي چشمن جو تفصيلي احوال آهي. جنهن ۾ چشمن جي بيهڪ، پاڻي جو ذائقو، پاڻياٺ ۾ لوڻياٺ جي موجودگي، چشما في سيڪنڊ ڪيترا لٽر پاڻي ڏين ٿا. ان کان اڳ ڪنهن به سيلاني ان جابلو سلسلي جو اهڙو پيرائتو سير نه ڪرايو آهي.

”کيرٿر جو سفر“ ۾ موسمن جي تبديلي جو ذڪر به انگن اکرن ۾ ڏنو ويو آهي. هت گهٽ ۾ گهٽ، وڌ ۾ وڌ سراسري گرمي ڪيتري

ني پئي. گهر، برسات، ماڪ ۽ بخارات ڪيئن هن صحرا کي جيئرو رکيو بيٺا آهن. کيرتر ۽ سج جي پاڻ ۾ ڪيتري دوستي آهي. هن چوماسي هوائن جو نه پهچڻ جو وڏو سبب اهو آهي ته هي جابلو سلسلو ايڏو بلند نه آهي، جو هو چوماسي جي گهمن گهور گهٽائڻ کي روڪي سگهن.

اسان جو کيرتر ۽ ڪاڇو دنيا جي ڪيترن صحرائن جيان مردار صحرا نه آهي. ان ۾ ڀرپور زندگي آهي. ليڪڪ هت فوٽن سان گڏ، پيدا ٿيندڙ جانور، جيت، پکي، مڇيون، ڪرڙاڻگ، نباتات جو احوال ڏنو آهي. سوڪهڙي ۾ ڪيترا ٻوٽا ختم ٿيو وڃن، پر ڦوهار جي موسم ۾ هڪ ڦڙي سان وري جيئرا ٿي وڃن ٿا. جن ۾ ديوي جو وڻ به شامل آهي. اڳ ديوي کي اسان مان ڪيترا مقامي وڻ سمجهندا هيا، پر هاڻي خبر پئي ته اهو آمريڪا مان ڪجهه سال اڳ آئي هت پوکيو ويو آهي.

بدر ابڙو، کيرتر کي ماحول جي حوالي سان مکيه ستن حصن ۾ ورهائي ان علائقي جي زميني خاصيتن سان گڏ ان حصي ۾ پيدا ٿيندڙ نباتات ۽ حيوانات جي باري ۾ سولي نموني سمجهايو آهي. هو جتي ماحوليات جي بربادي تي هڪ ماحوليات دوست جي حيثيت ۾ ڳوڙها ڳاڙي ٿو، اتي ماحوليات جي بحالي لاءِ تجويزون پڻ ڏئي ٿو.

کيرتر جي ثقافتي سفر جو ذڪر ڪندي بدر لکي ٿو ته ٻارهن هزار سال اڳ سمنڊ اتر سنڌ کان پوئتي پير پائڻ شروع ڪيو. ميسوليٿڪ دور ۾ سنڌ جو ماڻهو شڪاري هو. ثبوت ۾ جهرڪن وٽ پٿر جي وچين دور جو ماڳ ملي ٿو. اڳتي هلي سنڌ جي ماڻهن خوراڪ جمع ڪرڻ جا طريقا سکيا. اهڙي طرح 3700 ق.م ڌاري هنن گڏه، ريون، ٻڪريون پالڻ شروع ڪيون. ساڳي وقت ڪڇن ۽ اوڏڪن گهرن ۾ رهڻ دوران هت سان ٺهيل مٽي جا ٿانو استعمال ڪرڻ لڳا.

سنڌي ماڻهن جي مذهبي اوسر جو ذڪر هن انداز سان ڪيو ويو آهي، هتان جي ماڻهن پوڄا جي ابتدا پاڻي ۽ پاڻي سان منسوب

ديوتائن سان ڪئي. زمين مان ڦٽندڙ ٻوٽن کي ڏسي کيس ”ڌرتي ماما“ جي روپ ۾ به پوڄيو. ائين ئي چشمن ڪناري سنڌ جو شروعاتي زرعي سماج اُسرِيو.

بدر ابڙو کيرٿر جا وڻ واهيرا، واٽون، ٽونڪ، اڌڪڙ لتاڙي جيڪي قديم ماڳ ڏنا يا کيس پنهنجي تجربي مطابق محسوس ٿيا، هن ان ماڳن جي جاگرافيائي بيهڪ، مائري ۽ علائقي جي نشاندهي ڪئي آهي. جيئن ڪوبه محقق وڌيڪ ڪم ڪرڻ چاهي ته انهن هنڌن تي سولائي سان پهچي سگهي، سچ پچ کيرٿر جي قديم آثارن جي ايڏي وڏي لسٽ اڳ ڪنهن به نه ڏني آهي ۽ نه ئي ڪڏهن ڪو ڄاڻو اتي پهچي سگهيو آهي.

هن ڪتاب جي خصوصيت اها آهي جو روايتي قصن، ڪهاڻين ۽ ڏندڪٿائن کي ڇڏي، جديد تقاضائي ۽ سائنسي انداز ۾ لکيو ويو آهي. ساڳي وقت پڙهندڙن کي سولي ۽ عام فھر ٻولي ۾ سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. جنهن ۾ ڪتابي ڳالهيون گهٽ پر ليکڪ جو ذاتي مشاهدو گهڻو آهي. بدر ابڙو جو هي پورهيو سنڌ سان عشق جو چڻو ثبوت آهي هن اهي ڪشالا هڙان، وڙان ۽ ذاتي دوستن جي مهربانين سان ڪڏهن پنڌ ته ڪڏهن اُنن جي پٺاڙن تي ڪيا آهن.

بهرحال بدر ابڙو جي هن ڪتاب کان پوءِ سنڌ جي تاريخ کي هڪ نئون موڙ ملي ويندو. ساڳي وقت هڪ نئين بحث جو بنياد پوندو. اميد ته ”کيرٿر جو سفر“ پڙهڻ بعد دوستن کي سنڌ جي ٻين وساريل ۽ ويسارجي ويل ماڳن مڪانن تي لکڻ لاءِ حوصلو ملندو.

اشتياق انصاري

آچيندي لڄ مران



هيءُ ڪيرٿر جي سفر جو تعارفي ڪتاب آهي، جنهن ۾ ڪيرٿر جو پنهنجو ارضياتي سفر، جاگرافيائي حالتون، حياتياتي دنيا ۽ حياتياتي سفر، ڪجهه تفصيل سان پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي اٿر. هن جابلو سلسلي ۾ هزارن جي تعداد ۾ انساني ثقافتي اوسر جا ماڳ آهن، جهنگلي جيوت جون اڍائي سؤ کن جنسون ۽ ٻوٽن جا مکيه قسم پڻ آهن، اهي يڪجا ڪرڻ جو جتن ڪيو اٿر.

منهنجي ڪوشش آهي ته ’ڪيرٿر جو سفر‘ سلسلي جا ٻيا ڪتاب به جلد ئي پڙهندڙن کي ڏيئي پنهنجي ذميواري پوري ڪري ڇڏيان. هن ڪتاب ۾ ڏنل سڀ موضوع ڳوڙهي سائنسي معلومات تي ٻڌل آهن. سچ پچو ته هتي بحث ڪيل سمورن موضوعن تي واسطيدار شعبن جا ماهر قلم کڻن ها ته وڌيڪ بهتر هو. مون پنهنجي طور هنن موضوعن جي لڳ ڀڳ 15 سالن جي ناڪافي عرصي ۾ مطالعو ڪيو، سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي، اهي ماڳ اکين سان ڏسي پوءِ قلمبند ڪيا. سچ پچ ته ڪيرٿر جي سفرن سبب مون کي ارضيات، جاگرافي ۽ صحرائي حيات جو چڱو مشاهدو ٿيو، جيڪو شايد فقط لائبريرين ۾ ويهي سمجهڻ مشڪل هو. هن ڪتاب جا سڀ باب جيئن ته ڳوڙهي سائنس جو حصو آهن، ۽ انهن شعبي جا اصطلاح اسان وٽ اڃا تائين جوڙيا ئي نه ويا آهن،

انڪري پنهنجي طرفان پوري ڪوشش ڪئي اٿر ته عام رواجي ٻوليءَ ۾ پڙهندڙن کي سمجھائجي.

آءُ سنڌي ادبي بورڊ جو ٿورائٽو آهيان، جنهن هي ڪتاب ڇاپيو ۽ مون کي وڌيڪ لکڻ جو اُتساه ڏنو. آءُ انهن سڀني عالمن، دوستن، ريڊارن، پڪرارن ۽ اوارن جو ٿورائٽو آهيان جن ڪيرٿر جي ڍورين، نڪن، چوڻين ۽ لکن تائين منهنجي رهنمائي ڪئي، جنهن سبب آءُ هيءُ معلومات سنڌ واسين تائين پهچائي سگهيس.

ڄاڻان ٿو ته آءُ ڪجهه به نه ٿو ڄاڻان، انڪري پيار جو هي پورهيو آڇيندي لڄ ٿي اچيم، شال قبول پوي!

سنڌي ٻوليءَ جو ادبي ڪارڪن


بدر ابڙو

ارضيياتي تاريخ

کیرتر جو جنم

سنڌ ڪوهستان جي جوڙجڪ تي ڪم

سنڌ جي ارضيات تي سائنسي بنيادن تي سڀ کان پهريون ڪم شايد ڊبليو ٽي بلائفورد (The Geology of Western Sind: W.T. Blanford) ڪيو آهي. ماڻڪ پٽالا صاحب جو ڪم 1959 ۾ پڌرو ٿيو جنهن بلائفورد جي




ڪم مان ڪافي لاپ ورتو. ان کان پوءِ ايڇ ٽي لئمبرڪ صاحب جو ڪتاب 1964 ۾ پڌرو ٿيو جنهن پنهنجي ڪتاب ۾ اقرار ڪيو ته هن سنڌ جي ارضيات بابت اڪثر مواد بلائفورد تان ورتو آهي. ايڇ ٽي سورلي صاحب جو ڪم (سنڌ گزيٽيئر) 1968ع ڌاري پڌرو ٿيو جناب ايم. ايڇ. پنهور صاحب

جو ڪم به ساڳي طرح مدد ورتل آهي ۽ ان ۾ ڪي نوان ذاتي مشاهدا به شامل ڪيا آهن. پر هاڻي تيل گئس ۽ ٻي معدنيات ڳولڻ جي مرحلي دوران سنڌ جي ارضيات تي چڱو خاصو ڪم ٿيو آهي، جيڪو اڃا تائين عام پڙهندڙن تائين نه پهتو آهي. ٻيو ته سنڌي ٻوليءَ ۾ سنڌ جي ارضيات بابت ڪوبه خاص مواد نه ٿو ملي. ترجمي جي صورت ۾ آيل مواد اطمینان بخش نه آهي، ڇو ته ارضياتي سائنسي اصطلاحن جا سنڌيءَ ۾ سولا متبادل ڪونه آهن. ان کان سواءِ جن ماڻهن مواد ترجمو ڪيو آهي اهي نه ته جيالاجيءَ کان واقف آهن ۽ نه وري انهن کي سنڌ جي ماڳن جي بيهڪ ۽ نالن سان آشنائي آهي. انڪري ترجمي جي صورت ۾ آيل مواد رهنمائيءَ کان وڌيڪ مونجهارا پيدا ڪرڻ لڳو آهي. هتي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته مٿين صاحبن جي پورهئي کي ڪي قدر سولو، درست ۽ عام فہم ڪجي.

اُپکنڊ جو جنم:

اتڪل 220 ملين (22 ڪروڙ) سال اڳ ٽرائاسڪ (Triassic era) عرصي ۾ مها کنڊ پين-گائيا (Pangaea) ۾ ڌار پوڻ لڳا ۽ اهو کنڊ ڪنڊ ٿي ڇڄڻ لڳو. جيئن ئي اتر آفريڪا ۽ اولهه يوريشيا وارو ڌار پيو. اوائلي مها ساگر ٽيٿيس (Tethys) سمنڊ ان وٽيءَ ۾ ڪاهي پيو. ان عرصي تائين ڌرتيءَ تي ڊائنوسار ۽ ابتدائي مماله اڳ ئي ظاهر ٿي چڪا هئا، جن جو انهن کنڊن تي راج هو. زمين تي بي گل ڦڙهي ٻوٽا ۽ گجي نما نباتات هئي. ٽرائاسڪ عرصي جي وچ ڌاري پولوي / بن مانس نما مخلوق (primitives) پيدا ٿيڻ شروع ٿي وئي هئي.

136 ملين (13 ڪروڙ سٺ لک) سال اڳ جڏهن جوراسڪ (Jurassic) زمانو پورو ٿيو ۽ ڪريٽيئشس زمانو شروع ٿيو. تڏهن مها کنڊ پوريءَ طرح ٽڪر ٽڪر ٿي چڪو هو. فقط ٻه وڏا ڀاڱا اتر آميرڪا ۽ يوريشيا هڪٻئي کان پوريءَ طرح نه ڇڳا هئا، ۽ ساڳي طرح ڏکڻ آميرڪا واري زمين اولهه آفريڪا کان ڇڄي رهي هئي. ڊائنوسار اڃا به زمين تي راج ڪندا



هئا. ڪريٽيشس جي پڇاڙيءَ تائين اهي به ناس ٿي ويا. ڪريٽيشس جي وچ ڌاري گُلداز ٻوٽا ظاهر ٿي چڪا هئا ۽ انهن زمين تي وڏن شروع ڪيو هو پر ان وقت تائين اُپکنڊ ٽيٿيس (Tethys) سمنڊ ۾ هڪ تمام وڏي ٻيٽ وانگر باقي سڄي دنيا کان ڪٽيل هو.

سند جي ارضياتي ارتقاء:

دنيا جي ڪنهن به حصي وانگر سند جي جبلن جي اوسر اوجھي ڪونه

ٿي آهي، پر ان جي به هڪ ارتقائي ڪهاڻي آهي:

1- 193 ملين کان 136 ملين سال اڳ (19,30,00,000 کان 13,60,00,000 سال اڳ) جوراسڪ زمانو ۽ ان کان اڳ وارو وقت آهي. ان وقت، سنڌ ان جاءِ تي موجود ڪونه هئي، جتي هاڻي آهي. ان زماني ۾ فقط اهي ٽڪريون سطح زمين تي ظاهر هيون جن کي اسان 'ڪارونجهر' سڏيون ٿا. ڪارونجهر جبل ڪئمبرين زماني کان به اڳ واري دور ۾ اُڀريو جڏهن ڌرتيءَ تي زندگيءَ جي ڪابه شڪل موجود ڪونه هئي. ڪارونجهر جي عمر 470 ملين سال (4-ارب 70 ڪروڙ سال) ٿي سگهي ٿي.

2- 136 ملين سال کان 67 ملين سال (13 ڪروڙ سٺ لک سال اڳ کان 6 ڪروڙ 70 لک سال اڳ تائين) اڳ تائين ڪريٽيشس زمانو (Cretaceous period): هن دور ۾ سنڌ جي اولهه وارين سرحدن پاسي لس ٻيلي ضلعي ۾ ٻٻ جابلو سلسلو جيڪو ڪريٽيشس زماني جي پڇاڙيءَ سان تعلق رکي ٿو ظاهر ٿيو ان جون ڪي پاڇاڻيون ٽڪريون هاڻوڪي لڪي-بدي جابلو سلسلي ۾ به اُڀريون.

3- 67 ملين سال اڳ کان 48 ملين سال اڳ تائين: پئليوسين عهد (Paleocene epoch) سنڌ ۾ هاڻوڪي لڪي جابلو سلسلي جي ابتدا خاص ڪري رني ڪوٽ جوڙجڪ جو دور آهي. ان گروپ جا ٻيا جبل هاڻوڪي کيرٿر جي ڏاڙهياري واري پاسي، خضدار لس ٻيلي ضلعي ۽ حب جي پرياسي ۾ اُڀريا. لڪي سلسلي ۾ موجود وڻن جا پنڊ پھڻ ۽ مانجهند لاکڙا ڪوئلي جا ذخيرا ان ئي دور جون نشانين آهن.

4- 48 ملين سال اڳ کان 38 ملين سال اڳ تائين: ايوسين عهد (Eocene epoch): هن سلسلي جو مکيه اُڀار (39-47 ملين سال اڳ) لڪي وارو آهي ۽ (39-37 ملين سال اڳ) ٽيون (Tiyon) سلسلو آهي ۽ بدو کيرٿر به ظاهر ڏسجي ٿو ان سلسلي جا ٽو پڪڙ جبل حب ۽ کيرٿر

جي اتر اولھ ۾ ڏسجن ٿا. هن ئي دور ۾ روھڙي ڪوٽڊجيءَ وارا جبل پٽڙا ٿيا.

5- 38 ملين سال اڳ کان 26 ملين سال اڳ تائين: اوليگوسين عھد (Oligocene epoch) هن دور ۾ مکيه کيرٿر (33-36 ملين) ۽ ناڙي (18.5-33 ملين) سلسلا وجود ۾ آيا ۽ ارضياتي تاريخ ۾ انهن کي کيرٿر-نري جوڙجڪ جو نالو ڏنو ويو.

6- 26 ملين سال اڳ کان 7 ملين سال اڳ تائين: مايوسين عھد (Miocene epoch) ۾ نري-گاج سلسلا ظاهر ٿيا. انهن ۾ ناڙي سلسلو 18.5-27 ۽ گاج سلسلو 12-18.5 ملين سال تي مشتمل آهي.

7- 7 ملين سال اڳ کان 2 ملين سال اڳ تائين: پلايوسين عھد (Pliocene epoch) هن دور کي منچر جوڙجڪ جي ارضياتي سڃاڻپ حاصل آهي. هن دور جون ٽڪريون کيرٿر جي اوڀر واري وٽ ۽ لڪيءَ جي ڀر پاسي ۾ گنجي ٽڪر تائين ڏسجن ٿيون. ان جوڙجڪ جو سلسلو هاڙهي جبل واري وٽ سان پڻ ڏسجي ٿو.

8- ملين سال اڳ کان تازو زمانو: پلاسٽسين عھد (Pleistocene epoch) هن کي تازو زمانو به چون ٿا، جنهن ۾ اول ٿر جي ڪجهه پراڻي ۽ پوءِ ميداني علائقن جي تازي جوڙجڪ شامل آهي.

کيرٿر جي جوڙجڪ:

اتر ڏانهن مسلسل حرڪت ۽ دٻاءُ سبب جڏهن اپکنڊ يوريشيائي پليٽ / کنڊ سان اچي لڳو تڏهن ان پڪوڙ سبب کيرٿر هماليه، ڪيلاش هندو ڪش ۽ سليمان جبل وغيره جا سلسلا اُڀري آيا. يوريشيائي ڌرتي ۽ اپکنڊ جو هي ٽڪراءُ تريشري زماني جي وچ واري عرصي ۾ اٽڪل ٽيهه ملين (3 ڪروڙ) سال اڳ شروع ٿيو ۽ ان ٽڪراءُ سبب مکيه جبل پلايو پلاسٽسين (Plio-Pleistocene) وقت ۾ (5 ملين سال اڳ کان اڄ تائين) ٺهڻ جو سلسلو شروع ٿيو.

کیرٿر ۾ سڀ کان پراڻيون ٽڪريون ٽرائسڪ ۽ جوراسڪ زمانن جون آهن. اهي ٽڪريون يا ڌرتيءَ جا ٽهه ان وقت جا آهن جڏهن هي اڳڪٿو مڊاگاسڪر جي ڏکڻ ۾ آفريڪا جي هيٺئين ڀاڱي سان ڳنڍيل هو. اهي ٽڪريون اونهي سمنڊ جي سڀين ڪوڏن سان سڦيل آهن، جيڪي ابتدائي ڪريٽيشس (early Cretaceous) جي Goru ۽ Sembar جوڙجڪ جا آهن. ان ئي نامياتي مادي زميني دور جي وقفن دوران گرمائش کاڌي، ۽ تيل ۽ گئس بڻجي ويا. هي اهو ئي نامياتي مادو آهي جيڪو کيرٿر ۽ سليمان جبل مان يا سنڌ جي ميداني علائقي مان تيل ۽ گئس جي صورت ۾ ملي ٿو.

نيٺ اها خاص جوڙجڪ ڇو ۽ ڪيئن ٿي؟ ٿيو ايئن ته اونهي سمنڊ ۾ ڇن پٿر، ريتيلو پٿر ۽ سڀي-ڪوڏ حيات هڪٻئي مٿان تهجي ويا. اونهي سمنڊ جو ڪريٽيشس ٽهه پٿر جبل فارميشن جي ساحلي علائقن ۽ تانگهي سمنڊ تائين ڊيلٽائي ريتيلي پٿر هينان ڍڪيل آهي، جيڪو ڪريٽيشس وقت جي پڇاڙيءَ ۾ ڪٺو ٿيو هو. انڪري پٿر جو ڇن پٿر گئس جي ذخيري طور تمام اهم سمجهيو وڃي ٿو گذريل ويهارو سالن ۾ يا شايد ان کان به اڳ کان سنڌ ۾ تيل ۽ گئس جي ڳولا جو سلسلو ڪافي پئماني تي هليو ۽ هن وقت تائين سنڌ جا ميدان، کيرٿر ۽ پٿر جبل ڪافي اهميت وٺي چڪا آهن. مختلف تيل ڪمپنيون هنڌ هنڌ ڪوهه کوٽي تيل گئس ڪيڊ ڪي لڳي ويون آهن. سن 2002ع تائين ٿيل دريافتن مطابق انهن گئس فيلڊن مان فقط ٻن ۾ جدا جدا هڪ ٽرلين ڪيويڪ فٽ گئس آهي.

پٿر ريتيلو پٿر پيليوسين (Palaeocene) ڄمار جي رني ڪوٽ جابلو جوڙجڪ جي سڀي-ڪوڏ حيات سان سٿيل آهي ۽ ڊيلٽائي حالتن ۾ جمع ٿيو آهي. ان فارميشن جو نمونو رني ڪوٽ جابلو ڪٽاءُ مان ظاهر ٿيو آهي. خود رني ڪوٽ فارميشن لڪي فارميشن جي تانگهي سامونڊي ڇن-پٿر، غازي فارميشن ۽ کيرٿر فارميشن سان سٿيل آهي، جيڪي ايوسين (Eocene) وقتن ۾ ٺهيا. هيءُ کيرٿر جي تانگهي سامونڊي ڪنڌيءَ جو ٿلهو ڇن پٿر آهي، جيڪو کيرٿر جي اوڀر وارن ورن ۾ ڪيئي مکيه اُتر ڏکڻ


جابلو سلسلن تي مشتمل آهي. ان کان اولهه ۾ کيرٿر جو چُن-پٿر چُن ۾ شاهوڪار مٽيءَ جي صورت ۾ موجود آهي، جيڪو سامونڊي حيات جي محفوظ پنڊ پهڻن سان ڀريل آهي. اهي پنڊ پهڻ پيٽ پيري (سڀ-ڪوڏ درجي جي) مخلوق (gastropods) جا آهن. ان قسم جا پنڊ پهڻي مٽي-پٿري ته ڪراچيءَ جي بازارين ۾ آرائشي مقصدن لاءِ استعمال پيا ٿين.

کيرٿر جو نانگهو سمنڊ سڀ - ڪوڏ مخلوق سان سٿيل هو، جيڪو ناڙي-گاج ۽ منڇر فارميشن سان تعلق رکي ٿو. اها مخلوقات اوليگوسين ۽ مايوسين وقتن ۾ گڏ ٿي ۽ اها مکيه طور تي هماليه جبل جي اُتر ڏانهن دٻاءُ ۽ اُڀار مان اخذ ٿيل آهي.

غير سامونڊي جابلو سٽا (clastics) (پراڻن جبلن مان ڀريل ۽ ڇڄل حصن مان ٺهيل ٽڪريون) شوالڪ گروپ سان تعلق رکي ٿي. اهڙي سامونڊي سٽا (clastic) سان ڀريل تهه پلايوسين ۽ پلاسٽسين وقتن (Times) ۾ ٺهيا ۽ اهي اولهه ۾ اڀرندڙ کيرٿر جي کاڌ مان جُڙيا. کيرٿر جو اُڀار نسبتي طرح هماليه کان ننڍو آهي ۽ ان جي ڄمار به ڪا گهڻي ڪونه آهي، ان حد تائين جو کيرٿر جي پاسرائين تي اُڀين ڪُنڊن وٽ ريتائون ڪُڪرو يا بَجري ڏسجي ٿي.

اُپکنڊ:

. اٽڪل 70 ملين (7 ڪروڙ) سال اڳ کيرٿر وارو علائقو ٽيٽيس



(Tethys) مها ساگر هيٺ هو. ڏکڻ کان ڇڄي آيل ان زمين جي ٽڪراءَ سبب جيئن ته زمين مٿي اڀرڻ لڳي. سمند پوئتي هٽندو ويو جنهن ڪري هڪ وڏو گهٽجدار خطو ٺهيو. جنهن کي اسان هاڻي عظيم جابلو سلسلو چئون ٿا. انهن جبلن ۾ اولهه - اوڀر رخ ۾ اڀريل طرف ننڍي ڄمار جا سلسلا آهن. جن کي اسان سليمان ۽ کيرٿر چئون ٿا. سنڌ ۾ کيرٿر جي علائقي ۾ شهدادڪوٽ - قنبر دادو ۽ ڄامشورو ضلعا اچن ٿا. اهو خطو پنهنجي وجود ۾ انڪري مختلف آهي جو اهو سڄي دنيا ۾ واحد علائقو آهي جتي حيوانيائي لحاظ کان تي جاگرافيائي (zoogeographic) خطا هڪٻئي سان وڃڻ ٿا.

ارضياتي نظريي موجب، ٽيڪٽونڪس (tectonics) پليٽ، ڌرتيءَ جي سطح جو تهه وصال ڪنڊن ۽ مها ساگري (oceanic) پليٽن تي جڙيل آهي. اهي مسلسل حرڪت ۾ آهن. اهي هروقت هڪٻئي کي ڌڪڻ ۽ رڳڻ جي عمل ۾ مصروف آهن. اها حرڪت هر سال بظاهر ٿوري پئماني تي هوندي آهي. يوريشيائي ڪنڊ جي پليٽ سڀ کان وڏي آهي. ان ۾ دنيا جا ڪي سڀ کان قديم پهاڙ موجود آهن. جيڪي ڪئمبرين وقت کان اڳ (Precambrian time) (4.65 ارب کان 5.70 ارب سال) ۾ پيدا ٿيا. اهي قديم پهاڙ اڄ به اوڀر سائيبيريا، سڄي عربي اُپٻيٽ ۽ هندستان ۾ سنڌو ۽ گنگا ندين جي ڏکڻ ۾ ڏسي سگهجن ٿا.


مها ساگر ٽيٿيس (Tethys) 570 ملين کان 65 ملين سال اڳ پيليوزوئڪ ۽ ميسوزوئڪ عرصن دوران يوريشيا جي اڪثر حصن تي ڦريل هو. ان زماني ۾ سمند جي تري ۾ لٽ جا ٿلها تهه ٺهندا ويا. ان ريت ٽڪرين جا اهڙا تهه بڻجي ويا جن سان هاڻوڪي ارضياتي صورت ٺهي پئي.

اڳڪٿ، آفريڪا جي ڏکڻ واري ڪنڊ کان ڪريٽيشس زماني ۾ ڇڳو ڇڄڻ کان پوءِ ان اُتر اوڀر طرف سرڪڻ شروع ڪيو ۽ ان سفر دوران 45 ڊگرين جو زاوڻو ڦيرائي وڃي يوريشيائي پليٽ سان ان جي هيٺئين اندرئين

حصي ۾ لڳو ۽ ان ۾ اندر سرڪندو هليو ويو ان سبب هماليه ۽ گنگا جون ماڻيون ٺهيون. ان ٽڪراءَ جو يوريشيائي ڏاکڻي ڪنڌيءَ طرف به زبردست دٻاءُ هو. جنهن ڪري علامتي ۾ گهٽج پيدا ٿيا، وچ واري زمين مٿي اُڀرڻ لڳي ۽ دنيا جو عظيم جابلو نظام هماليه نروار ٿيو زمين جي اندروني ۽ هوريان هوريان حرڪت اڃا به جاري آهي جنهن سان لوڏا، جوالائي سرگرمي ۽ زلزلا ايندا رهيا آهن.

کيرٿر:

سنڌ جي اولهندي سرحد وارن سمورن ننڍن وڏن جابلو سلسلن کي ٿلهي ليکي کيرٿر ۾ شامل ڪيو وڃي ٿو. پر ارضياتي پٿراني تي انهن جي ڄمار، جوڙجڪ ۽ بيهڪ مختلف آهي. جيتوڻيڪ اهي جبل تريشري زماني ۾ ٺهيا ته به انهن ۾ سڀ کان قديم رني ڪوٽ ۽ لڪي سلسلو



آهي. رني ڪوٽ جوڙجڪ پئليوسين Paleocene زماني جي آهي يعني 48-62 ملين سال اڳ. اهو سَنَ، مانجهند ۽ ٻڍپور کان اٽڪل ٽيهه ڪلوميٽر اولهه ۾ وڻن جي پنڊپهڻن سان ڀريل خطو آهي. لڪي چُن پٿر جوڙجڪ

وارو سلسلو لکيءَ کان جهمپير تائين پکڙيل آهي ۽ اهو ايو سين زماني (Eocene period) 39-47 ملين سال اڳ جو آهي. (ان علائقي ۾ ساڳيا رنيڪوٽ جي علائقي جهڙا پند پھڻ ملن ٿا، سواءِ هڏدار مڇي ۽ پکين جي). لکي جبل جي علائقي ۾ مماليه ۽ ڪرڙانگ (reptiles) ڪافي هئا ۽ اهي ارتقائي طور ڪافي اڳتي وڌي چڪا هئا. مون ذاتي طور تي ڪنهن هنڌ ڊائنوٿيريم (Deinotherium) جو مڪمل ڍانچو ڏٺو آهي جيڪو مايوسين زماني جو مماليه (اڄوڪي هاڻي ۽ برفاني دور جي ميموٿ جو پڙ ڏاڏو) هو. اهو بلوچي ٿيريم جو همعصر ۽ قد ۾ 14 فٽ اوچو هاڻي هو، جنهنجا سامهون وارا ڏند هيٺئين پاسي وريل هوندا هئا. لکي جبل مان واڳون ۽ ڪوئي جون هڏيون به مليون آهن. هنن ٽڪرين ۾ ڪي اهڙا هنڌ به آهن جتي قديم جانورن جا پند پھڻ ٿيل ڍانچا پکڙيا پيا آهن. ان علائقي کي پند پھڻي ميدان چوڻ ۾ ڪوبه وڌاءُ ڪونه آهي. اهي ٽو پکڙ ڍانچا تجويز ڪن ٿا ته اهي جانور ڪنهن اوچتي آفت سبب مئا ۽ جيڪو جتي هو اتي دفن ۽ پند پھڻ ٿي ويو. لکي سلسلي جي هڪ خاص ارضياتي خاصيت اها به آهي ته ان ۾ جُولائي سرگرميءَ جون ثابتيون موجود آهن.

کيرٿر جو مکيه ڪرنگهو اوليگوسين جي پڇاڙڪي ۽ ايو سين زماني ۾ 33-36 ملين (لڳ ڀڳ ساڍا ٽي ڪروڙ) سال اڳ ظاهر ٿيو. هي لٽ دار ٽڪريون (sedimentary rocks) آهن. دادر ۽ قنبر ضلعن جي انهن سلسلن ۾ جن کي عام طور کيرٿر چئجي ٿو، سمورا پنج سلسلا لکي، کيرٿر، ٿري، گاج ۽ منچر اچي وڃن ٿا. انهن ٽڪرين جي (تشانگي کان گورک ۽ اڃا به ڏکڻ تائين) مکيه ڪرنگهي کان اوڀر طرف ارضياتي جوڙجڪ ڪجهه هن ريت آهي:

1- اوائلي اوليگوسين ۽ ايو سين لٽ دار پهاڙ.

2- مايوسين لٽ دار ٽڪريون.

3- پلايوسين ۽ مايوسين لٽ دار ٽڪريون.

4- پلاسٽيسين لٽ دار ٽڪريون.

5- ساڪڙ ماٿرائين سٽ (Piedmont deposits)


هن علائقي ۾ کيرٿر جي سراسري اُچائي 5000 فٽ آهي. جيڪا سنڌ کي اولهه واري سرحد کان هڪ قدرتي حفاظتي ديوار مهيا ڪري ٿي. ان ۾ ڪي خاص ٽَڪَ ان جا دروازا بڻجن ٿا.

پلاسٽيسين دور (600,000 ق م کان 10,000 ق م تائين) ارضياتي طرح برفاني (glacial) ۽ گرم دورن ۾ ورهايل آهي. چوٿين برفاني دور (19,000-120,000 ق. م) دوران آسٽرالوپٿيڪس ۽ (آخري پلاسٽيسين دور ۾) پٿيڪن ٿروپس (انسان نما نسل) موجود هئا. ان سلسلي ۾ کيرٿر سميت ڏکڻ ايشيا ۾ ڪم نه ٿيو آهي.

اسان ان مرحلي تي نظر وجهي چڪا آهيون ته سنڌ ٿيٿيس (Tethys) سمنڊ هيٺان ٻڌل هئي، انڪري ان جي زميني تاريخ مختصر آهي. سنڌ ۽ گنگا ماڻيون ان مهل جايون جڏهن هماليه ٺهيو ۽ ان جي لٽ انهن ماڻين کي مٽي ۽ ٻي جابلو سٽ سان ڀريو ۽ سٽي ڇڏيو. اڪثر جيالاجست ان راءِ جا آهن ته سنڌو ندي ان وقت به وهندي هئي، جڏهن هاڻوڪي سنڌ تي اوائلي سمنڊ وريل هو. ٻئي پاسي، اهو زمين جي اندروني حرڪت سبب زمين جو اُتر طرف دٻاءُ، اُڀار ۽ درياهي لٽ جو جمع ٿيڻ ٿي آهي جو گنگا ۽ سنڌو ماڻيون ٺهيون.

سنڌ جا جبل به ان ٿيٿيس سمنڊ جي تري ۾ ڪروڙن سالن تائين جمع ٿيل سامونڊي مخلوق جي کوين مان ٺهيا آهن. اها جيتامڙي مخلوق تيرشري زماني ۾ ٿيٿيس سمنڊ ۾ جامر هئي. هندستان جو مرڪزي حصو ته ان وقت به خشڪ زمين هئي، جڏهن اهو مها کنڊ کان ڇڳو هو. يعني، سنڌ وارو سڄو خطو ابتدا ۾ ان ڇڳل اُڀڪنڊ جي سامونڊي حدن ۾ ٻڌل هو. ڇڳڻ کان پوءِ اتر طرف اُڀڪنڊ جي ڊگهي سفر دوران ان جي هڪ خاص چُرير ۽ مخصوص رُخ ۾ دٻاءُ هو انڪري، سمنڊ جي تري ۾ کوين سان سٿيل تَهَ ان خاص پڪوڙ سبب اوڀر اولهه رُخ ۾ لڙيل ۽ اُڀريل هئا ۽ سنڌ جي سرحد وٽ اولهه پاسي دٻاءُ سبب انهن جا چُڻ يا سلسلا اُتر-ڏکڻ ڊيگهه ۾ پڪڙيا.

سنڌ جي جبلن ۽ ٽڪرن جا ارضياتي وڙ ، درحیبندي ۽ جوڙجڪ
جوراسڪ زمانو:




ميسوزوئڪ عرصي جو حصو

آهي. جيڪو 195 کان 140 ملين سال اڳ هو جنهن ۾ نه رڳو ڊائنوسار موجود هئا پر ابتدائي گلداز ٻوٽا ۽ شروعاتي پکي به ظاهر ٿي چڪا هئا. ان دور ۾ گج يورپ ۽ ايشيا ٻڌل هئي. سنڌ ۾ ان زماني جو ڪوبه جبل ظاهر نه آهي. البت، پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ جڏهن تيل ۽ گئس جي ڳولا ۾ ڪوهن جي

کوٽاين جو سلسلو شروع ٿيو تڏهن چن پٿر جو ڪيئي هزار فٽ ٿلهو ته معلوم ٿيو اهو شايد جوراسڪ زماني جو آهي.

ڪريٽيشس زمانو:



ميسوزوئڪ عرصي جو هي

زمانو 67-140 ملين سالن تي مشتمل آهي. جنهن جو مکيه تحفو پٿر سلسلو آهي. ان دور ۾ زبردست ارضياتي تبديليون آيون، جبل جهيا، ڊائنوسار ۽ ٻي ڪافي مخلوق نابود ٿي وئي. سنڌ ۾ تيل جي کوٽا دوران جوراسڪ زماني جي چن پٿري تنهن تائين ڪوهن جي کوٽائيءَ ۾ ڪريٽيشس دور جي shales ، مارل پٿر

۽ مارل جهڙي ڇن پٿر جا تَهَ به معلوم ٿيا آهن جيڪي تقريباً 9000 فُٽن کان ٿلها ۽ عمر ۾ Senonian کان Neocomian تائين جا آهن. 1948ع ۾ لاڙا وٽ $25^{\circ} 38' N, 68^{\circ} 08' E$ ڊگهي ۽ ويڪرائي ڦاڪ تي مليا. سنڌ ۾ سڀ کان پراڻا sedimentary تَهَ مٿين ڪرٽيشس دور جا آهن. اهي لڪيءَ جي اُترين ڀاڱي ۾ اٽڪل 1450 فُٽ ظاهر آهن. سڀ کان هيٺيان تَهَ *Hemipneustes* تَهَ آهن جيڪي تمام سخت وڏن ڇن جي پٿرن ۽ وارياسن پٿرن جي هڪٻئي مٿان تهن تي مشتمل آهن. انهن ۾ سُرَويل (آڪٽوپس نما cephalopods)، ڄاهي نما خاردار جسم واري سامونڊي زندگي (echinoids) ۽ ٻه پڙين سڀين (lamellibranches) جي درجي واري حيات جا جامر پند پهن آهن. ميسوزوئڪ عرصي جي ڪرٽيشس زماني جا ٽي طبق هيٺيون، وچون ۽ مٿيون ظاهر آهن. سنڌ ۾ انهن تهن جا نالا ۽ عمر ترتيبوار هن ريت آهي: ڪرٽيشس زماني ۾ Belemite تَهَ ڇن-پٿر تي مشتمل (140 ملين سال)، FARH وارياسو پٿر ۽ ڇن-پٿر (102 ملين سال)، Hippuritic limestone وارياسو پٿر ۽ ڇن-پٿر (78 ملين سال)، ڪرٽيشس وارياسو پٿر يا پَٻُ (75 ملين سال)، مٿيون ڪرٽيشس تَهَ *Cardita Beaumonti* (68 ملين سال).


تريشري زمانو

تريشري زماني جي پلائيسٽوسين عهد ۾ رني ڪوٽ ڇن پٿر وارياسو پٿر ۽ shale (65 ملين سال)، ايويسين عهد ۾ لڪي ڇن-پٿر ۽ ڪڇو پٿر shale (51 ملين سال) ۽ ٽيون (37-40 ملين سال) Marl ۽ Shale، کيرٿر ڇن-پٿر (37-28 ملين سال)، اوليگوسين عهد ۾ ناڙي وارياسو پٿر ۽ ڪڇو پٿر Shale (28 ملين سال)، مايوسين عهد ۾ گاج ڇن-پٿر ۽ Shale ڪڇو پٿر (18 ملين سال)، پلايوسين عهد ۾ منڇر وارياسو پٿر ڪنگلامرت (conglomerates) ۽ مٽي (7 ملين سال) ۽ ڪوارٽرنري زماني جي پلائيسٽوسين عهد ۾ آڳاٽي تازي دور جي مٽي (1.8 ملين سال) ۽ تازو ريت (0.1 ملين سال)، جاري زمانو هولوسين عهد آهي.

سنڌ جي جبلن جي جوڙجڪ ۽ ٻيون وصفون

سنڌ جي حوالي سان ڪريٽيشس فارميشن گهٽ اهم آهي ۽ اها بدي جبل کان سواءِ ڪٿي به ظاهر نه آهي، انهن جو تفصيل، سينوزوئڪ عرصي تائين محدود آهي. ارضيات جي ماهر بلائفورد ان سلسلي جو چڱو نقشو ٺاهيو آهي، جيڪو اڄ تائين عام سادي نقشي طور ڪم ايندو آهي.

رني ڪوٽ جوڙجڪ:



سنڌ ۾ ترشري زماني (جي پئليوسين عهد) جو سڀ کان ابتدائي پاڻو رني ڪوٽ جوڙجڪ وارو ارضياتي نظام رني ڪوٽ ۽ ان کان ڏکڻ ۾ پکڙيل آهي. اهو 3000 فٽ تهه آهي. جوڙجڪ جو مٿيون تهه 1150 فٽ ٿلهو آهي. اها فارميشن ناسي چُن پٿر، وارياسي پٿر ۽ وچ ۾ شيلز تي مشتمل آهي ۽ ڪن ڪن جاين تي وارياسي پٿر جي جاءِ تي ڪيلشمي چُن پٿر سان، (سليت وانگر).

ڪچو پٿر shale ۽ نرم چيرولي مادو موجود آهي. هي مرحلو لاکڙا، جهرڪ ۽ لڪيءَ جي اترين پاڻي ۾ پکڙيل آهي. وچين جوڙجڪ غير پندبهڻي مادي، وارياسي پٿر ۽ شيلز تي مشتمل آهي. جنهن جا گهڻي ئي رنگ آهن: نارنگي، ناسي، واڱڻائي، سائو سرمائي، ڳاڙهو، گلابي ۽ ڪارو ان ۾ ڪوئلو به موجود آهي. هيٺيون مرحلو 2000 فٽ آهي جنهن ۾ گهڻو رنگو ۽ زنگدار وارياسو پٿر ۽ shale آهي. اهو به لاکڙا، جهرڪ ۽ اتر لڪي سلسلي ۾ پکڙيل آهي. هيٺين رني ڪوٽ فارميشن جو بهترين نمونو لڪيءَ ۽ ڏاڦري جبل وٽ ظاهر آهي. ڏاڦري جبل وٽ اهو تهه 1430 فٽ آهي. ان هيٺين

سلسلي ۾ به تي ذيلي مرحلا تسليم ڪيا ويا آهن، جن ۾ سڀ کان هيٺيون مرحلو 'ڏاڦرو' تهه آهي، ان ۾ زيتوني سائو چُن پٿر ۽ shale آهن، ذيلي ورڇ واري ان گهيريل تهه تي موسمي حالتن کان گهڻو متاثر جوالاڻي پٿرن جو 50 کان 100 فٽ تهه وڃائجي ويو آهي. نيڪوٽ مرحلي جي سڀ کان هيٺين ۽ بلند ٽين ذيلي ورڇ کي ڪڏڙو Khadro چون ٿا جنهن ۾ وارياسو پٿر، چيڪي مٽي ۽ گهڻ رنگي وارياسي مٽي آهي.



هن جوڙجڪ جي تنهن ۾ پند پھڻن جو چڱو مقدار آهي. اڇن تي سوري صاحب انهن پند پھڻن کي ٿلهي ليکي ڇهن گروپن ۾ ورهائي ٿو جن ۾ *foraminifera* ترتيب جي ننڍڙي خوردبينائي ابتدائي حيات جا ٻه درجن کان وڌيڪ قسم، مرجان (Corals) جا ٻه قسم، خاردار جسر واري ننڍڙي جاهي نما سامونڊي حيات (*Echioids*) جا يارهن قسم، ڪوڏن (*Gastropods*) جا ڏيڍ درجن قسم، سپن (*Lamellibranchs*) جا اٺ قسم ۽ سرياه (سرويل، ميو آڪٽوپس) (*Cephalopods*) جا چار قسم معلوم ٿيا آهن. هن دور ۾ ماليه حيات جي شروعات ٿي چڪي هئي ۽ گلداز ٻوٽا جامر هئا. وڻن جا پند پھڻ ۽ ڪوئلي جا ذخيرا به ان جوڙجڪ ۾ موجود آهن.

زيڪوٽ فارميشن جهمپير وٽ ڪينجهر ڍنڍ کان ڏکڻ اولهه ۾ 8X14 چورس ڪلوميٽرن جي پوٺي جي صورت ۾ سونڊا وٽ ۽ آمري ۽ لڪي شاه صدر وٽ ظاهر آهي. انهن ٽڪرين جو جَر ڪجهه ڪارو آهي. زيڪوٽ مان نڪرندڙ چشمي ۾ 1800ppm لوڻيات آهي ۽ ان تي ٿيندڙ پوکيءَ واري زمين اضافي لوڻيات کان آجي نظر اچي ٿي، اهو شايد انڪري ته زمين وارياسي آهي ۽ پاڻيءَ جو نيڪال سٺو آهي.

لکي چُن پٿر جوڙجڪ:

هينئين ايويسين دور (38-48 ملين سال اڳ) جي هيءَ جوڙجڪ 1000 فٽن تي مشتمل آهي. هي چُن پٿر تمام سخت

۽ پيلسرو اڇو آهي. اهو لکي سلسلي يا ۽

لکي سلسلي کان ڏکڻ ۽ اوڀر ڏکڻ ۾ آهي.

لکي سلسلي ۾ ميتنگ (Meting) مرحلو

shales تي مشتمل ۽ 100 فٽن کان گهٽ

آهي. ان ۾ shales سان ناسي چُن پٿر جا

سنها پٽا آهن. اهي فقط ميتنگ ۽

جهرڪن جي علامتي ۾ آهن. ميتنگ چُن

پٿر مرحلو 140 فٽ تھ تي ٻڌل آهي. فقط

ميتنگ، براد آباد ۽ جهرڪ جي علامتي ۾

موجود هي وڏو ۽ سخت چُن پٿر آهي جيڪو اڪثر اُپتي لاهي ڌار

(anticlinal) ٽڪرين جي صورت ۾ نرم چُن پٿر جي تنهن سان هوندو


آهي. ان جو رنگ ڦڪو اڇو ٿئي ٿو. ڪڏهن ڪڏهن ان جي رنگت هيڊي ناسي

به ٿئي ٿي. ان تھ جي ٽولھ تقريباً 6 ميٽر ٿئي ٿي. ان ۾ شيلز پٿر جي


نسبت يا ته ننڍي آهي، يا وري اهي غير موجود آهن. لکيءَ وٽان شروع ٿيندڙ

لکي سلسلو ڏکڻ طرف هوريان هوريان قد ۾ ننڍو ٿيندو وڃي ٿو. لکيءَ جو

اوڀر-ڏکڻ سڌي ميدان وانگر آهي جنهن ۾ هن سلسلي جا هتي هتي ٽڙ پڪڙ



Anticlinal



ڪرنڳها اُتر-ڏکڻ رخ ۾ پکڙيل آهن. اهو سلسلو ميتينگ، ڄهمپير، براد آباد ۽ جنگشاهيءَ جي ڀر پاسي تائين هليو ويو آهي. مڪلي ۽ پير پٺو به ساڳئي تسلسل ۾ آهن. مجموعي طور تي هيءَ فارميشن ٿاڻي ٻُولا خان جي چوٽ، ٻولهاڙي ۽ جنگشاهيءَ وٽ هيٺاهين سطح تائين پکڙيل آهي ۽ تڪنڊو ناهي ٿئي. لڪي سلسلي ۾، ان وچ واري خال تي تازيون فارميشنز وڌيل آهن. اهي تڪريون ڏکڻ ۾ پير پٺي تائين ريت هيٺ پکڙيل ۽ هاڻي ڪوٽڙي بئراج جي ڪمانڊ ۾ آهن. حياتياتي لحاظ کان هن دور ۾ اوائلِي گهوڙا، گينڊا ۽ اُن پيدا ٿي چُڪا هئا.


ٽيون (Tiyon) جوڙجڪ:

(ايوسين دور (39-37 ملين سال اڳ) ٽيون نالي هن جوڙجڪ کي لڪي جبل جي ڍوري ('ٽيون' ڍورو) تان نالو ڏنو ويو آهي (جيڪو ڀڳي ٺوڙهي جي اولهه ۾ آهي). هي نرم آبهوائي، سنهيون تهڊار ۽ هڪٻئي سان سٿيل گهڻ پندپهڻي تڪريون آهن جنهن ۾ ڪچو پٿر (shale) ۽ مارل پٿر (marl: مٽي ۽ چُن پٿر جو نفيس ذرڙن وارو پٿر) جون سٿائون (deposits) گهڻيون آهن. انهن جا رنگ عام طور سائو ناسي ۽ چاڪلپتي سرمائي آهي. اهو چٽائون (calcareous) ۽ چيرولي (gypsum) گاڏڙ آهي. ڪجهه تنهن ۾ گهوڙن جي صورت ۾ چُن پٿر آهي. ڪچي پٿر (shale) جا ته اڪثر ڪري

هيٺئين ايوسين دور جي پندپهڻن سان ڀريل آهن. انهن جي ٿولهه 100 کان 200 ميٽر آهي. کيرٿر جوڙجڪ:

(26-38 ملين سال اڳ) مٿئين ۽

وچين ايوسين عهد جي هن جوڙجڪ جا تهه 8000-6000 فٽ آهن. جنهن جو وچون مرحلو 2000 فٽ آهي. ان ۾ سائو ۽ سرمائي shale، پند پهڻي ناسي سرمائي چُن پٿر آهي. هن



سلسلي جون مکيه ٽڪريون ڪرچات کان شروع ٿي اُتر ۾ ننگ جي اولهه کان ٿينديون گورڪ، ڪچرڪ، ڪٽي جي قبر ۽ ان کان به اتر طرف بلوچستان ۾ خضدار طرف هليون وڃن ٿيون. اها جوڙجڪ اڪثر ننڍڙي ڪچي پٿر (shale) جي ابتي لاهين سان هوندي آهي. ان ۾ وڏا ڳوڙهي دار پٿر هڪ کان ڏيڍ فٽ جي ماناري نما ٿلهي تهه ۾ موجود آهن، اها بيهڪ موسمي اثرن سبب ٿي پئي آهي. ڪي وارياسا تهه به موجود آهن. ان جا رنگ هلڪو سائو، هلڪو ناسي، هلڪو ڦڪو ۽ هلڪو سرمائي عام آهن.

هن جو اهم ڪرنگهه سنڌ ۽ بلوچستان جي وچ واري سرحد ناهي ٿو ۽ ان حصي ۾ جيڪا برسات پوي ٿي اها ناڙي ڪچي پٿر (shale) مان لنگهي پوءِ ميدانن ۾ پهچي ٿي. shale پٿر کان خالي علائقي ۾ هنن ٽڪرين جو پاڻي منو هوندو آهي. ارضياتي طور ان سان برابر بلوچستاني جوڙجڪ ۾ منو جڙ موجود آهي. انڪري خود ڏاڙهياري (جتي ڪٽي جي قبر آهي) تي جڙ ڳولڻ سان ان علائقي کي ترقي وٺائي سگهجي ٿي. هنن جبلن ۾ 100-100 ڪن ميٽرن جون غارون ۽ جبل ۾ اندر ئي اندر ڦوڙ آهن جن ۾ برسات جو پاڻي جمع ٿئي ٿو ۽ پوءِ ڪٿان ڪٿان واهين ۽ چشمن جي صورت ۾ وهي ٿو.


ناڙي جوڙجڪ:

18-33 سال اڳ جي هن دور ۾ پولڙا، بن مانس ۽ سجي دنيا ۾ استوائِي بيلا ظاهر ٿي چڪا هئا. اوليگوسين عهد جي هيءَ جوڙجڪ 7000 فٽن تائين آهي جنهن ۾ شيلز، چٽائون وارياسو پٿر ۽ (اڇو هيڊو ناسي) وارياسو چُن پٿر آهي. اهو سلسلو کيرٿر پٽ ۽ ٻڏي سلسلن سان آهي ۽ انهن ۾ کيرٿر جي اولهه ۾ موجود ابتي لاهيدار سلسلا (anticlinal ranges) شامل آهن. هيءَ جوڙجڪ ڪچي ٽڪرين جي نڌ ناڙي واري علائقي کان شروع ٿي ڏکڻ طرف ڪراچيءَ جي اوڀر ۾ واقع ’گهارو‘ شهر تائين پکڙيل آهي. اهي لاڳيتيون ٽڪريون آهن ۽ مختلف جاين تي تازي جوڙجڪ ۽ تازي کان اڳاٽي جوڙجڪ جا تهه وريل آهن. هي ڊپازٽس بنيادي طرح نرم چُن پٿر

۽ واریاسي جن پٿر تي مشتمل آهن. ان واریاسي پٿر جو رنگ سرمائي ساڻو ۽ هلڪو ناسي يا آڇو آهي. ڪڇي پٿر جي موجودگي گهڻي نه سهي، پر ڪن حصن ۾ موجود آهي. ان جي ٽولھ 1000 کان 2000 ميٽر آهي. ناڙي جوڙجڪ سبب ئي گاج وارو نه جو نظام ۽ سلسلو ٺهيو آهي ڇو ته ناڙي ٽڪريون عام طور تي گاج کان اُتاهيون آهن. ان علائقي ۾ جيئن ته شيلز اڻ ڇههءَ دار آهن، انڪري انهن مان پاڻي پار نه ٿو ٿئي ۽ جَر نٿو پرجي.

گاج جوڙجڪ:

مياوسين عھد (26-7 ملين



سال) زبردست جَوَالاتي سرگرمين جو عرصو هو. ان ئي زماني ۾ گاهه، چَرندڙ جانور ۽ پکي پکڙيا. هيٺئين مياوسين عھد جي هيءَ جوڙجڪ 2400 فتن تي مشتمل آهي. هيٺيون گاج مرحلو چُن پٿر شيل، ۽ واریاسي پٿر تي مشتمل آهي. مٿيون گاج مرحلو 7000 فتن تائين آهي جنهن ۾ واریاسو پٿر، واریاسو شيل ۽ شيل آهي. اهو سلسلو اولھ سنڌ ۽ حب ماٿريءَ ۾


پکڙيل آهي، ۽ لڪي کان اوڀر طرف ڪونه آهي. هن فارميشن جون خاص وصفون پونا ۽ ڪرنگها آهن. اهي حصا چُناوان (calcareous)، ريتيلي پٿر ۽ واریاسي چُن پٿر تي مشتمل آهن. چُن پٿر گهرو ڊائيندار به آهي ته لَسو به. ان جو رنگ اڇو، پيلو سرمائي، ناسي گاڙهو ۽ سرمائي گلابي آهي. اهو وڏو چُنائون آهي ۽ 1.5 ميٽر ٿلها ٽونڪ (slabs) آهن. مارل پٿر ۽ شيل جو ٿورو مقدار ڪن ٽڪرن ۾ ملي ٿو. انهن تنهن جي ٽولھ 600 ميٽر آهي.

گاج جوڙجڪ ڪوهستان فارميشن جو وڏو حصو والاري ٿي. ٿاڻو شاهه بيگ، سري ۽ ڪراچيءَ جو سڄو شهر ۽ خود گاج ان فارميشن جو

حصو آهي. ملير جا مٿانهان ميدان گاج کان مٿي آهن. داٻيجي، گهارو به ان فارميشن جو حصو آهن. ان ۾ شيل اڪثر ڪري ڪونهي ۽ پورس وارياسو پٿر آهي. ان ۾ پاڻيءَ جو چڱو مقدار آهي.

منڇر جو جڪ:

مٿئين پلايوسين کان پلايوسين




عهد (2-7 ملين سال) يوريشيائي زمين سان اڳڪٿي جي ٽڪراءَ هماليه ۽ ٻين سلسلن جي اُڀرڻ جو زمانو آهي. سنڌ ۾ ان عهد جي جوڙجڪ 1000 کان 9000 فٽن جي تهن تي مشتمل آهي. مٿيون مرحلو 500 فٽ، وچون مرحلو 500 کان 4600 فٽ ۽ هيٺيون مرحلو 500 کان 4000 فٽ آهي. پهرئين مرحلي جي جوڙجڪ گول پٿرين جي ڪنگلامرت آهي ۽ اها کيرٿر

جي اڀرندين لاهين سان نش ٿري جي اتر ۾ آهي. ٻيو مرحلو نارنگي مٽي ۽ ناسي وارياسي پٿر سان ناقص ڪنگلامرت (pseudo conglomerates) تي مشتمل آهي ۽ کيرٿر سلسلي جي اوڀر ۽ ڏکڻ ۾ پکڙيل آهي. ٽيون مرحلو اڇي سرمائي ۽ ناسي وارياسي پٿر ۽ نارنگي گاڙهي مٽيءَ تي ٻڌل آهي ۽ الهندي سنڌ ۾ آهي. هي ٿلهو، وڏن تهن وارو سرمائي ريتيلو پٿر آهي پر ڪنگلامرت حالتن ۾ به ملي ٿو. جنهن جي گاجناڙينڊڙين گول پٿرين ۽ گول چنبن (pebbles and boulders) طور درجي بندي ڪري سگهجي ٿي. ان ۾ پٿريل ٻيلو آهي جنهن ۾ ٿڙن جا ٽڪرا ڏسجن ٿا. ان ۾ مٽيءَ جو به وڏو مقدار آهي ان جي ٿرلهه 3000 فٽن تائين آهي. سيوهڻ کان اتر ۾ اهو حصو گاج نش وٽ ۽ وري ڏکڻ ۾ لڪي شاه صدر کان زني ڪوٽ سلسلي ۽ پوئڻ جي وچ ۾ هلندو وڃي ٿو.

برفاني دور:

ڪوارٽرنري زماني جي پئليوسين عهد، يعني 2 ملين سالن کان برفاني دور جي شروعات ۽ خاتمي جو سلسلو هليو جنهن ۾ يورپ، آمريڪا ۽ ايشيا جي اتر وارن علائقن تي ڪيئي ڀيرا برف طاري ٿي ۽ ختم ٿي. نيٺ، اهو سلسلو آخري ڀيرو 10.000 سال اڳ پورو ٿيو. ان ئي زماني ۾ آڳاٽو انسان ظاهر ٿيو.

تازي جوڙجڪ:



هولوسين زماني، يعني اڄ کان 10.000 سال اڳ کان اڄ تائين جي آهي جنهن ۾ گرم آب هوا جاري ٿي. برفاڻو دور ختم ٿيو ۽ تهذيبن جي واڌ ويجهه ٿي. تازي جوڙجڪ جا ٻه مرحلا آهن، هڪ تازي (recent) ۽ ٻي ان کان ڪجهه آڳاٽي تازي (sub-recent). هي سلسلو به (اتر کان ڏکڻ رخ وارين) مٿي ڄاڻايل ٽڪرين جي ڊنل ڇڻ ۽ مواد مان ٺهيل آهي جيڪو وڃ واري جبل يعني منڇر تائين آهي. اها

جوڙجڪ پوءِ پڪڙجڻ ۽ هڪٻئي مٿان وڌندڙ صورت ۾ آهي. جتي جتي اها پڪڙجي ٿي، اتي ان جي اوچائي گهٽجي ٿي. ٿاڻي ٻولا خان کان هيٺ اهي حصا سڌا ٿي وڃن ٿا ۽ انهن سان ٺهيل پونو پليٽ فارم ايراضي سڏجي ٿو. هي ٽڪريون چوٽيءَ وٽ هڪٻئي کان ڇڳل آهن. جنهن ڪري زمين جا وڏا ميدان ٺهي پون ٿا، جيڪي زراعت لاءِ مناسب آهن. ٽڪرين جي وچ ۾ هيءُ ماڻهيون تازي ۽ ڪجهه پراڻي ڊپازٽس سان ڀريل آهن. جبلن جو برساتي پاڻي انهن ماڻهيون مان ڌوڙي ٿو جنهن سان ڪيئي ڍورا ۽ ڍوريون ٺهي پيون آهن.

ارضياتي طرح سنڌ جي عمر ننڍي آهي. اولهه سنڌ وارين ٽڪرين مان وڌ ۾ وڌ قديم ٽڪري 117 ملين سال پراڻي آهي. ارضيات ۾ اها ڄڻ ته ڪلهه جي ڳالهه آهي ڇو ته ڪوهستان جا اڪثر جبل ۽ ٽڪريون فقط 65 ملين سال اڳ کان ٺهڻ شروع ٿيون. ان مهل تائين ڌرتي حياتياتي طور ڪافي ارتقا ڪري چڪي هئي. غير ڪرنگهيدار مڇيون، زميني ٻوٽا، جلتليا، ڪرڙاڻگ، مماليه ۽ ٻڪي پيدا ٿي چڪا هئا. انهن جا پنڊ بهڻ سنڌ جي جبلن مان لڳندا رهندا آهن. ڪوهستان جي جوڙجڪ ۾ گهڻو تڻو مواد هن ريت آهي:

ترتيب	ملين سال اڳ	جوڙجڪ	پٿر جو قسم
1.	117-102	Belemite beds	چن پٿر
2.	102-78	FARH	چن پٿر+ وارياسو پٿر
3.	78-65	ippuric, Cardita & beaumont	چن پٿر+ وارياسو پٿر
4.	65-51	رني ڪوٽ	چن پٿر+ وارياسو پٿر + شيل
5.	51-40	لڪي	چن پٿر + شيل
6.	40-37	ٽيئون	مارل سان شيل
7.	37-28	کيرٿر	چن پٿر
8.	28-18	ناڙي	وارياسو پٿر + شيل
9.	18-7	گاج	چن پٿر + شيل
10.	7-1-8	منڇر	وارياسو پٿر + مٽي+ ڪانگلا مرٽ
11.	1.8-0.1	پراڻو - تازو	مٽي
12.	0.1	تازو	ريٽ

قدرتي وسيلو، معدنيات:

سنڌ ڪوهستان جي جوڙجڪ ۾ مجموعي طور تي هيءَ معدنيات موجود آهي، جنهن جو ذڪر مٿئين باب ۾ ڪيو ويو:

1- تعميراتي پٿر: سنگ مرمر، قدرتي پٿر يا ريتي بجليءَ جي صورت ۾. 2- مٽي: آتشي مٽي (باهه واري چيڪي مٽي)، مٽ، چيڪي مٽي، چيني مٽي، اڇي مٽي وغيره. 3- چسمر، 4- چاڪ، 5- شيشو، 6- ڦٽڪي، بلوري پٿر 7- گاري، چمقي پٿر، ڪرنڊ، سليڪا، 8- خام شيهو 9- لوڻ، 10- استرانٽيم سلفيٽ، سليسٽائن 11- ڪوئلو، گئس، تيل، 12- چن پٿر، ڊولومائٽ، 13- گندرفي لوڻياڪ، خام فاسفيٽ، 14- نيمر قيمتي پٿر 15- بئسالت (نفيس ذرڙن وارو ڪارو آتشي پٿر).

زلزلن ۽ جوالاڻي سرگرمين جو تسلسل:

جاگرافيدانن جو خيال آهي ته سنڌ ۾ گرم چشمن جو ڪارڻ اهوئي آهي ته هي خطو ارضياتي فالت تي آهي جنهن جي گرمائش ۽ دٻاءُ سبب هن خطي ۾ وڏا زلڙا ايندا رهن ٿا. حقيقت اها آهي ته سڄي سنڌ زلزلن جي منهن ۾ آهي خاص ڪري رڻ ڪڇ کان وٺي ٿرپارڪر، بدين، ٺٽو، ڪراچي ۽ لڪي جبل وارو پتو ته ان فالت جي مٿان قائم آهي ان فالت سبب ڪڇ ۽ سنڌ ۾ زلزلن يا پونچالن جو ڊگهو ۽ خوفناڪ ريكارڊ سامهون اچي ٿو.

لڳ ڀڳ 1500 ق. م ۾ ۽ سرسوتي نديءَ جو وهڪرو اوجتوبند ٿي ويو اهو وڏي پئماني تي آيل پونچال ڏانهن سڌو اشارو آهي. لڳ ڀڳ 1500 ق. م ۾ ئي سنڌو تهذيب جا اڪثر شهر به شايد زلزلن ۾ تباھ ٿيا. هڪ وڏي ارضياتي واقعي ڏانهن ’مهاپارت‘ ۾ اشارو ڏنل آهي جنهن موجب (اصلوڪو) دوارڪا شهر سمنڊ شري ڪرشن جي مرثي کان ڇهه ڏينهن پوءِ سمنڊ ۾ غرق ٿي ويو (ان شهر جا سمنڊ دوز نشان لڌا ويا آهن). دوارڪا جي غرق ٿيڻ جو واقعو عيسوي سن جي شروعات کان ٿورو ئي اڳ

جو محسوس ٿئي ٿو هندو لوڪن جي عقيدتي موجب ان واقعي يا شري ڪرشن جي موت کان پوءِ ڪل يگ شروع ٿيو آهي. سن 893 ع ۾ ديبل جي تباهيءَ وقت به اهڙو ئي واقعو پيش آيو. تڏهن ديبل جي شهرين پنج زبردست جهٽڪا محسوس ڪيا. جنهن ۾ سڄو شهر تباه ٿي ويو. تاريخدانن موجب ان واقعي ۾ هڪ لک کان مٿي ماڻهو زندهه دفن ٿي ويا.

پاري نگر بندر جي برباديءَ جو (شاھ خوارزم جي ڦرلٽ کانپوءِ ٻيو) مکيه سبب رڻ ڪڇ ۾ آيل ارضياتي تبديلي آهي ڇو ته رڻ ڪڇ وارو سمنڊ تانگهو ٿي ويو هو ۽ پاري نگر جي بندرگاهه واري حيثيت باقي نه رهي هئي ۽ ماڻهو اتان لڏي پوڏيسر هليا ويا هئا اهو واقعو 1226 ع کان ڪجهه وقت پوءِ پيش آيل لڳي ٿو. هڪ واقعو سن 1819 ع ۾ پيش آيو جنهن جي طاقت ريڪٽراسڪيل تي 7.8 هئي، ان جو مرڪز ٿر جي ڏکڻ ۾ رڻ ڪڇ ۾ ’الله بند‘ هو. ان زلزلي سبب ڊيلٽا ۾ وڏيون تبديليون آيون هيون. 1819 واري ان واقعي جو ذڪر بابسي جاگرافيڪل سوسائٽيءَ جي واليومر X ۾ صفحي 52 تي ڏنل آهي، جنهن ۾ چيو ويو ته ”سنڌي شهر جي ويجهو، جتي سنڌوءَ جي هڪ شاخ رڻ سان ملي ٿي، موقعي تي هميشه لاءِ غرق ٿي وئي ۽ 6 کان 8 فٽن جا ننڍڙا ننڍڙا مخروطي دڙا اُڀري آيا جن جي چوٽين مان ڪيترن ڏينهن تائين گپ پڙڪندي رهي.“ ساڳئي دستاويز ۾ لکيل آهي ته آڪٽوبر 1849 ع ۾ زهريلي گئس جهڙي ڪا شئي ڦاٽ کائي نڪتي. اهو ڊسچارج شايد ڪنهن سامونڊي جولا مڪيءَ جو هو جيڪو ڪاٺياواڙ ۾ پور بندر ويجهو 30-40 ميل سمنڊ طرف هو. ان واقعي سان بيشمار مڇيون زهر ڇڻ سبب مري ويون هيون ۽ ڪيترا ئي ڏينهن پاڻيءَ جي سطح تي ترنديون رهيون.

ارضياتي ريڪارڊ موجب هڪ واقعو 15 آڪٽوبر 1898 ع تي صبح جي وقت شاھ بندر کان خيرپور تائين سڄي ٿرپارڪر ۾ پيش آيو جنهن ڊيلٽا ۾ وڏيون تبديليون آنديون. 14 جنوري 1903 ع تي زوڊار ڌماڪي سان ڌوڏو آيو هو. ان واقعي سان بدين تعلقي ۾ ڪن جاين تي زمين ۾ ڌار پئجي ويا هئا. جنهن مان گرم پاڻي ۽ گپ نڪري آئي هئي.

هڪ جاءِ تي هڪ چورس ميل ۾ زمين گپ هيٺ اچي وئي هئي. اهو ڦوٽ 12 ڪلاڪ برقرار رهيو ۽ جڏهن اهو جھڪو ٿيو ته گرم ڦوهارن جا وڏا ٻرگهل، جيڪي ڪجهه انجن کان وٺي 15-20 فٽ قطر جا هئا ۽ 8-10 فٽ گهرا هئا، گپائن ترن ۾ نظر آيا.


زلزلي جو هڪ خوفناڪ واقعو 1935ع ۾ ڪوئٽا ۾ پيش آيو جنهن ۾ 30 کان 60 هزار ماڻهو دٻجي ويا هئا. هڪ واقعو مئي 1951 ۾ ڪراچي ڪلفٽن جي سامونڊي علائقي تي سامهون آيو، جنهن ۾ سمنڊ جي سطح تي ميلن ۾ ايڏي وڏي پئماني تي مٿل مڇيون نظر آيون، جو انهن جو 5 کان 10 يا 15 فٽ تهه ٺهي پيو. 1956 ۾ آنجر Anjar وٽ پيچ کان ٿورو ڏکڻ اوڀر ۾ 7.0 ريڪٽراسڪيل جو زلزلو آيو.

26 جنوري 2001ع تي ڪڇ ۾ $23^{\circ} 46'N, 70^{\circ} 32'E$ ڊگهائي ويڪرائي ڦاڪ تي 7.9 اسڪيل جو زلزلو آيو جنهن ۾ 9- لک ماڻهو متاثر ٿيا. هن موقعي تي ڪڇ، ٿر ۽ بدين ۾ زمين ڌري پئي ۽ زمين مان گرم پاڻي ٻاهر نڪتو. مٽي جي هردم زندهه جوالا مکيءَ جو هڪ مثال بلوچستان ۾ هنگور نديءَ جي چوڙ وٽ آهي، جنهن ۾ هر وقت گپ پئي ٻڙڪندي آهي. هندولوک ان 100-150 فٽ اوچي مخروطي ۽ ٻڙڪندڙ ڌڙي کي 'پيڪنات' يا 'چندر ڪوپ' چوندا آهن ۽ ان کي ڀڳوان جي شڪتي سمجهي ان جي پوڄا ڪندا ۽ ان ۾ ناريل اڇلائي رسم ادا ڪندا آهن. اهي چيڪي مٽي ارڳاچيندڙ ۽ ٻڙڪندڙ ڌڙا زمين جي اندروني جوش مطابق پنهنجو قد، جاءِ ۽ تعداد گهٽ وڌ ڪندا رهندا آهن. ان کان پوءِ هن مهل تائين سنڌ ۾ آخري ڀيرو 14 فيبروري 2004 تي 5.7 اسڪيل جو جهٽڪو آيو آهي.

ان ئي ارضياتي فالت سبب کيرٿر ۾ به ارضياتي تبديلي اچي ٿي، ڇپون ڪرڻ ٿيون، چشما پنهنجو وهڪرو گهٽ وڌ ڪن ٿا يا رخ بدلايو ڇڏين يا ماڳهي ڪٽي بند يا ڪٽي نئين جاءِ تان ڦاٽ کائي جاري ٿيڻ لڳن ٿا. جنوري 2001 ۾ ٿيل اهڙي واقعي سبب سنڌ جي اڪثر جابلو واهين جو پاڻي گهٽ وڌ ٿيو هو.

پاڪستان ۾ زلزلن جي تاريخ ۽ انهن جا ارضياتي خطا (zones)

پاڪستان ۾ اڪثر زلزلا اُتر-اولهه سرحد وٽ ايندا آهن. اهو اُپکنڊ واري پليٽ جو ايران ۽ افغانستان وارين پليٽن جي فالت جو سرحدي خطو آهي، جنهن ۾ افغانستان، ڪوئٽا ۽ قلات جون حدون اچي وڃن ٿيون. هڪ فالت مڪران ساحل کان شروع ٿئي ٿو جيڪو هندستان جي مها راشٽر واري ساحل جهڙو آهي. هڪ وڏو فالت مڪران، عربستان، ۽ ايران جي مائڪرو پليٽ سان آهي.



الله بند فالت جي تصوير

کيرٿر، سليمان ۽ سالت خطن (Salt zones) ۾ مختلف تهن جا هڪٻئي مٿان وڙڻ جا اندروني سرشتا (Thrust zones) آهن. ڪراچي،

[illegible]

هڪ ٻيو وڏو فالت رڻ ڪڇ کان شروع ٿئي ٿو تيئن فالت ’ٻٻ-‘ جو آهي جيڪو مڪران ساحل وٽ عربي سمنڊ ۾ ختم ٿئي ٿو ۽ چوٿون فالت ڄامشوري ضلعي ۾ سورجاڻ کان شروع ٿي ڪراچيءَ جي پسگردائيءَ ۾ ختم ٿئي ٿو عربي سمنڊ ۾ ’سونامي‘ (Tsunamis) يا سامونڊي ويرن جي چڙهت به ٿئي ٿي، ان جو سڀ کان مکيه مثال 1945 ۾ آيل زلزلي جو آهي، جنهن جي طاقت ريڪٽراسڪيل تي 7.9 هئي. ان ۾ 12 ميٽر اوچيون لهرين مڪران ساحل سان ٽڪريون هيون.

ارضياتي خلل وارا خطا:

پاڪستان موسميات کاتي جي تيار ڪيل هڪ نقشي مطابق سڄو ملڪ چئن ارضياتي خطن (zones) ۾ ورهايل آهي. ڪوئٽا جي چوڌاري خطي مڪران ساحل ۽ سرحد صوبي جا افغانستان سان سرحدي علائقا زون-4 ۾ آهن. باقي سرحد صوبو ڏاکڻي حصي کان سواءِ (جيڪو زون-2 ۾ آهي) زون-3 ۾ آهي. پاڪستان جو باقي ساحلي علائقو به ڪراچي تائين زون-3 ۾ آهي. باقي ملڪ زون-2 ۾ آهي. پشاور، رالپنڊي، اسلام آباد ان زون ۾ اچن ٿا. پر ان هوندي به اهي اڪثر افغانستان ۽ اتر وارن علائقن جي زوڊار زلزلن جي اثر هيٺ ايندا آهن.

بلوچستان جو سڀ کان مٿيون اُترين حصو ۽ هندستان سان سرحدي علائقا زون-1 ۾ اچن ٿا، ان زون ۾ لاهور به شامل آهي، جتي 1905 ۾ (پارٽ جي) ’ڪانگوا‘ زلزلي سبب ڏاڍو نقصان ٿيو هو. GSHAP موجب پاڪستان ۾ سڀ کان وڌيڪ خطري هيٺ حصا بلوچستان صوبي ۽ ڪوئٽا کان افغانستان، اولهه بلوچستان، مڪران ساحل ۽ ايران سرحد تائين آهن.

پاڪستان ۽ ڀرپاسي ۾ سڀ کان وڏا زلزلا:

894-899ع : ديبيل بندر (سنڌ جو ڊيلٽا) ۾ 7.5 درجي جو زلزلو

آيو جنهن ۾ 1,10,000 ماڻهو مارجي ويا ۽ ڪيترائي شهر تباه ٿيا.

مئي 1688ع ۾ شاهيندر ويجهو $68^{\circ} 00' N$ $24^{\circ} 00' E$

(سنڌ جو ڊيلٽا) زلزلي جو ريكارڊ ملي ٿو

16 جون 1819ع الله بند (پاڪ هند سرحدي خطو) $32^{\circ} 60'$

E $69^{\circ} 60' N$. هي زلزلو 7.5 طاقت جو هو جنهن ۾ 32000 ماڻهو

مارجي ويا ۽ ٿر سميت ڪڇ جا ڪيئي درجن ڳوٺ تباه ٿي ويا هئا. ان زلزلي

سبب ڪافي زميني تبديليون آيون، ان واقعي سبب 90 ڪلوميٽرن جي

پٽيءَ ۾ زمين جي سطح 4 ميٽر اُڀري آئي، جنهن کي الله بند چيو ويو. هن زلزلي جو ڌوڏو سڄي اُپکنڊ ۾ ڪلڪتي تائين محسوس ڪيو ويو هو. 26 سيپٽمبر 1827ع تي لاهور ويجهو $31^{\circ} 60' N$, 74° $30' E$ ڊگهائي ويڪرائي ڦاڪ تي آيل هن جهٽڪي ۾ هڪ هزار کن ماڻهو مارجيا ويا هئا.

24 جنوري 1852 تي ڪاهان (بلوچستان) ۾ $29^{\circ} 30' N$, 68° $80' E$ ڊگهائي ويڪرائي ڦاڪ تي مري ٽڪرين ۾ زلزلي سبب اڍائي تي سؤ ماڻهو مارجي ويا. مال مري ويو ۽ عمارتون ڊهي پيون. 1865ع ۾ ڪاهان ويجهو ڪيئي عمارتون ڊهي پيون. 1883ع ۾ جهالاوان (بلوچستان) ۾ زلزلو آيو.

20 ڊسمبر 1892 ۾ چمن، افغانستان، پاڪستان سرحد تي 6.8 درجي جو زلزلو آيو. ان جو مرڪز خوجڪ سلسلي ۾ هو، جنهن کي سڄي بلوچستان ۾ محسوس ڪيو ويو. ان واقعي ۾ 200 ڪلوميٽرن ۾ تباهي آئي، جنهن ۾ ريلوي لائين سميت ٻيون تنصيون متاثر ٿيون هيون. 20 آڪٽوبر 1909 تي سبيءَ ۽ لورالائي وچ تي باغ ۽ شاهپور ويجهو $30^{\circ} 00' N$, $68^{\circ} 00' E$ تي 60 ڪلوميٽرن جي گهرائيءَ ۾ 7.0 درجي جو زلزلو آيو. ان واقعي ۾ 100 کن ماڻهو مارجي ويا ۽ ڪافي ڳوٺ تباه ٿي ويا.

1 فيبروري 1929 تي بونير ۽ هزاره جي وچ ۾ ابيٽ آباد کان ٿورو اتر ۾ رات جو پوٽي يارهين لڳي ڌاري 36° $70^{\circ} 50' E$ $50' N$ ، ڊگهائي ويڪرائي ڦاڪ تي 180 کان 220 ڪلوميٽر گهرائيءَ ۾ وڏو جهٽڪو آيو.

25 آگسٽ 1931 تي شاربغ بلوچستان ۾ $30^{\circ} 00' N$, $67^{\circ} 00'$ E تي 7.2 درجن جو جهٽڪو آيو. ان جي گهرائي زمين اندر تمام گهٽ هئي، انڪري بي شمار ڪچا گهر ڊهي پٽ ٿي ويا.

27 آگست 1938 تي مڇ (بلوچستان) $29^{\circ} 80' N, 67^{\circ} 30' E$

۾ 7.0 درجي جو زلزلو آيو. هي بلوچستان جي لڳ ڀڳ ساڳئي علائقي ۾ فقط ٻن ڏينهن جي فرق سان ساڳي شدت جو جهٽڪو هو. جيڪو اڪثر بلوچستان ۽ سنڌ ۾ محسوس ڪيو ويو. ڪافي جاني نقصان ٿيو ۽ ڪوئتا ۾ ڪافي گهر ڊهي پيا.

30 مئي 1935 تي ڪوئتا ۾ $27^{\circ} 39' N, 88^{\circ} 75' E$

ڊگهائي ويڪرائي ڦاڪ تي 8.1 درجي جو شديد ترين زلزلو آيو جنهن جي اونهائي فقط 17 ڪلوميٽر هئي. ان واقعي ۾ 30,000 ماڻهو زندهه دفن ٿي ويا ۽ شهر مڪمل تباه ٿي ويو. هي پاڪستان جي تاريخ جو سڀ کان وڏو زلزلو هو.

21 نومبر 1939 افغانستان جي صوبي بدخشان ۾ 6.9 درجي جو

زلزلو آيو جيڪو 220 ڪلوميٽر اونهائيءَ ۾ هو. اهو جهٽڪو اتر اولهه افغانستان، اتر پاڪستان، گلگت، دروش، سرينگر، جمون، ڪشمير ۽ هندستاني پنجاب ۾ به محسوس ڪيو ويو.

27 نومبر 1945 تي مڪان ساحل کان اندر $24^{\circ} 50' N, 63^{\circ}$

$00' E$ خطي ۾ 7.9 درجي جو 25 ڪلوميٽرن جي اونهائيءَ ۾ جهٽڪو آيو. ان زلزلو ۾ بلوچستان ۽ ايران جا 2000 کن ماڻهو مارجي ويا. ان واقعي سان سوناميءَ جون 12 ميٽر اوچيون لهرون مڪران ساحل سان ٽڪريون هيون. ان سان وڏي پئماني تي نقصان ٿيو. سونامي ڪڇ ۽ ممبئي ۾ ترتيبوار 6 ۽ 2 ميٽر ريكارڊ ڪئي وئي.

5 آگست 1947 مڪران جي ساحل کان اندر $25^{\circ} 10' N, 63^{\circ}$

$40' E$ خطي ۾ 7.2 درجي جو زلزلو آيو.

28 ڊسمبر 1974ع تي مالاڪنڊ $35^{\circ} 05' N, 72^{\circ} 87' E$

وٽ 6.2 طاقت جو 22 ڪلوميٽر اونهائيءَ ۾ زلزلو آيو. ان واقعي ۾ اٽڪل 5000 ماڻهو مارجي ويا.

12 سيپٽمبر 1981ع تي گلگت وزارت (جمون ۽ کشمير) ۾ 6.1 درجي جو زلزلو $35^{\circ} 69' N, 73^{\circ} 59' E$ ڊگھائي ويڪرائي ڦاڪ تي 33 ڪلوميٽرن جي اونھائيءَ تي آيو، جنھن ۾ 220 ماڻھو مارجي ويا. اھو جھٽڪو سرينگر اسلام آباد ۽ پشاور تائين محسوس ڪيو ويو

30 ڊسمبر 1983ع تي ھندوڪش جبل (افغانستان) ۾ 7.4 درجي جو زلزلو آيو، جنھن جو مرڪز 215 ڪلو ميٽر ھيٺ هو. ان زلزلي ۾ بہ جاني نقصان ٿيو ۽ ان جو اثر اتر افغانستان، تاجڪستان، اوزبڪستان، ڪرغستان، اتر پاڪستان ۽ اتر ھندستان ۾ محسوس ڪيو ويو

29 جولاءِ 1985ع تي ھندوڪش افغانستان ۾ 7.4 درجي جو زلزلو 99 ڪلوميٽرن جي گھرائيءَ مان اُڀريو، جنھن سان چترال، سوات، تاجڪستان ۽ افغانستان جا ڪجھ حصا متاثر ٿيا. جھٽڪو دھلي ۽ تاشقند تائين محسوس ڪيو ويو

31 جنوري 1991ع تي ھندوڪش ۾ وري زلزلو آيو جيڪو 6.7 درجي جو ۽ 142 ڪلوميٽر ھيٺ هو. ھن جو نقصان ۽ اثر بہ تقريباً ايترو هو جيترو ھن کان اڳين جھٽڪن سبب ٿيو هو

9 آگسٽ 1993ع ھندوڪش جبل افغانستان ۾ 7.0 درجي جو زلزلو 215 ڪلوميٽرن جي گھرائيءَ مان اڀريو جيڪو ايشا ڪوچڪ کان ملتان تائين محسوس ڪيو ويو

27 فيبروري 1997ع تي ھرناڻي (بلوچستان) ۾ $29^{\circ} 97' N, 68^{\circ} 20' E$ ڊگھائي ويڪرائي ڦاڪ تي 7.3 درجي جو زلزلو 33 ميٽرن جي اونھائيءَ مان اُٿيو جيڪو پاڪستان جي زوردار زلزلن مان ھڪ هو. ان واقعي سان چين ڪرڻ سبب روڊ ۽ ريلوي لائينون بلاڪ ٿي ويون. ان جھٽڪي سبب ڪوئٽا، سبي ۽ ھرنا ۾ اموات ٿيا ۽ سڄو مرڪزي بلوچستان اثر انداز ٿيو

26 جنوري 2001ع تي پاڇائو (گجرات) ۾ 7.6 درجي جو زلزلو $23^{\circ} 46' N, 70^{\circ} 32' E$ ڊگھائي ويڪرائي ڦاڪ تي 22 ڪلوميٽرن جي اونهائيءَ مان اُڀريو. ان آفت سبب گجرات (هندستان) ۽ سنڌ ۾ 12,000 کن ماڻهو مارجي ويا. ڪڇ ۽ سورٺ ۾ علائقن ۾ گهڻو نقصان ٿيو ان جو اثر مڌيا پرديش، مهاراشٽر ۽ راجستان ۾ به ٿيو جهڙوڪو بنگلاديش تائين محسوس ڪيو ويو. هن ڀونڄال ۾ به ڪڇ ۽ سنڌ جي ٿر ۾ زمين ڦاٽڻ جا واقعا سامهون آيا. انهن واقعي سان ڪن هنڌن تي وڏا کڏن جهڙا



When the earth was torn apart, big holes appeared in the Ruins of Kutchh from where oozed poisonous water spreading devastation all around.—STAR photos

سوراخ پيدا ٿي پيا
جن مان زهريلو
گرم پاڻي گپ
وانگر ٻڙڪندو
رهيو

1 نومبر
2002 گلگت-استور

خطي ۾ 35°
 $540' N, 74^{\circ}$

$640' E$ ماڳ تي 33 ڪلوميٽرن جي اونهائيءَ تي آيل هن زلزلي سبب قراقرم شاهراه ۽ ٻئي علائقي ۾ ڇپون ڪريون ۽ رستا بند ٿي ويا.
3 نومبر 2002 ۽ وري 20 نومبر 2002 تي گلگت-استور ۾ هڪٻئي پٺيان 5.3 ۽ 6.3 جا زلزلو آيا.

8 آڪٽوبر 2005ع تي چنجر ڏينهن صبح جونائين وڳي پاڪستان جي اترين علائقن ۾ قيامت جهڙو زلزلو آيو جنهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ 1,00,000 ماڻهو اجل جو شڪار ٿي ويا ۽ چار لک ماڻهو متاثر ٿيا. 7.6 درجي واري هن زلزلي جو مرڪز اسلام آباد کان ڪجهه ئي اتر ۾ فقط 10 ڪلوميٽر جي اونهائيءَ مان اُڀريو ۽ بالا ڪوٽ، مظفر آباد، هزاره، مانسهره ۽ سرينگر سميت پاڪستان جي اڪثر خوبصورت ماڻهن ۽ ڪشمير ۾

ممڪن آهي ته سنڌو ثقافت جي ابتدائي وقت ۾ يا ان کان به اڳ (3500 قبل مسيح کان به اڳ) سنڌ ۾ پاڻيءَ جي پوڄا رائج هئي. ان کان پوءِ 1650 قبل مسيح ۾ جڏهن موسمي حالتون بدليون ۽ خشڪ مند ڦاٿڻ لڳي، تڏهن پاڻيءَ جي ديوتا جي اهميت ۽ پوءِ اڃا به وڌي وئي هوندي. اهو پنٿ آرين جي آمد تائين خوب رائج هوندو.

موهن جي دڙي جي تهذيب مان لڌل مهرن جو ڪهاڻيون ۽ ديوتا هڪ پڪي پختي فطرت ڏانهن راغب مذهب جي نشاندهي ڪن ٿيون. اهي ديوتا ۽ ديويون بعد ۾ آريائي ديوتائن سان گڏ وڃڻ تي 825-1000 قبل مسيح کان نئين صورت وٺي بيٺا ۽ انهن جو نالا ڏنو ۽ ڪالي طور سامهون آيا. وقت سان مقامي ڪارن ديوتائن ۽ ڪارين ديوين کي اڇو آريائي رنگ روپ ۽ نالا ڏنا ويا. اهو اتر اولهه کان آيل تهذيبن سان ميلاپ سبب ٿيو. سنڌ ۾ آرين جي آمد کان اڳ ئي جوڳ تهسپا، جوڳي ديوتا/ ديوي، اڌ شينهن— اڌ ماڻهو ۽ جهنگلي سان ماريندڙ ديوي موجود هئي، جنهن کي هاڻي ڏرگا جو نالو ڏنو ويو آهي. ان سان گڏ ٻيهر جي وڻ کي به تقدس حاصل هو. ساڳي طرح سواستيڪا جو نشان مهر ڳڙه مان به مليو آهي. يعني ڀاڳ جو اهو نشان اولهه يا اتر جي اثر کان گهڻو گهڻو اڳ هن خطي ۾ موجود هو.

لڳ ڀڳ 1000 قبل مسيح ۾ جڏهن برهمڻ سماج پوريءَ طرح حاوي ٿي ويو، تڏهن ڳئونءَ جي پوڄا کي زور وٺايو ويو. اهڙو اشارو مهاڀارت ڪٿا ۾ اُتار ديوتا ۽ شري ڪرشن جي وچ ۾ هليل تڪرار مان ملي ٿو. جڏهن شري ڪرشن عوام کي اُتار ديوتا (جنگ جو ديوتا، جنهن جو هٿيار ڪوڙ آهي) جي پوڄا ڪرڻ بدران ڳئونءَ جي پوڄا ڪرڻ لاءِ چيو. گوشت خوري خاص ڪري ڳئونءَ جو گوشت کائڻ تي پابندي وڌي. ان ريت ڌنارڪو زرعي سماج پوري طاقت سان اڳتي وڌيو ۽ ذات پات جو نظام اڳي کان وڌيڪ گهرو ٿي ويو.

اڳتي هلي، هندستان ۾ برهمڻن جي خلاف جين مت ۽ ٻڌ مت واريون تحريڪون اٿيون، ۽ سنڌ به ٻڌ مت جي رنگ ۾ رڳجي وئي. سنڌ ۾ ٻڌ مت جي گهڻن استوپائين ۽ وهارن جا کنڊر ۽ ماڳ مليا آهن. جڏهن محمد بن قاسم سنڌ فتح ڪئي، ان وقت سنڌ جو عوامي مذهب ٻڌ مت هو.

سنڌ جو جابلو پاسو 500 قبل مسيح کان 325 قبل مسيح تائين ايران جي زرتشتي مذهب جي اثر هيٺ رهيو ۽ ڪجهه وقت لاءِ يوناني قابض ٿيا، پر انهن

دورانن، عاضي ۽ خارجي مذهبن سنڌ جي ثقافتي رنگ تي گهڻو اثر نه وڌو (جڏهن سکندر سنڌ آيو ان وقت به سنڌو ماڻھو ۽ پر ٻڌ مت موجود هو).

ثقافتون ۽ تهذيبون:

سنڌ ڪوهستان ۾ ان وقت به انساني سرگرميون هيون، جڏهن سنڌ جا ميدان سمنڊ هيٺ هئا. اها قدرتي ڳالهه آهي ته ان زماني ۾ ماڻهو رولاڪ شڪارين واري سماج جي صورت ۾ کيرتر ۽ ان سان لاڳاپيل ٽڪرين تي رهندا هئا، ۽ برفاني دور کان پوءِ چشمن وٽ ڌنارڪو ۽ ابتدائي زرعي سماج ٻڌائون سنڌ يا پرياسي ۾ هن مهل تائين لڌل قديم ترين آبادي مهر ڳڙھ (بولان، سبي) واري آهي، جيڪا لڳ ڀڳ 6000 ق.م. پراڻي آهي. سنڌ ۾ آمري ثقافت 3500-4000 ق.م. جي آهي پر گاجي شاهه وٽ واقع ماڙي ڪڙ (پياري جي ماڙي) ماڳ لاءِ ڊاڪٽر لوئس فليمر جو خيال آهي ته اهو 4000 سال اڳ جو ماڳ ٿي سگهي ٿو اهي جابلو ثقافتون آهن، ميداني سنڌو تهذيب پوءِ جو واقعو آهي. ڪوهستان مان هن مهل تائين ڪوڙ سارا تاريخ کان آڳاٽا ماڳ لڌا ويا آهن، انهن مان ڪن جي فهرست ڪجهه هن ريت آهي:

اوائلِي سنڌو ثقافت ، آمري	3750-3350 قبل مسيح
ڪوٽ ڏيجي	3350-2500 قبل مسيح
هڙپاڻي، سنڌو تهذيب اسريل سنڌو ثقافت	3750-3350 قبل مسيح
موهن جو دڙو	3350-2500 قبل مسيح
جهڪر جو دڙو ، زوال پذير سنڌو ثقافت	1650-1300 قبل مسيح
جهانگر	1300-950 قبل مسيح

انهن ثقافتن جو عالمي طور مڃيل نشانين هن ريت آهن:

Λ	=	آمري Amrian
H	=	هڙپا يا موهن جو دڙو
PH	=	هڙپا کان پوءِ، جهوڪر ۽ جهانگر
K	=	ڪوٽ ڏيجي

ڏسندي ئي ڏسندي عمارتون ڊهي پت ٿي ويون، ۽ ماڻهو وڏين ڇپن هيٺان ڊهجي مري ويا، ۽ زندهه بچيل ماڻهو مڙدا پوري پوري پورا نه پيا.

سندو ۽ سمنڊ

اير. ايڇ پنهور صاحب Shepard ۽ Curry جي ٿيل اڀياس (Oceanography Vol; IV, 1967) جي بنياد تي تجويز ڪري ٿو ته 10,000 سال اڳ سندوءَ جا ميدان 125 ڪنٽور (contour) سطح تائين سمنڊ ۾ ٻڌل رهيا هوندا ۽ جيڪڏهن سندوءَ جا ميدان موهن جي دڙي واري زماني کان هن مهل تائين 13 فٽ مٿي ٿيا آهن ته ان جو مطلب اهو ٿيندو ته سمنڊ 10,000 سال ق. م ۾ 160 جي ڪنٽور سطح يعني اڄوڪي لاڙڪاڻي وٽ هو. سن 11,500 ق. م يا 9,500 ق. م ۾ سمنڊ هاڻوڪي رُڪ اسٽيشن وٽ هوندو. ملتان وارو علائقو 20,000 ق. م ۾ سمنڊ هيٺ هو تقريباً اها ئي ڳالهه ايڇ جي ويلز 'ڊي آئوٽ لائن آف ورلڊ هسٽري' ۾ نقشن ذريعي سمجهائي آهي ته اڄ کان 50,000 سال اڳ سندو درياھ ڪالا باغ وٽ سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪندو هو. سڄي سندو ۽ گنگا ماڻهيون سمنڊ هيٺ هيون ۽ 25,000 سال اڳ سندو درياھ جو ڇوڙ سنڌ جي اڄوڪين سرحدن (لڳ ڀڳ ڪشمور) وٽ هو يعني اڄوڪي سنڌ جي سڄي ميداني علائقي مٿان 25,000 سال اڳ سمنڊ چوليون هڻندو هو (۽ ماڻهو جبلن ۽ ٽڪرين تي رهندا هئا).

مٿين مشاهدن جي روشنيءَ ۾ پنهور صاحب تجويز ڪري ٿو ته ان صورتحال ۾ سنڌ جي ميدان يا ٿر ۾ پٿر جي دور جي ڪا به اوائلي يا وچولي زماني جي آبادي لازمي طرح ڪيئي فٽ هيٺ زمين دفن هوندي. جيڪڏهن ڪنهن ٽڪريءَ تي اهڙا آثار بچيل هوندا ته اها اڄوڪي سامونڊي سطح کان 450 فٽن کان اوچي هوندي... تقريباً 20,000 هزار سال اڳ ملتان تائين سنڌ جا سمورا ميدان، سڄو ٿر ۽ راجستان جو اولهه وارو ڀاڱو لازمي

طرح سمنڊ هيٺ هوندو" پنهور صاحب اهو مشاهدو هڪ لک سالن جي سامونڊي سطح جي ريكارڊ کي نظر ۾ رکي پيش ڪيو آهي. اهو ريكارڊ هن ريت آهي:

- 5,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 3 ميٽر مٿي هئي.
- 10,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 37 ميٽر مٿي هئي.
- 20,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 120 ميٽر مٿي هئي.
- 30,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 30 ميٽر مٿي هئي.
- 40,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 90 ميٽر مٿي هئي.
- 50,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 130 ميٽر مٿي هئي.
- 60,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 90 ميٽر مٿي هئي.
- 70,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 52 ميٽر مٿي هئي.
- 80,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 30 ميٽر مٿي هئي.
- 90,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح کان 15 ميٽر مٿي هئي.
- 100,000 سال اڳ سمنڊ جي سطح هائوڪي سطح جي لڳ ڀڳ هئي.

ڪيرٿر جي جاگرافي

کيرٿر جون چوٽيون، لک، ماٿريون ۽ نئون (مختصر تعارف)

ونگولگ کان گاج تائين

کيرٿر جي ڪن خاص وصفن مان هڪ هيءَ به آهي ته ان جون ٽي قطارون آهن. اوڀر واري قطار جون اولهه واريون لاهيون اُپڪريون ۽ خطرناڪ آهن. ٻي قطار جي ڇت سڌي پر ان پاسا گول لاهيارا آهن ۽ انهن ۾ اونهيون نئون ۽ نالا آهن. ٽين قطار وسيع پوئين واري آهي ۽ ان جي ڪن حصن ۾ پنڊ پھڻي چُن پٿر جامر آهي.


سنڌ جو ڪوهستان اٽڪل 7000 چورس ميلن تي پکڙيل آهي. سنڌ جي حدن اندر کيرٿر جي پنهنجي ڊيگهه اُتر کان ڏکڻ رخ ۾ اٽڪل 250 ڪلو ميٽر آهي. هونئن کيرٿر سلسلو بلوچستان ۾ خضدار تائين پکڙيل آهي ۽ جتي سليمان جبل جو سلسلو ختم ٿئي ٿو، اتان کان سنڌ جي اولهندي سرحدن جي محافظ طور کيرٿر جو هي سلسلو هڪ ديوار وانگر بيٺو آهي. ان قدرتي ديوار جي سراسري اوچائي 5000 فٽ ۽ وڌ ۾ وڌ اوچائي 7112 فٽ (بندي جي قبر وٽ) آهي. سنڌ ۾ عام طرح ’ڪٽي جي قبر‘ واري چوٽيءَ کي سڀ کان اوچي چوٽي سمجهيو وڃي ٿو پر ان جي اوچائي 6877 فٽ آهي (هي اوچائيون لئمبرڪ ۽ بلانفورڊ جون ڏنل آهن).

کيرٿر جو سڄو سلسلو ڪرنگهيدار آهي. سڄي سلسلي ۾ فقط هڪ جاءِ اهڙي آهي جتي اهو سلسلو آريار وڊجي به اڌ ٿيو آهي. اهو ڪمر طاقتور نڌ گاج ڪيو آهي جيڪا اولهه واري حصي مان هڪ اڃا به اُتانهين نڌ جو پاڻي کڻي منڇر ڏانهن ڏوڪي ٿي. خود گاج ڪو سولو لک نه آهي. جيڪڏهن ايئن هجي ها ته پوءِ مرڪزي سنڌ تي ان لک کان هلائون ٿين ها. کيرٿر سنڌ جي اولهه ۾ زبردست حفاظتي ديوار بڻجي بيٺو آهي، جنهن ۾ مجموعي طور اهڙا ڏهه ٻارنهن لک آهن جتان لاڏو اُنن جي ذريعي ماڻهو آريار اچي وڃي سگهن ٿا. انگريزن جي اها معلومات ڪافي حد تائين درست آهي ته

انهن مان اڌو اڌ لڪ هڪ ٻئي جي ويجهو آهن. کيرتر جي لڪن، چوٽين، ماڻرين ۽ نئين جو مختصر احوال ڪجهه هن ريت آهي:

ونگو لڪ ۽ سائينءَ جي نئ:

کيرتر ته ڪرچات کان خضدار تائين هليو ويو آهي پر جيڪڏهن اسان 'سائينءَ جي نئ' ۽ 'ونگو لڪ' جيڪو شهادت ڪوٽ کان ڪڙو (ڪرخ) ڏانهن ويندڙ رستي تي پوي ٿو (۽ بلوچستان جي حدن ۾ آهي) کي، کيرتر جي



جاگرافيائي ۽ تاريخي حدن ۾ شامل سمجهون ته خود 'سائينءَ جي نئ' ۽ 'ونگو لڪ' کي به وڏي اهميت ملي ٿي. ونگو لڪ اتر سنڌ کي خضدار سان ڳنڍي ٿو. هي هڪ وڏو روڪڙ، اُڀو ۽ پَوائتو لڪ آهي، پر ان تي اڄ به ايتري ترينڪ آهي جو ان لڪ کان فور وهيل گاڏيون ۽ لاريون چنگهي چنگهي چڙهي وڃن ٿيون. 'سائينءَ جي نئ' جي ڪنڊن ڏانهن ڏسبو ته اتي هنڌ هنڌ ڦٽل ۽ قديم آبادين جا نشان ملندا. جيئن ته هاڻي اڳي جهڙيون موسمي حالتون نه آهن، ان ڪري اهي ٻڌ ڦٽي ويا آهن، ۽ علائقي جا ماڻهو نئ ۽ ڍورين ۾ فقط مال ڪاهيندا ۽ چاريندا نظر اچن ٿا. اها نئ برسات ۾ ڏاڙهياري جبل

جي اولھ پاسي کان شروع ٿي اتر- اوڀر رخ ۾ گڙڪاٽ ڪندي هلي ٿي ۽ سَوَٺ وٽ جبلن مان نڪري ڪاڇي جي ان حصي ۾ پوي ٿي، جيڪو سياسي نقشي تي بلوچستان جو علائقو آهي. هن نڙ ۾ کير ٿر جي چوٽيءَ تان ڇڄل ۽ ڊنل ڇيون ڀريون پيون آهن ۽ سُڪل نڙ ۾ اڇاڻ جو احساس ڪجهه وڌيڪ ئي ٿئي ٿو. نڙ ۾ پاڻيءَ جو مستقل چشمو ڇڳو پنڌ جاري رهي ٿو پر ڪاڇي کان گهڻو اڳ زمين ۾ جذب ٿيو وڃي. ’سائينءَ جي نڙ‘ سَهڻي نڙ آهي. کيرٿر جو اڇو پٿر مارل (marl) آهي، خبر نه آهي ته پائوڊر جهڙن نفيس ذرڙن تي ٻڌل ان لسي پٿر طرف جبالجستن گهڻو ڌيان ڇو نه ڏنو آهي! ان جي ٻاهرين رنگت تيز آس ۽ موسمي حالتن ۾ نامي جهڙي ٿي وئي آهي ۽ هي پٿر وڏين وڏين ڇپن جي صورت ۾ هڪٻئي مٿان سٿيو پيو آهي. کيرٿر جا ذرڙ، لوڳها ۽ ڦوڙ ان تي ئي مشتمل آهن.

ميان گڻ/ ميان گنڊ:

ان کان پوءِ ڏکڻ پاسي ’ميان گڻ‘ چوٽي آهي جنهن کي ’ميان گنڊ‘ به چون ٿا، هيءَ 5250 فٽ اوچي چوٽي آهي. نڙ ڪينجي اتان شروع ٿئي ٿي اوستائين وڃڻ جي واٽ آهي، ۽ ڪي نوحوان شوقين شڪاري اتي وڃي محفلون رچائيندا آهن.

تشانگي:

ڏاڙهياري جي اتر ۾ هڪ چوٽيءَ جو نالو تشانگي آهي، يعني تن چانگن يا شاخن واري. ان جي مٿان بيهبو ته هيٺ ناقابل عبور اونهائيءَ ۾ جبل جي ڌرڙ يا ڦوڙ ۾ پاڻيءَ جو وڏو ڪُنڀ نظر ايندو آئون ان ماڳ تائين نه ويو آهيان البت شڪاري دوست ٻڌائين ٿا ته اتان هيٺ لهڻ جو رستو آهي ئي ڪونه ۽ ان ڪُنڀ ۾، جيڪو تقريباً 4500 فٽ (سمند جي سطح کان) مٿي آهي، ۾ سيسر/ گهڙيال (alligator) جو نسل باقي آهي (تازي اطلاع مطابق شڪارين انهن کي گوليون هڻي ماري ڇڏيو آهي). مون جيڪو به شڪاري تشانگي تان ٿي موٽيل ڏٺو آهي، هن کي ڏاڍي اُتساه ۾ ڏٺو آهي. احوال ڏيڻ مهل هن جون اکيون پيون ڇمڪنديون آهن. هتي ئي ان فرضي ڊيگ جو قصو مشهور آهي، جيڪا ڇت ۾ تنگيل آهي پر مٿان نظر نه ايندي آهي.

مَجل ۽ وَنگو:

لُمبرڪ 'ميان گُڻ' کان پوءِ مَجل (Machhil) ۽ رَنگو (Rangu) چوٿين جو حوالو ڏنو آهي. شايد هُو وَنگي لڪ ۽ مَجل چوٿين جي ڳالهه ڪري ٿو. ان کان پوءِ ڏاڙهياري وٽ ڪوچن جو ذڪر ڪيو اٿس.

نُءُ ڪينجي، وهندڙي:

'سائين جي نُءُ' کان پوءِ ڏکڻ طرف کيرٿر جي اوڀر کان نڪرندڙ پهرين وڏي ۽ اهم نُءُ ڪينجي آهي، جيڪا ميان گُڻ کان ڏکڻ ۾ لڳ ڀڳ مَجل يا تشانگي وٽان شروع ٿئي ٿي. اها 5250 فٽن جي اوچائيءَ کان لهي ٿي. اڀڄ تي لُمبرڪ ان نُءُ کان ايترو متاثر ٿيو هو جو ان کي 'دي گريٽ ڪينيان آف سنڌ' جو نالو ڏنائين. نُءُ ڪينجي اٽڪل 50 ڪلوميٽر سفر ڪري غيبي ديري لڳ ساروه (Saroh) ڏيندڙ ۾ چوڙ ڪري ٿي.

ڏاڙهياريو ۽ ڪٽي جي قبر:

ڏاڙهياري وٽ کيرٿر جبل جي ڪرنگهي تائين ڪاخ کان 'گهٽو سور' لڪ جي وات سان اُت تي سوار ٿي پهچي سگهجي ٿو. ڏاڙهياري جا ماڻهو اُنن ۽ گڏهن سان نُءُ شهر جي وات سان شاهه گودڙي يا وري نُءُ سیتا جي وات سان وارھ يا غيبي ديري ايندا ويندا آهن. البت ڏاڙهياري کان ڪٽي جي قبر تائين 900 کن فٽ اوچي چوٽي چڙهڻ لاءِ پيرين پنڌ کان سواءِ ٻيو چارو نه آهي. ڏاڙهياري جي چوٽيءَ تي ڪي قدرتي ميدان آهن جن تي پوکي ٿئي. انهن مان هڪ ايترو وڏو آهي جو گذريل حڪومتن جي ڪن صاحبن مقامي ماڻهن کي اتي جهاز لاهڻ جا خواب ڏيکاريا هئا. انهن مان هڪ پوئو تقريباً 6000 فٽن جي بلنديءَ تي چوٽائي ميل جيترو آهي. ان ئي ميدان وٽ اها 1000 کن فٽ اوچي چوٽي آهي جنهن تي 'ڪٽي جي قبر' آهي. اها هڪ وفادار ۽ غيرتمند ڪٽي جي قبر چئي وڃي ٿي، جنهن جي هڪ الڳ ڪهاڻي آهي. ڏاڙهياري جي اوڀر ۽ ڏکڻ کان نُءُ سیتا، نُءُ مزاراڻي ۽ نُءُ شهر (ڍلڻ جي ڏن پُرو) نڪرن ٿيون.

نہ سیتا، نہ تني:

کينجي کان پوءِ ڏکڻ ۾ اهر نہ سیتا آهي جيڪا ڏاڙهياري کان لهي پينئرو ۽ گکر جبلن مان وراڪا ڏيئي زرخيز سیتا ماڻري ناهيندي، زڙدن مان گذري، نقشي موجب ڪاڇي جي ميري ڍنڍ ۾ چوڙ ڪري ٿي.

نہ مزاراڻي:

نہ سیتا کان پوءِ ڏکڻ ۾ نہ مزاراڻي آهي، جيڪا ڏاڙهياري جبل جي پاڙ مان ميرھڏ کان شروع ٿي حمل ڍنڍ ۾ چوڙ ڪري ٿي. هن سوڙهي ۽ ڪڻين سان ڀريل برساتي نديءَ لاءِ چون ٿا ته سنڌ جي سڀ کان سُهڻي نہ آهي پر ان لحاظ کان بي حد ڏکي آهي جو ان ۾ گهوڙي ساري يا شُتربانيءَ جي گنجائش نہ آهي. ان جي تري ۾ وڏيون وڏيون جنبنون ۽ ڇيون پکڙيل آهن. تاريخ جي ورقن ۾ هي سڀئي برساتي نديون مختلف ڍنڍن ۾ چوڙ ڪن ٿيون، پر هاڻي ايئن چئي سگهجي ٿو ته مٿيون ٽيئي ڍنڍون وسيع حمل جو حصو آهن ڇاڪاڻ ته بندن ۽ سر نالن جي ٻوڙ کان پوءِ سڀ ڍنڍون پاڻ ۾ ملي هڪ ٿي ويون آهن. پاڻي چڙهي ٿو ته وشال ڍنڍ ٿيو پوي، ۽ لهي ٿو ته هر ڍنڍ پنهنجي پنهنجي حد ۾ موٽي اچي ٿي. ڍنڍن جي ان شاهي ميلاپ جو سلسلو فریدآباد تائين هليو اچي ٿو جيڪو شاهه گودڙي جي آمهون سامهون آهي.

نہ دِلان :

مزاراڻيءَ کان پوءِ نہ دِلان جو نظام آهي جنهن ۾ مختلف هنڌن تي نہ شهر، نہ ڪيهرجي، راڌ، سگرو ۽ سالاريءَ جو پاڻي پوي ٿو اهو سڄو علائقو ڏاڙهياري کان هرياب لڪ تائين پکڙيل آهي. انهن سڀني نئين جو رُخ شاهه گودڙي طرف آهي ۽ انهن جو گڏيل وهڪرو نہ دِلان سڏجي ٿو.

’ڪوري جي مٽ‘:

ڪتي جي قبر کان پوءِ ڏکڻ طرف هي ڪرنگهو هوريان هوريان مٿي ٿيندو ٿو وڃي ۽ 15 کان 20 ڪلوميٽرن جي پنڌ تي ’ڪوري جي

مُت‘ نالي هڪ چوٽيءَ تي پهچي ٿو جيڪا ڪُٽي جي قبر کان فقط 300 فٽ هيٺ آهي.

هرياب لڪ:

‘ڪوري جي مُت‘ کان هڪدم پوءِ 2000 فٽن جي لاهيءَ تي هرياب لڪ وارو لنگهه آهي. الٽمبرڪ ان کي سنڌ جي اترين جبلن جو سڀ کان اُترين لاڏو اُنن جو لنگهه سمجهي ٿو پر اهو درست نه آهي ڇاڪاڻ ته لاڏو اُن کينجي وٽان، سيتا ۽ نئو شهر کان به ڏاڙهياري وٽان (‘گهٽو سور لڪ‘ ۽ تشانگي واري پاسي کان) به جبل اُڪري وڃن ٿا. اها ٻي ڳالهه آهي ته اهي ڪجهه ڏکيڙا لنگهه آهن. هرياب لڪ کي شاھ گودڙي جو لڪ به چون ٿا. ممڪن آهي ته شاھ گودڙيو ڪلهوڙن جي زماني ۾ بنيادي طرح ان لڪ يا ايراضيءَ جو رکوالو جرنيل هجي!

بندي جي قبر:

ڏاڙهياري کان 15-20 ڪلوميٽر ڏکڻ پاسي، هرياب لڪ جي ڏکڻ واري چوٽي ’بندي جي قبر‘ سڏجي ٿي، ۽ اها ڪُٽي جي قبر کان وڌيڪ اوچي يعني ڪُل 7112 فٽ مٿي آهي. ’بندي جي قبر‘ جي ڪهاڻي (سني سوران ڳوٺ جي) ميرچاڪر خان رند ۽ (ڀاڳناڙيءَ جي) گهراڻي خان لاشاريءَ جي وچ ۾ ٽيهن سالن تائين لڳل لڙاين سان ڳنڍيل آهي. روايت موجب اها بندي يا بنديءَ جي قبر (قصي جي مکيه ڪردار) مائي گوهر مهيري جڻ (مدي بارگ) جي آهي. جنهن جو ڪو به ڀاءُ ڪونه هو پر پنهنجن ٻن سؤٽن مير مبي خان ۽ مير عمر خان سان پنهنجي ڳوٺ مورھ ۾ رهندي هئي. (هي قصو سنڌ جي اتر اولهه ۾ ڪڇيءَ جي ناڙيءَ واري علائقي جو آهي ۽ هي جنگيون پندرهن صديءَ جي پڇاڙي يا سورهين صديءَ جي شروع ۾ لڳيون هيون). نئين تحقيق مطابق گهراڻي خان لاشاريءَ جي قبر نئو گاج جي ڪنڌيءَ تي ’يارو سائين‘ جي مزار کان اتر پاسي آهي، ۽ گهراڻي خان جي پيءُ سخي نوز بندڪ جي قبر ٽنڊي رحيم جي ڀرسان آهي.

هرياب، هراڙ ۽ ڏمرو:

مٿي اولهه پاسي ڪچرڪ تائين هلندڙ ڪرنگهي سان اوڀر پاسي پنجن کان سڍا ٽي چار هزار فٽن جي بلندين واريون جابلو ماڻيون هل استيشنون ٿيڻ جي لائق آهن، انهن مان ڪٿي جي قبر يا ڏاڙهياري جو ذڪر ته برابر ايندو رهندو آهي، پر خبر نه ٿي پوي ته هن سلسلي ۾ موجود هراڙ ماڻريءَ جو ذڪر ڇو نه ٿو ٿئي! شايد سياسي مفادن جو مسئلو هجي يا عملدارن جي ذاتي پسند يا ناپسند جو ڪو عمل دخل هجي! نه ته تشانگي ۽ ڏاڙهياري کان گورڪ بلڪه جنگو ٺوڻ تائين جو بڪو علائقو ٿڌو ۽ نهايت پُر فضا آهي، هتي هنڌ هنڌ جابلو تفريحي ماڳ ٺهي سگهن ٿا. مسئلو فقط پاڻيءَ جي بندوبست جو آهي، جيڪڏهن نيت صاف هجي ته ڪوبه مسئلو ڪونه آهي.

لئمبرڪ جو چوڻ آهي ته کيرٿر ۾ اهڙا پنج لک آهن جيڪي هڪٻئي کي تمام ويجهڙا آهن. هُو شايد ’هرياب‘ ۽ ان کان ڏکڻ طرف ڪجهه ٻين لکن ڏانهن اشارو ڪري ٿو.

ڪچرڪ:

هرياب کان پوءِ جبل ٻن ڦاڪن ۾ ورهائجي ٿو. هي کيرٿر جو عجيب نظارو آهي، جنهن جي وچ ۾ پوکيءَ لائق اتاننهن ۽ پيالي نما سرسبز ماڻر آهي. اولهه واري ڦاڪ اوڀر واري ڦاڪ کان اٽڪل 1000 فٽ بلند آهي. ٻنهي شاخن جي وچ واري تراڻي ارضياتي لحاظ کان نارڙي فارميشن جي پٿريلِي مواد سان سٿيل آهي. ٻئي شاخن وري ڪچرڪ چوٽيءَ وٽ ملي هڪ ٿي وڃن ٿيون. ان کان پوءِ ڏکڻ ۾ گاج جو وهڪرو آهي.

پٽ جو لڪ:


نٺ گاج جي اُتر ۾ ڪچرڪ چوٽي آهي. هي لڪ ڪچرڪ ماڻريءَ مان لنگهي ٿو ۽ کيرٿر جي اولهه ۾ واقع پٽ راڙ ماڻريءَ ڏانهن وٺي وڃي ٿو. هي لڪ ڦوسي لڪ ۽ گرو لڪ جي پيٽ ۾ ڏکيو آهي.

تنڪ ۽ لوڙھ جو لڪ:

هي بہ جدا جدا ماڳ آھن 'تنڪ' اھا جاءِ آھي جتي نھ ڪولاچيءَ جو نالو بدلجي نھ گاج ٿئي ٿو ۽ سنڌ بلوچستان جي حد ٺھي ٿي. لوڙھ لڪ ڪچرڪ کان اولھہ طرف بلوچستان جي حدن ۾ واقع آھي. ھي لڪ جيتوڻيڪ تمام اُٿانگو ۽ سوڙھو آھي. پر ٻين جي پيٽ ۾ گھڻو پراڻو ۽ آباد رھيو آھي. لوڙھ لڪ 'تنڪ' (گاج جي اولھہ واري حد) کان 20 ڪلوميٽر مٿي 'نھ ڪولاچيءَ سان واقع آھي. جنھن جاءِ تي نھ گاج جبل کي وڏي سنڌ ۾ داخل ٿئي ٿي. نھ ان ھنڌ ھڪ اونھو ڪُنڀ بہ ناھيو آھي جنھن کي 'تنڪ ڪُنڀ' چون ٿا. 'تنڪ' ماڳ گاج بنگلي کان 30 ڪلوميٽر اولھہ ۾ آھي. ھي لڪ نال ۽ وَڏ جي علائقي کي سنڌ سان جوڙي ٿو. زيدي لڪ ھتان 100 ڪلوميٽر پنڌ تي اتر اولھہ ۾ آھي. برساتن ۾ ھي لڪ بند ٿي وڃي ٿو. نھ گاج ۾ موجود قديم آثارن مان لڌل ٺڪرا ٿو اڪثر نال-آمري ثقافت جو آھي.

نھ گاج:

ھيءُ نھ کيرٿر جي اولھہ ۾ ڪافي پري کان نھ ڪولاچي جي نالي سان اُتانھن جبلن کان لھندي کيرٿر کي ٻن حصن ۾ آريار وڏي پنھنجو لنگھہ ناھي اوڀر وٽان سنڌ جي ڪاڇي ۽ جبل جي وٽ وٺي، ڏکڻ رخ ۾ ھلندي، منڇر ۾ ڇوڙ ڪري ٿي. گاج جو پنھنجو پاڻي وڃ جو عاليشان ۽ وسيع نظام (fan) آھي. جھڙو سنڌ ۾ ڪنھن ٻي نھ جو نھو ڏسجي. گاج جنھن ھنڌ تان سنڌ ۾ داخل ٿئي ٿي، ان ماڳ کي 'تنڪ' (تنڪ = پاڻيءَ جي سوڙھي گذرگاھ) چون ٿا. نھ اتي ڪجھہ آبشار ناھي ٿي. گاج جي لنگھہ وٽ کيرٿر جي چُن پٿر ۾ ڌرڙ آھي، جنھن جا پاسا اُڀا آھن ۽ اھو وڏين چين سان رنڊيل ھڻ ڪري لنگھہ لائق نہ رھيو آھي. ان ڌرڙ جي پٺھي پاسن کان جبل تي لڪ آھن.




گاج جو پاڻيءَ وچ وارو نظام لڳ ڀڳ 200 چورس ڪلوميٽرن ۾ پکڙيل آهي ۽ بلوچستان ۾ گاج جي ڪيچمينٽ ايراضي 6400 چورس ڪلوميٽر آهي. گاج جي طاس ۾ هر 15-20 سالن کان پوءِ 24 ڪلاڪن دوران ڏهه انچ برسات پئجي سگهي ٿي.

هن مهل تائين ذڪر هيٺ جبلن جي اوڀر ۾ سراسري طور چئن چئن ميلن تي نوڪدار ٽڪرين جو سلسلو آهي، جيڪا تريشري دور جي پڇاڙيءَ واري جوڙجڪ آهي. اها ڪن هنڌن تي نمولائٽ چُن پٿر مٿان آيل آهي ۽ ناڙي سلسلي سان مشهور آهي. اها ڪجهه ڦڪي ۽ ڳاڙهي رنگت جي چُن پٿر ۽ سنهي ريتيلي پٿر جي بناوت آهي. گاج فارميشن عمر جي لحاظ کان سنڌ جي جبلن ۾ ٻئي نمبر تي پراڻي آهي. ان فارميشن جا تهه سخت ڳوڙهي ڪڪي چُن پٿر جي پٿين سبب نمايان آهن.

منچر:

منچر ڍنڍ لڳ ڀڳ $67^{\circ} - 34' E$ کان $67^{\circ} - 43' E$ ۽ N



23 - 26° کان N 26 - 26° تائين پکڙيل آهي. اها اڄ کان 10,000-8,000 سال اڳ هولوسين (Holocene) عھد ۾ ان وقت ٺھي، جڏھن سنڌو نديءَ اُلهندي ناري وارو رستو اختيار ڪيو. ان علائقي ۾ سنڌوءَ جو وهڪرو جبل جي ويجهو ۽ متوازي هو. ان ئي سڌ ۾ نيٺ اها جاءِ اچي ٿي جتان بٽي ۽ لڪي جبل جي سلسلن جي اُتر وارو حصو شروع ٿئي ٿو. هن جاءِ تان ڏکڻ يا اولھ ۾ ڪا واٽ نه هئڻ سبب درياھ گُوني ڪنڊ ۾ اوڀر جو رُخ ڪيو. ان ٽڪي عمل ۾ اولھ ڏکڻ واري ڪنڊ کان زمين ڪورجي وئي ۽ وسيع ڍورو يا ڪُنڀ ٺھي پيو.

سنڌو نديءَ ان وقت کان وٺي اڄ تائين سڄي سنڌو ماڻھو ۽ ٻيٽ ۾ ڪڍي آهي پر اُلهندي ناري کان منچر تائين ان جو مکيه وهڪرو يا ڪا نه ڪا ڇاڙھ سدائين جاري رهي آهي. ان وهڪري سان اونهاري ۾ منچر ڀرجندي آهي ۽ سياري ۾ ڇنڊبي آهي. منچر ۾ سنڌوءَ کان سواءِ نه گاج جو وڏو


پاڻي به پوي ٿو ارضيات جي ماهرن جو چوڻ آهي ته نئ مولا ۽ خود نئ بولان جو پاڻي به ماضيءَ ۾ ان وات سان منچر ۾ چوڙ ڪندو رهيو آهي. هڪ اڀياس موجب منچر جو ترو سنڌونديءَ جي تري کان 20-15 فٽ هيٺ رهيو آهي. اهو ئي سبب آهي جو گذريل صديءَ تائين جڏهن سيوهڻ وٽ سنڌو ۽ منچر جو اُڙل ذريعي ڳانڍاپو هو اونهاري ۾ درياھ جو پاڻي منچر کي ڀريندو هو. ان ريت جڏهن سنڌوءَ جو پاڻي گهٽبو هو تڏهن منچر پنهنجو اضافي پاڻي سنڌوءَ ۾ ڇنڊي ڇڏيندي هئي. هيءَ ڍنڍ ڪنڌين کان تانگهي ٻر وڃ ۾ اونهي آهي. هاڻي درياھي ۽ نئن جي لٽ سبب ڪافي ٿر جي وڻي آهي. سنڌونديءَ تي بئراجون پوڻ کان پوءِ منچر تي ڏکيو وقت اچي ويو ۽ هاڻي اها فقط وڏين ٻوڏن ۾ ڀرجڻ لڳي. سن 1961ع ۾ هڪ وقت اهڙو به آيو جڏهن اها بلڪل خشڪ ٿي وئي هئي. ان کان پوءِ به منچر اڪثر خطرناڪ حد تائين خشڪ ٿيندي رهي آهي.

منچر جي ڊيگهه ويڪر گهٽ وڌ ٿيندي رهي ٿي. آگسٽ جي مهيني ۾ اها 32 X 16 ڪلوميٽر يعني 466 چورس ڪلوميٽرن تي پکڙجي وڃي ٿي ۽ فيبروريءَ ۾ سُڪي اٽڪل 3.5 X 12.5 ڪلوميٽر يعني 42-41 چورس ڪلوميٽر بچي ٿي. بنهه سوڪهڙو ٿئي ته پاڻي وڃي واهڙن جي صورت ۾ بچي ٿو جيڪڏهن ڍنڍ ڀرجي وڃي ته وڃ ۾ اونهائي 20 فٽ به ٿي سگهي ٿي. هن وقت هن ڍنڍ ۾ هڪ ملين ايڪڙ فٽ پاڻي جهلڻ جي گنجائش موجود آهي پر ان کي ٻيڻو ڪري سگهجي ٿو. منچر کي ڏکڻ پاسي قدرتي بند آهي، انڪري جڏهن اها واڌ ڪاٽي ٿي ته اُتر ۽ اتر-اوڀر طرف پکڙجي ٿي.

حمل ڍنڍ:

ڪلهوڙن جي دور واري شهر وارھ کان 13 ڪلوميٽر اولهه ۾ آلهندي ناري جي ڪنهن ڇاڙھ تي، منچر جي ٺهڻ وقت يا ان کان پوءِ (اڄ کان 8000-6000 سال اڳ) وجود ۾ آئي. اها اٽڪل 10 ڪلوميٽر ڊگهي ۽ ٻه ڪلوميٽر ويڪري آهي. ان ۾ نئ ڪنڇي، نئ سيتا ۽ نئ مزاراڻيءَ جا وهڪرا پون ٿا. ڍنڍ جو اضافي پاڻي منچر ڏانهن روانو ٿئي ٿو. هن ڍنڍ ۾ اڌ ملين ايڪڙ فٽ پاڻي جهلڻ جي گنجائش آهي، جنهن کي گڊو بئراج جي مدد

سان ٻيڻو ڪري سگهجي ٿو. في الحال ان کي جابلو نئون ڀرين ٿيون. گهٽ برساتن ۽ ڏڪر جي زماني ۾ اها تمام سوڙهي ٿيو وڃي، جنهن ڪري ان ۾ لُوٽياٽ ۽ زندگيءَ لاءِ نقصانڪار حالتون پيدا ٿين ٿيون، پر جيئن ئي ان ۾ برساتي ندين جو تازو پاڻي اچي ٿو سڄي لُوٽياٽ نيڪال ٿي وڃي ٿي.



انهن ڍنڍن کان سواءِ ساروھ، ڊگھ ۽ لنگھ بہ ساڳئي نظام جو حصو آهن. ڊگھ ڍنڍ تعلقي قنبر ۾ قنبر شھر کان اولھ طرف غيبي ڍيري روڊ سان 10 ڪلوميٽرن جي فاصلي تي واقع آھي۔ ان جي ڪل ايراضي 185 ھيڪٽر آھي. 3 ڪلوميٽر ڊگھي ۽ 2 ڪلوميٽر ويڪري ٿيندي، جنھن ۾ پاڻيءَ جي اونھائي 5 کان 18 فٽ ھوندي آھي. ڊگھ لاءِ پاڻيءَ جو اھم ذريعو وڏا واھ، واھڙ ۽ برساتن جو پاڻي آھي ۽ سمر ۾ وڌاري سان ان جي سطح وڌي ويندي اٿس. لنگھ ڍنڍ $27^{\circ} 30'$ اتر ۽ $68^{\circ} 03'$ اوڀر ڦاڪن تي ، لاڙڪاڻي کان اولھ ۾ 19 ڪلوميٽرن جي فاصلي تي واقع آھي. ايراضي 19 ھيڪٽر اٿس. پاڻيءَ جو مکيہ ذريعو چوماسي جون برساتون آھيس. لنگھ سمنڊ جي سطح کان 50 ميٽر مٿي آھي. ھيءُ بہ سرڪاري ملڪيت ۾ شامل آھي. ھنن ڍنڍن جي پاڻين جو گرمي پد اونھاري ۾ 48 کان 50 ڊگريون

۽ سياري ۾ 17 کان 18 درجا سينتي گريڊ رهندو آهي. ڊگھ ۽ لنگھ ٻئي جھنگلي جيوت کاتي وارن طرفان اعلايل رڪون آهن.

گورک کان لڪي تائين

گاج اتر ۽ ڏکڻ ڪوهستان جو چٽڪ قدرتي سنڌو آهي پر اتر ۽ ڏکڻ ڪوهستان جي بهتر تقسيم منچر جي ڏکڻ طرف لڪي-بدي ۽ -پٽ جبل کان ڪري سگهجي ٿي. ايم ايڇ پنهور صاحب ڏلهه کي اتر ۽ ڏکڻ ڪوهستان جو سنڌو قرار ڏئي ٿو. گاج کان ڏکڻ طرف جابلو خطي جي صورتحال ڪجهه هن ريت آهي: مقامي ماڻهو گاج کان انگئي تائين ڏهه لک ٻڌائين ٿا؛ شڪلوي، مينهون، چوڪڙي، ڪاول، زوڪاڻي، ماچڪو سرينهاڻي، روهيل، ٿوسي، گرو گرو ۽ لوهي (جنگو ٺوٺ).

شڪلوي:

نٺ گاج کان ڏکڻ ۾ شڪلوي چوٽي واقع آهي. هي لڪ گاج بنگلي جي پر پاسي کان شروع ٿي اوستائين وٺي وڃي ٿو. اهوئي لڪ مٿي گورک چوٽيءَ تائين وڃي ٿو. اولهه ۾ ڄموري وڃڻو هجي ته به اهو لڪ ونسو. تمام ڏکيو لڪ آهي پر اتان لاڏو اُٺ ساهيون کڻي مٿي پهچي ويندا آهن. 1995 ۾ جڏهن گورک تي ابتدائي ترقياتي ڪم شروع ڪيو ويو هو ۽ عبدالله شاهه اتي ڪچڙو رست هائوس ٺهرايو. تڏهن آفيسرن کي اتي ڪم ڪار لاءِ هڪ جيب جي ضرورت پئي. سيوهڻ ڊيولپمينٽ اٿارٽيءَ وارن هڪ سوزوڪي جيب جا سڀ پرزا کولي اُن تي لڏيا ۽ شڪلوي لڪ کان جيب اُن تي سوار ڪري مٿي پهچايا هئا. ان جيب کي پوءِ مسترين مٿي ئي ٻيهر ٻڌو ۽ هلائڻ جهڙي ڪيائون.

ڄمورو لڪ:

ڄمورو کيرتر جي اولهه ۽ گاج جي ڏکڻ ۾ واقع آهي. ڄمورو شهر لڪ کان 25 ڪلوميٽر پري اتر اولهه ۾ آهي. هي ڏکيو لڪ آهي.

گورک چوٽي:

ڏکڻ ڪوهستان جي سڀ کان اُتانھين چوٽي آھي، جيڪا گاج جي مٿان ڪَڙ ڪنيو ٻيٺي آھي. اوچائي 5680 فٽ اٿس. انگريز سرڪار سن 1860 ع ۾ ھندستان ۾ بہ جابلو تفریح گاهون (hill stations) ٺاھڻ جي سفارش ڪئي ھئي، ھڪ ھندستان ۾ ڌارجلنگ وٽ ۽ ٻي سنڌ ۾ گورک تي پر سنڌ سرڪار ان سھڻي صلاح تي ڏيڍ صديءَ ۾ عمل نہ ڪري سگھي آھي. ھن رٿا لاءِ ھر ڀيري جيتري بہ رقم منظور ٿئي ٿي، لڳي ٿو تہ حصا پتيون ٿي وڃي ٿي.



ممٿل:

گورک چوٽيءَ کان ڪجهه ڏکڻ اوڀر ممٿل چوٽي گورک کان ٿوري ئي ننڍي آھي. اوچائي اٽڪل 5000 فٽ ھونديس. ممٿل ٻن لفظن جو مرڪب آھي: مَٿر (ھماليائي رڇ) + ٿل (ٿلھو يا چوٽي). ھن علائقي ۾ ڪنھن وقت ۾ مٿن جو ڳڙھ ھو. سنڌ گزيٽيئر موجب گذريل صديءَ جي شروعات ۾ ’ڪُٽي جي قبر‘ وٽ ھڪ مڙ کي گولي ھڻي شڪار ڪيو ويو تہ اھو ھماليائي رڇ نڪتو ھائي مڙ کيرٿر ۾ نظر نٿي اچي پر ان جو نسل ھن وقت کيرٿر کان اولھہ ۾ کڏو جبل ۾ رھي ٿو.

مسافري لڪ (مسفري لڪ):

هيءَ لڪ کيرٿر جي ڪرنگهي نه آهي پر اولهه طرف حب ندي ۽ کيرٿر جي ’لوهي‘ واري علائقي کي پاڻ ۾ ڳنڍي ٿو. لوهيءَ کان ڄموري يا خضدار طرف وڃو ته هي لڪ پار ڪرڻو پوندو.

کاڙل لڪ:

هي لڪ مٿل چوٽيءَ جي ويجهو ٿورو ئي ڏکڻ ۾ اٽڪل 4000 فٽن جي بلنديءَ تي آهي. هي ڪافي مشڪل ۽ غير معروف لڪ رهيو آهي. تازو سن 2006ع ۾ سنڌ سرڪار وڏي مشڪل سان هن وات کان گورڪ هل اسٽيشن لاءِ رستو کڏي مڪمل ڪيو آهي جيڪو واهي پانڌي ۽ نه ٽڪي (ٽنڪي = تنگ = سوڙهي) کان ٿيندو پهچي ٿو. هن لڪ تي اهو نالو (کاڙل يا کاڙل) انڪري پيو جو ڪنهن وقت ۾ ان هنڌ تي ڪنهن شخص کي هڪ نانگ کاڌو (ڪڪيو) هو. هن ئي رستي کان هيٺ ڳڻ چشمو رستي ۾ پوي ٿو. کاڙل کان پوءِ زوڪاڻي ۽ سرينهاڻي لڪ آهن.

روهيل لڪ

هي لڪ کاڙل لڪ کان ڏکڻ ۾ ۽ ڦوسي لڪ کان اتر ۾ آهي. هي لڪ اولهه پاسي بلوچستان جي علائقي سوندي ۽ اوڀر ۾ (سنڌ) نه نديءَ جي ڪاري ڪوٽ واري حصي کي ملائي ٿو. اوچائي 4500 فٽن جي لڳ ڀڳ آهي. سوندي ۽ لوهيءَ جي علائقن مان سنگ مرمر نڪري ٿو جنهن جي مارڪيٽ ڪراچي آهي.

ننه ٿري:

چني وٽان منڇر کي پريندڙ ڇهن نئن مان هڪ تمام اهم نه آهي جيڪا ڦوسي لڪ ويجهو ڳاڙهي ڪڇي کان شروع ٿي واهي پانڌيءَ وٽان جبلن مان نڪري، نه گاج سان شامل ٿي منڇر ڏانهن ڏوڪي ٿي. ان جي ڪڇمينٽ ايراضي تقريباً 500 چورس ڪلوميٽر آهي. هن وات کي ’پناڻڪي وات‘ به چوندا آهن. نه ۾ هنڌ هنڌ وڏا ڪٽپ آهن جن ۾ اڃا تائين سيسر جو نسل

باقي آهي. نه جا ڪنپ ٻڌڪي دور جا تيرٿ آهن، ۽ ان ۾ تاريخ کان آڳاٽي زماني کان وٺي تازي زماني تائين جا آثار آهن.

قوسي لڪ:

گورک کان ڏکڻ طرف تقريباً 4000 فٽن جي بلنديءَ تي آهي. مٿي هٿ جي باوجود قافلن وارا هن کي لهڻ چڙهڻ ۾ گهٽ ڏکيو سمجهن ٿا.

گرو لڪ:

قوسي لڪ کان ڪجهه ڏکڻ ۾ هڪ سوڙهو ۽ غير معروف لڪ آهي. اوجاڻيءَ ۾ لڳ ڀڳ قوسي لڪ جيترو ئي آهي.

گرو لڪ:

کيرٿر جي هڪ ننڍڙي هيٺاهين چوٽيءَ (2000 فٽ) جو نالو سليماني آهي. ان چوٽيءَ جي ڏکڻ ۾ گرو لڪ آهي، جنهن کي لئمبرڪ صاحب Garre لکيو آهي. هي علائقو منچر جي آمهون سامهون آهي. لڪ تي چاڙهي نه انگڻي مان شروع ٿئي ٿي، اسان به 1996ع ۾ گورک چوٽيءَ تائين پهچڻ لاءِ ان وات سان هڪ پڪ آپ تي ويا هئاسون. اهو رستو سيوهڻ ڊيولپمينٽ اتارتيءَ وارن هڪ فوجي ڊوگر صاحب جي مدد سان 96-1995ع ڌاري ڪڍيو هو. هي لڪ پنڌ ۽ اٺن لاءِ سولو آهي. جيب لاءِ به خطرناڪ نه، البت ٿورڙو تڪليف ده آهي. خبر نه آهي ته هن وقت ان جي سار سنڀال جي صورتحال ڇا آهي؟ اهو جيب جي لائق به رهيو آهي يا نه؟

لوئي (لوهي) لڪ:

گري کان مٿي پهچبو ته کيرٿر جي ڪرنگهي تي جنگو ٺوٺ (3000 فٽ بلندي) وٽان (جنهن جو نالو هاڻي ڊوگر چوڪ رکيو اٿائون) بلوچستان جي شهر دريچي، ديوانه يا سارونا تعلقي جي ٻين آبادين ڏانهن رستو لهندو اهو 'لوهي لڪ' آهي. جيڪڏهن ڪراچيءَ کان سڌو گورک وڃڻو هجي ته پوءِ ڪراچي - دريچي - جنگو ٺوٺ واري وات وٺي سگهجي ٿي.

هشت ديه لك:

هي لك لوهي لك کان به ڏکڻ ۾ آهي ۽ لوهيءَ کي تندي رحيم سان ملائي ٿو. اولهه پاسي کيرتر جي جهول ۾ سوين ايڪڙن تي پکڙيل عارضي ڍنڍون ڪتراچ ۽ ڏيراج آهن. اهڙن ڏخيرن کي لوهي چئبو آهي، ۽ انهن تان ئي علائقي تي اهو نالو پيل ٿو ڏسجي.

ماچڪو لك:

نٺ گاج کي آخري ڀرتي ڪندڙ مکيه نٺ تڪيءَ سان ڳنڍيل ڏکيڙو لك آهي. جيڪو نٺ تڪي، ڪاشائي ڍوري ۽ چڻگ چشمي واري وات سان آهي. اهو لك ٻئي طرف ڄموري ڏانهن وٺي وڃي ٿو. (هن وات تي هڪ ماچي مري پيو هو، جنهنڪري ان لك تي 'ماچڪو لك' نالو پيو) گز مول کان ٿيندو گورک وڃي سگهيو.

گز مول لك:

نٺ تڪيءَ جو مکيه ڀرتي ڪندڙ ڍورو ممائي آهي. جنهن جا سمورا ورڪڙ گورک ويندي ڪاول لك تان به ڏسي سگهجن ٿا. گز مول لك نٺ ممائيءَ جي چوٽيءَ تي آهي. (تاج صحرائي مرحوم موجب) تر جا ماڻهو گز مول ۽ ماچڪو لکن کي ساڳئي نالي سان ياد ڪندا آهن انهن لکن مان جوڳي سنڀاسي وغيره سنڪ ۽ چمنا وڃائيندا گورک ويندا هئا. ان لك جو ذڪر ڪندي تاج صاحب لکي ٿو ته لوڙهه (گاج)، شڪلوتي، ڄمورو ماچڪو گز مول ۽ ڦوسي ڪُل پنج لک هڪٻئي کي ويجهو ۽ 15 ميلن (24 ڪلوميٽر) اندر اچي وڃن ٿا. انهن جي اولهه ۾ نٺ، نالي، ٿري ۽ انگيءَ سان جيڪا وات بلوچستان ڏانهن وڃي ٿي، ان کي 'پناڻي وات' چيو وڃي ٿو.

نٺ ڪڪڙائي:

هيءُ نٺ واهي پانڌيءَ کان اولهه ڏکڻ طرف آهي ۽ نٺ نريءَ کان ڏکڻ ۾ ۽ نٺ انگئي کان اتر ۾، هيءُ تراڪڙي ماڻهي آهي جنهن مان برساتي پاڻي جلدي خارج ٿيو وڃي. ان ۾ ڪي دلچسپ آرڪيالاجيڪل آثار به آهن.

نٺ انگڻي:

اوپر کان کيرٿر ۽ پٽ جبل جي وچ مان ڪجهه ان ريت اچي ٿي جو گهڙي کن لاءِ گمان ٿئي ٿو ته شايد اها به کيرٿر کي به اڌ ڪيو پئي اچي. ان جو چوڙ چنئيءَ وٽ منچر ۾ ٿئي ٿو. نٺ انگڻي مان به لڪ 'لوهي' ۽ 'هشت ديھ' سنڌ ۽ بلوچستان کي ملائين ٿا.

نٺ هليلي:

واهي پانڌيءَ جي ڏکڻ کان اچي ٿي. ان تي جنگواڻي جمالين جا شاندار مقبرا آهن.

چنگڻ چوٽي ۽ گڏهڙو لڪ:


پٽ جبل تي نئنگ ۽ بگا شير وٽان چنگڻ وارو جبل آهي. چنگڻ چوٽيءَ کان ٿوروئي اُتر ۾ گڏهڙو لڪ آهي. جيڪو سيوهڻ ۽ ديوانه کي ڳنڍيندڙ آهي. چنگڻ جبل بيحد ڏکيو هئڻ جي باوجود لاهوتي فقيرن جي لازمي گذر گاهه آهي. هاڻي، گڏهڙي لڪ کان رستو ٺهي ويو آهي ۽ ماڻهو جيپ ذريعي هتان ديوانه ۽ دريجي وڃي سگهي ٿو.

نٺ نئنگ:

هليليءَ کان ڏکڻ ۾ نئنگ، ٻنڌڻي ۽ جهانگارا سرشتو آهي، جن جو پاڻي به گاج، انگڻي ۽ ٽڪي وانگر منچر ۾ پوي ٿو. نٺ نئنگ تقريباً 50 ڪلوميٽر ڊگهي آهي. اها کيرٿر پٽ ۽ ٻڌي جبلن جي وچ مان نڪري اتر ڏانهن هلي، نئنگ وٽان ٿيندي، ڦيرو کائي منچر ۾ پوي ٿي.

نٺ ٻنڌڻي:

هي نٺ اصل ۾ ڏلهه وٽان شير کان اتر ڏانهن برساتي پاڻي وهڻ جو سرشتو آهي. ڏلهه ۽ مليرڙي لائينءَ کي ڏکڻ ڪوهستان جي ٻن ڀاڱن جي سرحد چئي سگهجي ٿو ڇاڪاڻ ته ان هنڌ کان برساتي پاڻيءَ جو هڪ حصو اتر طرف منچر ڏانهن ڇڄي ٿو ۽ ٻيو مليرڙي لائينءَ کان ڏکڻ طرف بارڻ سرشتي سان جڙي ٿو.



بدو جبل:

لڪي ۽ پٽ/کيرتر جبل جي وچ ۾ 48 ڪلوميٽر ڊگهو ۽ 2400 فٽ اوچائيءَ وارو جبل آهي. هي لڳ ڀڳ ڪرچات کان شروع ٿي اتر ۾ ڪاٺيءَ وٽ ختم ٿئي ٿو.

پٽ جبل:

منڇر کان اولهه طرف، بددي جبل ۽ کيرتر جي مڪيه ڪرنگهي جي وچ ۾ 2700 فٽن جي اوچائي وارو پر ڊيگهو ۽ بددي کان ڪجهه گهٽ آهي. هي نئونگ ماٿريءَ وارو علائقو آهي.


منڇر ۾ پوندڙ نئونگ:

اتر - اولهه کان چنيءَ وٽ گاج، ٽڪي، نري، ڪڪڙاڻي، هليلي، انگڻي ۽ نئونگ. ڏکڻ کان گمڙاج، ٻنڌڻي ۽ جهانگرڪي.

ڪوهستان

نٺ بارڻ ۽ پيا سرشتا:

بارڻ جو پاڻي گهٽي لڪ (جيڪو کيرٿر جي اولهه واري ڪرنگهي سان سنڌ - بلوچستان جي سرحد وٽ ميهي جبل جي ويجهو اچڻ ڪري نهيو آهي) ۽ ٽڪي بارڻ کان اوڀر ڏکڻ رخ هلندو دروات کان ٿيندو سڀر هاءِ وي تي لوڻي ڪوٽ وٽان لنگهي ٻولهاڙيءَ وٽ سنڌو نديءَ ۾ ڇوڙ ڪري ٿو. لڪيءَ وٽ منڇر ۽ ڄامشوري کان هيٺ بارڻ سلسلن جي وچ ۾ ننڍا ننڍا ڍورا ۽ ڍوريون مثال لڪي، بزن، رحمان وغيره ته آهن پر اهم نٺ فقط نٺ سن (نٺ رني ڪوٽ يا نٺ موهن) آهي جيڪا لڪي جبل جي اولهه وارين اندرين شاخن (ڏاڦرو وغيره) جو پاڻي سن وٽ سنڌوءَ ۾ ڇنڊي ٿي. ان جي پيٽ ۾ نٺ بارڻ ڏکڻ ڪوهستان جو اڏواڏ پاڻي کڻي ٿي.



بارڻ کان پوءِ نوري آباد واري پاسي جون نئون پنهنجو پاڻي ڪينجهر ۽ هڏيرو ڏيندڙ ڏانهن کڻي هلن ٿيون انهن کان پوءِ ملير، مٽل، ڪڍيجي، ٿڌو جرنڊو ۽ ڪونڪر سرشتو آهي جنهن جو پاڻي ڪراچيءَ ۾ گڏي ڪاريءَ رستي سمند ۾ ڇوڙ ڪري ٿو. ان کان به اولهه ۾ نٺ لپاريءَ جو پنهنجو جدا نظام

آهي. جنهن جو پاڻي به سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪري ٿو. لياريءَ کان اولهه ۾ حب نديءَ جو هڪ جدا مڪمل نظام آهي جيڪو کيرٿر جي اولهه، ميهي، آندار، ڇپر ۽ پٺ جبل جي برساتي ندين تي ٻڌل آهي.

کي مختصر سلسلا:

سنڌ ۾ جبلن ۽ ٽڪرين جو ذڪر ڪرڻ دوران کي خاص نالا بار بار ر ٻڌڻ ۾ ايندا آهن. بهتر آهي ته هڪ نظر انهن تي به وجهندا هلون:

سکر روھڙي ڪوٽڙي ٽڪريون:

ايوسين زماني جون آفقي بيهڪ واريون هي ٽڪريون نمولٽ چُن پٿر جون آهن انهن جي مٿين تهن ۾ چقمقي پٿر جون گول چنبون ڦاٿل آهن، جنهن مان پٿر جي مختلف زمانن ۾ انسانن لکها سالن تائين اوزار پئي گهڙيا آهن. هي ٽڪريون سکر کان 5 ڪلوميٽر اتر کان شروع ٿي روھڙيءَ کان ڏکڻ ۾ 64 ڪلو ميٽر ڊيگهه ۽ 24 ڪلوميٽر ويڪر ۾ پکڙيل آهن انهن جي اوچائي 200 فٽن جي لڳ ڀڳ آهي ۽ ٽڪرين جو الهندو پاسو لاهيارو آهي.

لکي:

هي ٽڪري ڀڳي ٺوڙهي کان ڏکڻ ۾ لاڳيتو 110 ڪلوميٽر هليو ويو آهي. جتي ان کي نءُ ٻارڻ وڌي ڇڏيو آهي. هن هنڌ ٻارڻ جي ٻي ڪنڌيءَ جو



نالو سورجاڻ يا سورجاڻو آهي جنهن جو رخ اوڀر کان اولهه آهي. بارڻ جو اهو لنگهه دروات سڏجي ٿو. لڪيءَ جي چوٽي 2300 فٽ آهي پر ڏکڻ ۾ ان سلسلي ۾ 2000 فٽن جون ڪافي چوٽيون آهن. لڪي ٽڪريون اتر وٽان ٻن چانگن ۾ ورهائجن ٿيون. اولهه واري شاخ ۾ آدمڙ، گوريندي ۽ ڏاڦرو ٽڪريون آهن. ٻنهي شاخن جي وچ وارو ميدان موهن پٽ سڏجي ٿو. ان حصي ۾ ڪالو (oyster) ۽ ٻين سڀين جا پنڊ پھڻ وڏي تعداد ۾ آهن. جن جو تعلق ڪرٽشس- تازي زماني سان آهي.

ڏاڦرو:

رني ڪوٽ کان اولهه ڏکڻ ۾ اٽڪل 10-12 ڪلو ميٽرن جي پنڌ تي آهي ۽ اوچائي 2000 فٽ اٿس. هونئن هي ٽڪر لڪي سلسلي سان جڙيل آهي.

هوٿياڻي اري ۽ سنڀڪ:

لڪي سلسلي ۾ لاڳيتو رني ڪوٽ کان ڏکڻ ۾ ڏاڦري جي آمهون سامهون ٻن حصن جا نالا آهن، جن جي اوچائي تقريباً 2000 فٽ آهي. اريءَ سان سنڀڪ لاڳيتو سلسلو آهي، فقط هنڌ هنڌ نالا بدلجن ٿا.

ڪاٺيو:

لڪي جبل جي هوٿياڻو پاڳي جي آمهون سامهون تعلقي ٿاڻي بولا خان ۾ 32 ڪلوميٽر ڊگهو ۽ 2300 فٽ اوچو چن پٿري جبل آهي. ساڳي بناوت واري ننڍي هيٺاهين ۽ اڪيلي زنجير ڪاٺي کان ڏکڻ اولهه ۾ ڪاري جبل کي انتها کي پهچي ٿي. هي ڪارو جبل ڪراچي ۽ حيدرآباد جي وچ تي آهي.

ڇوهڙ ڪ:

هي لڪ ڪراچي-حيدرآباد سپر هاءِ وي تي ٺه بارڻ ويجهو کان ۴۴۴ ڪلوميٽر اتر ۾ ٿاڻي بولا خان ڏانهن ويندي رستي ۾ اچي ٿو. ان

جي اوجائي 1000 فٽ کن ٿيندي . ڪنهن وقت ۾ هي تمام ڏکيو لڪ سمجهيو ويندو هو پر هاڻي ڪشادو ۽ بهترين روڊ ٺهڻ سبب هڪ رواجي جابلو جاڙهيءَ جهڙي حيثيت اٿس.

گنجو ٽڪر:

حيدرآباد شهر واري ٽڪري ۽ پوءِ ڏکڻ ۾ هل پارڪ/ ڪالي مندر کان شروع ٿي ڏکڻ ۾ 30-35 ڪلوميٽرن تائين هليو ويو آهي. بيهڪ ۾ ڪنهن قدر سکر روڙيءَ وارين ٽڪرين سان ميل کائي ٿو. ڇت تراڪڙي ۽ سيٺي پاسا آيا لاهي داراڻس. ان ۾ اچو چُن پٿر ۽ ان جي هيٺان ميت آهي.

مڪلي:

ڊيگهه 16 ڪلوميٽر، ويڪر وڌ ۾ وڌ هڪ کان ڏيڍ ڪلوميٽر ۽ اوجائي وڌ ۾ وڌ 150 فٽ آهي. هيءَ چُن پٿري وارياسي ٽڪري آهي. جنهن جي هڪ ڇيڙي تي مڪلي وارو شاهي قبرستان ۽ ٻئي ڇيڙي تي پير پٽو ماڳ آهي. هن ٽڪريءَ جي هڪ ڇاڙهه اولهه پاسي اُڀريل آهي، جنهن کي ڪي مقامي ماڻهو ’مريرو‘ ٽڪري ته وري ڪي ’شاه حسن‘ چون ٿا.

اهڻ شاه جون ٽڪرين:

پير پٺي کان 17-18 ڪلوميٽر ڏکڻ-ڏکڻ اوڀر ۾ ننڍين ٽڪرين جو ميڙ آهي، جيڪو اڏائي (2.5) ڪلوميٽر ڊيگهه ۽ هڪ ڪلوميٽر ويڪر ۾ پکڙيل آهن سڀ کان وڏي ٽڪري جي چوٽي فقط 75 فٽ آهي.

دُنيار گڙ ۽ ميهي:

تعلقي ٿاڻي بولا خان جي اولهه ۾ تونگ طرف ٽاڪرو سلسلا آهن. دنيار جنهن جاءِ تي کيرٿر سنڌ ۽ بلوچستان جي سرحد ڇڏي ڪرچات جو

رخ ڪري ٿو اتان کان ميهي جبل سنڌ بلوچستان جي سرحد برقرار ڪري ٿو. ٻنهي جبلن جي ميلاب وٽ هڪ لک ٺهي ٿو جنهن جو نالو گهٽي لک آهي. ميهي جبل 144 ڪلوميٽر ڊگهو ۽ 3300 فٽن جي اوچائيءَ وارو جبل آهي.

مَهيرو:

ڪراچيءَ کان اتر ۾ 1500 فٽن جي اوچائيءَ جو هي ٽڪر اتر کان ڏکڻ رخ ۾ پکڙيل آهي. ان ۾ ٽڪر جي اندران ئي هڪ ڍورو اتر کان ڏکڻ طرف لهي ٿو ۽ ٻاهرو آثارن وٽ ڪُنڀ ٺاهي اوڀر رخ ۾ ٻاهر نڪري، وري اتر پاسي مهير ٽڪر جو طواف ڪري اولهه پاسي حب نديءَ ۾ ڇوڙ ڪري ٿو. هي گاج جا تَهه آهن.

هالار:

سنڌ ۾ هالار نالي ڪوبه جبل نه آهي. اهو ٿر کان ڏکڻ ۾ ڪڇ واري علائقي جو هڪ جبل آهي. البت لئمبرڪ نشاندهي ڪري ٿو ته انگريز شروع ۾ جڏهن سنڌ سان واسطي ۾ آيا، تڏهن هو کيرٿر ۽ لڪي ٽڪرن کي بي پرواهيءَ سان ’هالار جبل‘ چوندا هئا. (البت بلوچستان ۾ هنگلاج ويندي هنگول ندي ۽ هاڙهي جبل کان اوڀر ۾ هڪ جبل جو نالو ’هالا‘ آهي)

جبل ۽ پاڻي

جبل ۾ پاڻي اتي هوندو آهي جتي پهڙن ۾ پورا (porous) پاڻا هوندا آهن. چُن-پٿر پورو نه هوندو آهي، ان ۾ پاڻي ڌڙڻ ۽ ڦوڙن ۾ گڏ ٿيندو آهي. اڪثر ماحولياتي سببن ڪري انهن ۾ 100 ميٽرن جي اونھائيءَ تائين وڏا ڌڙ يا ڦوڙ ٺهي پيا آهن.

رني ڪوٽ سلسلو چُن پٿري ۽ ريتيلي پٿر جو آهي. لڪي ٽيون (Tiyon) ۽ کيرٿر سڀ چُن پٿر جا آهن ۽ اهي چڱا خاصا پورس ۽ ڦوڙن ۽ ڌڙن وارا آهن.

جناب اير. ايڇ پنهور 1954ع کان 1972ع تائين سروي دوران سنڌ جي پهاڙي علائقن ۾ خاص ڪري ڪراچيءَ کان گاج تائين 49 چشمن جي نشاندهي ڪندي چوي ٿو ته گاج کان اتر ۽ شهداد ڪوٽ تائين ٻيا به ڇهه چشما آهن. (پراصل تعداد ان کان ڪجهه وڌيڪ آهي).

سنڌ جا اڪثر چشما گرم يا پاڙا آهن ڪي منا چشما به آهن جن جو دارومدار جابلو جوڙجڪ ۽ ان ۾ موجود معدنيات تي آهي. سنڌي ماڻهن انهن مان اڪثر چشمن جي مالڪي ڪنهن نه ڪنهن پير بزرگ سان منسوب ڪري ڇڏي آهي. گرم چشمن ۾ اڪثر لوڻياڻ ۽ گندرف ٿئي ٿو ۽ مقامي ماڻهو ان صفت کي بزرگ جي ڪرامت ۽ چمڙيءَ جي بيماري لاءِ مفيد سمجهن ٿا.

سنڌ ۾ چشمن جي وهڪرن جو دارومدار برساتن تي آهي. پر سنڌ ۾ برساتن جي صورتحال ڇا رهي آهي؟ پنهور صاحب چوي ٿو ته، ”7000 ق. م ۾ اڍائي ھوڻ تي وڌيڪ هئي، جيڪا سياري اونھاري پئي ٿيندي هئي. انڪري هاڻوڪن چشمن مان وڌيڪ پاڻي جاري ٿيندو هو ۽ ان تي ڪڻڪ، جو سيارِي جا فصل، پاجيون ۽ ڪجهه گاهه ٿيندو هوندو.“ پنهور صاحب اهو به ياد ڏياري ٿو ته گهڻي برسات جي پاڻيءَ جو رخ ڦيرائي پوکيءَ لاءِ گيريند نظام استعمال ڪيو ٿي ويو. ڪجهه وهڪرن تي 3700-4250 ق. م ۾ گير بند اڏاوتون ٿيون. ان زماني ۾ گهڻين برساتن سبب گهم وڌيڪ ۽ بخارات جو عمل گهٽ هوندو ۽ هاڻوڪا چشما اڳي ماپ ۽ پاڻيءَ جي مقدار ۾ وڌيڪ هئا. سنڌ ۾ اڪثر چشما نئين جي پيٽ ۾ يا انهن جي پر پاسي ۾ آهن. ان کان سواءِ مشاهدو ڪيو ويو آهي ته کيرٿر ۽ ڪوهستان ۾ اڪثر ننڍا چشما برساتن کان پوءِ ٻن کان ٽن مهينا جاري رهن ٿا.

کيرٿر ۾ پاڻيءَ جا ذخيرا:

سائين اير. ايڇ پنهور موجب گاج کان ڪراچيءَ تائين دادو، ڄامشوري ۽ ٺٽي جي حدن اندر 49 چشما آهن ۽ گاج کان مٿي شهداد ڪوٽ تائين ٻيا ڇهه چشما آهن. پر سڄ اهو آهي ته سنڌ جي جابلو ۽ ٽاڪرو علائقن ۾

واهين ۽ چشمن جو اصل تعداد اڃا به وڌيڪ آهي. فقط چانڊڪا واري علائقي ۾ پاڻيءَ جا ننڍا وڏا چشما ۽ ذخيرا 100 کن آهن. ڪوهستان جي اڪثر چشمن سان ڪن بزرگن جون ڪرامتون منسوب آهن يا وري اهي آڳاٽن وقتن جا تيرت اسٽان آهن، جتي روايتن موجب بزرگن يا ديوتائن بڙچيون هڻي عوامي پلاڻيءَ لاءِ چشما ۽ توپا پيدا ڪيا آهن. عام طور تي ماڻهو ايئن به سمجهندا آهن ته زمين ۾ اندر ڪي ننڍيون وهنديون رهن ٿيون جن جو پاڻي هتان هتان ظاهر ٿيندو آهي، ۽ اهي پاڻي پاڻ ۾ ڳنڍيل آهن. جيئن ته مختلف چشمن جي پاڻين ۾ مختلف معدنيات هوندي آهي يا وري انهن جو پاڻي منو ۽ صاف سٿرو ٿئي ٿو، انڪري اڪثر چشما ڪنهن نه ڪنهن بيماريءَ جي علاج لاءِ فائديمند سمجهيا وڃن ٿا ۽ اها خوبي به ساڳي بزرگ جي ڪرامت سمجهي وڃي ٿي. مٺي پاڻيءَ جو چشمو صحت بخش سمجهيو وڃي ٿو پر گرم چشما اڃا به بهتر سمجهيا وڃن ٿا ڇو ته انهن ۾ موجود گندرفي جزا چمڙيءَ جي بيماريءَ جي علاج ۾ ڪارگر سمجهيا وڃن ٿا. منو پاڻي تبرڪ طور ۽ صحت لاءِ جڳو سمجهي پاڻ سان کنيو ويندو آهي.

چشمن جي ثقافتي تاريخ:

ثقافتي طرح، چشمن کي برفاني شڪاري دور ۾ اهميت ملي، جڏهن رولاڪ شڪاري لوڪ چشمن تي ايندڙ جانورن تي گهاٽ هڻندا هئا. مهر ڳڙھ ثقافت (تقريباً 7000 ق. م) جي اوسر کانپوءِ سنڌ ۽ بلوچستان جي ماڻهن چشمن جي ويجهو آباد ٿيڻ شروع ڪيو آهي. اهي 4000 ق. م تائين چشمن جي ويجهو رهيا ۽ لڳ ڀڳ 3700 ق. م ۾ سنڌوءَ ڪناري آمريءَ وٽ آيا ۽ آباديون وڌايائون. ان دور ۾ تڏهوڪي محدود آباديءَ لاءِ چشمن جو پاڻي ڪافي هو ۽ جر ۾ به ڪافي پاڻي هو. سنڌ ۾ 8500 ق. م کان 2000 ق. م تائين اڄ جي ڀيت ۾ اڏائي هوڻ تي وڌيڪ پاڻي هو، انڪري هاڻوڪا چشما وڌيڪ پاڻي ڏيندا هئا ۽ ڪافي ٻيا چشما به موجود هئا جيڪي هاڻي سڪي يا بند ٿي ويا آهن.

ان وقت جا ماڻهو انهن چشمن تي ڪڻڪ، جو ۽ سياري جا ڪي فصل، پاڇيون ۽ گاهه پوکيندا هوندا. ان وقت هتي چانور، جوئر ۽ باجهري نه پوکيا ويندا هئا ڇو ته اهي اڃا متعارف ئي نه ٿيا هئا. اهي لوڪ پري پري تائين پکڙيل آبادين ڏانهن ايندا ويندا هئا. اها ثابتي ان مان ملي ٿي ته سڀني ماڳن تي هڪجهڙا ٿانوَ ۽ ٺڪراٽو موجود آهي. ان زماني ۾ برساتي پاڻي گهڻو هو. انڪري هُنن وهڪرن جو رخ پنهنجي مرضيءَ موجب موڙڻ جون ڪوششون ڪيون هيون ۽ ڍورين تي بند ٻڌا. ڪوهستان ۾ اهڙا سوين بند مليا آهن جن کي هاڻي اسان گبر بند، ڪافرن جو ڪريهون، ۽ گور بنديون وغيره چئون ٿا. اهي بند لڳ ڀڳ 4250-3700 ق. م ۾ ان وقت ٺهيا جڏهن برساتن جو مقدار ڪجهه گهٽ ٿيو هو. اهي گبر بند اڏاوتن جا شاندار مثال ۽ زبردست اڏاوتي تجربي، مشاهدن ۽ مضبوط انتظامي ڍانچي يا منظر سماج جي نشاندهي ڪن ٿا. اهي بند مختلف ڪمن جا هئا. ڪي بند خاص حدن اندر پاڻي جهليندا هئا، جنهن سان جر مٽي ٿيندو هو. ڪي پاڻي ڏيڍ وانگر ڏيڍ ٿيندو هو ته وري ڪي پاڻيءَ جو رخ مرضيءَ مطابق موڙي آبادي ڪڍي ويندي هئي. اڪثر هنڌن تي پاڻيءَ کي ڪجهه وقت لاءِ جهليو ويندو هو ته جيئن ريت اتي رهجي وڃي ۽ آباديءَ لائق زمين ٺهي پوي. ڪن اُتانهين جاين تي پاڻيءَ کي رڪاوٽ ٿيڻ سان اهو ڪن ڌڙن ۾ هليو ٿي ويو ۽ هيٺ ڪنهن هنڌان چشمو بڻجي ٿي پيو. قديم لوڪن شايد اهڙو مشاهدو اڳ ئي رکيو ٿي ته ڪهڙو پاڻي ڪهڙو رخ اختيار ڪري ٿو. برساتي پاڻيءَ جو ڏيڍو جبلن ۾ برسات مطابق ۽ وقت جي حساب سان گهٽ وڌ ٿيندو رهندو هو. سڀ کان گهڻو پاڻي برساتن دوران ئي جاري ٿيو ٿي. برسات کي جيترو وڌيڪ وقفو ٿيو ٿي، وهڪرو به اوترو ئي گهٽيو ٿي. پر تاريخ کان اڳاٽي ان دور (2000-8200 ق. م) ۾ شايد ئي ڪڏهن ڪو وڏو سوڪهڙو ٿيو هجي. انڪري ان دور ۾ رڌ، ٻڪري ۽ ڳئون وغيره لاءِ چاري جي ڪا به ڪمي ڪونه هوندي، اهو ئي سبب آهي جو اسان کي اڄ جي ويران ڪوهستان ۾ قديم دور جون آباديون وڏي تعداد ۾ نظر اچن ٿيون.

قدیر لوکن وٽ ڪوه ڪوٽڻ جو هنر به هو. اهڙو هڪ ڪوه 3000 ق م جو يا ان کان به اڳ جو گاجي شاه وٽ مليو آهي. انهن قدیر ماڻهن وٽ يقيناً ٻيا ڪوه به هوندا، انهن مان ڪي باقاعدي ڪوٽين هوندا ته وري ڪي بي ترتيب! انهن مان جيڪي بي ترتيب يا ڪجا ڪوه هئا، سي وقت سان گڏ سولائيءَ سان ڍڪجي ويا هوندا.

گرم چشما:

اڪثر گرم چشما اهڙن ماڳن تي آهن جتي تازي ارضياتي دور ۾ جوالاهي سرگرمي رهي آهي. ايم. ايڇ پنهور صاحب موجب ڏکڻ ايشيا جي گرم چشمن مان 70 سيڪڙو سنڌ ۾ آهن. انهن خطن جي ٽڪرين ۾، اڪثر هنڌن تي سطح کان ٿورو ئي هيٺ اڃا تائين اصل گرمائشي اثر موجود آهي. جڙ جو پاڻي جڏهن انهن گرم پاڻن مان لنگهي ٿو، تڏهن اهو گرم چشمي جي صورت ۾ ڦٽي ٿو. سنڌ جي ڪافي چشمن ۾ گندرف آهي. انهن ۾ لڪي، نئنگ، ڪائي، تونگ ۽ منگهو پير ڪافي مشهور آهن. ايم ايڇ پنهور صاحب 1954 کان 1972 دوران ڪافي سارن چشمن جو اڀياس ڪيو هو. هو چوي ٿو ته، ”سن 7000 ق. م کان 2000 ق. م ۾ اڄ کان اڳي هوندي برسات پوندي هئي ۽ ان عرصي ۾ هوا ۾ نمي به لازمي طرح وڌيڪ هوندي. بخارات جو عمل گهٽ هو ۽ زمين ۾ جذب ٿيل پاڻين جو مقدار وڌيڪ ۽ زير آب سطح مٿي هوندي ۽ چشما به وڌيڪ هوندا. مشاهدو چوي ٿو ته ان دور ۾ کيرٿر جا ننڍا ننڍا چشما به تن کان نو مهينا جاري رهندا هئا.“

کیرتر ڪوهستان جا چشمہ

ترتيب	چشمہ	آبپاشي جي گنجائش (ايڪڙ)	بيھڪ	پاڻيءَ جو مقدار لٽر في سيڪنڊ	لورڻيان جو مقدار ppm
1.	گاجي شاھ (ٿرمل)	450 ميٽر	26-27 'N, 67-30' E	85	ميٽر 770
2.	فدڪ، جوهي تعلو	350	-	70	ميٽر
3.	ياھي پاٽڏي	250	26-41 'N, 67-30' E	-	ميٽر
4.	گاج (4 چشمہ)	-	گاج جي مٿئين پاڻي ۾	-	ميٽر
5.	تندو رحيم ٿرمل	-	26-30 'N, 67-30' E	-	-
6.	ٿاڙوڙي سيوھڻ تعلو	-	26-6 'N, 67-43' E	30	ميٽر 450
7.	ڪاٺي (جاڙا چشمہ)	-	26-15 'N, 67-42' E	85	
8.	(ٿرمل) ننگ (ٽي چشمہ)	500	26-16 'N, 67-41' E	85	ميٽر
9.	بُنجو (ٿرمل)	350	26-17 'N, 67-32' E	70	ميٽر 800
10.	ڏاھ	20	26-18 'N, 67-31' E	5	هڪڙو 1050 پاڙو
11.	پت ڦرند يا لھري ڦرند	-	26-04 'N, 67-47' E	5	ميٽر 770
			26-03 'N, 67-39' E		

میلر	8	26-26 'N, 67-30' E	50	گوداندي(تومل)	12.
کارڈ	15	-	-	(تومل)	13.
800 هلڪو پاڙو	15	26-07 'N, 67-58' E	50	دني ڪوٽ (تومل)	14.
میلر	-	25-42 'N, 67-47' E	-	گجور لاديي	15.
650 ميلو	8	25-42 'N, 67-46' E	-	ڇاڙا چشما	16.
میلر	15	35 0/11	-	Dhoragar	17.
میلر	3	26-31 'N, 67-26' E	10	ڪوٽڙي تعلو	18.
600 ميلو	15	26-45 'N, 67-44' E	500	Karogari	19.
900	15	25-49 'N, 67-45' E	-	ڪوٽڙي تعلو	20.
1050 هلڪو پاڙو	15	25-45 'N, 67-58' E	80	علي مراد (محال ڪوهستان)	21.
750 ميلو	5	25-46 'N, 67-36' E	-	برڪڻ	22.
1120 هلڪو کارو	3	25-42 'N, 67-37' E	500	رفق شاه، تونگ	23.
2000-2300 پاڙو	3	350/10Grid C664903	-	چهر (تومل)	24.
				خير (ڪوٽڙي تعلو)	25.
				جشم (ڪوٽڙي تعلو)	26.
				ڪوهراش (غڻبي پير)	27.
				Hikehroo ۽ Gabar	
				ڄاڙا چشما	

ڪيرٽري تعلقي	ڪيرٽري	800			
ڪيرٽري تعلقي ڪوٽڙي	Koshra jo Wahro	26-0°N, 67-48°-30E			28
(توملا)					29
ڪيرٽري تعلقي ڪوٽڙي	ڪوٽڙي (توملا)	26-13°N, 67-42°E	-		30
ڪنڊر (توملا) (ڪوٽڙي تعلقي)		26-14°N, 67-35°E	-		31
پنٿي، جي پٺ		26-0°N, 67-20°E	-		32
ڪوٽڙي		25-38°N, 67-50°E	-		33
ڪوٽڙي		25-36°N, 67-51°E	-		34
ڪوٽڙي		25-38°N, 67-71°E	-		35
ڪوٽڙي		26-32°N, 67-49°E	-		36
ڪوٽڙي		25-29°N, 67-53°E	-		37
ڪوٽڙي		25-00°N, 68-03°E	-		38
ڪوٽڙي		24-39°N, 67-06°E	-		39
ڪوٽڙي		24-37°N, 67-06°E	-		40
ڪوٽڙي			-		41

کي ٻيا چشما ۽ واهيون:

وهندڙي، مزاراڻي، شانهر، کيهرحي، سيتا، گمڙاج، آري پير، ڪانڌي
واهي، لنڊي بني، سنڀاسي بُني، جن واهي، ٽڪو واهي، ٽوپو هينگرڻ.

موسمي حالتون

گرميءَ جي صورتحال:

سنڌ جا جبل اونهاري ۾ بيحد گرم ۽ سياري ۾ هلڪا ٿڌا ٿين ٿا. پر کيرٿر جي ڏنڊ يا ڪرنڳهو جتي جتي 3000 فٽن کان بلند آهي، اونهاري ۾ اتي عام طور ايتري ٿڌ ٿئي ٿي جيتري ميداني علائقن ۾ سياري دوران هوندي آهي اهي چوٽيون سياري ۾ تمام ٿڌيون ٿي وڃن ٿيون، انڪري اتي رهندڙ ماڻهو جبلن تان هيٺ لهي ايندا آهن. سياري ۽ اونهاري جو اهڙو ڦيرو بلوچستان جي بلند جبلن تي رهندڙ بروهين ۽ افغاني پونده لوڪن کي سنڌو ماڻيءَ جو رخ ڪرڻ تي مجبور ڪري ڇڏيندو آهي ۽ اهي ماڻهو سياري جي پڪين وانگر سيارو گذاري موٽي ويندا آهن.

اتر ڪوهستان ۾ سخت اونهاري دوران ڪنهن چانوري هيٺ گرميءَ جو درجو عام طور 50 درجا سينٽي گريڊ هوندو آهي. جبل تي ۽ سطح زمين تي گرمي پد 65 کان 70 يا اڃا به مٿي ٿي سگهي ٿو. ڏکڻ ڪوهستان ۾ گرمي پد 45 درجا سينٽي گريڊ عام آهي پر جبل هوا جي پيٽ ۾ گهڻو گرم ٿين ٿا، اهو فرق 20-25 درجا مٿي ٿي سگهي ٿو.

صحرا ڏينهن جي وقت ۾ دوزخ جهڙو گرم ٿي ويندو آهي، چوٽن تي گهم جو بادل طاري نه ٿو رهي، جيڪو سج جي ڪرڻن کي جهلي يا واپس اٿائڻي ڇڏي. انڪري سج جا 90 سيڪڙو ڪرڻا ڌرتيءَ تائين پهچن ٿا. جبل جون راتيون گرم ڏينهن ۾ به ٿڌيون ٿين ٿيون ان جو ڪارڻ به اهڙو غير گهمدار ماحول آهي جنهن ۾ آسمان تي روڪ لاءِ گهم يا بادلن جي ڪا چٽي موجود نه آهي، ان ريت گرمي وڌي وڃي ايت گهميل علائقي ۾ رات جو 50 سيڪڙو گرمي باقي رهجي وڃي ٿي، انڪري اتر ڪوهستان ۾ رات جي وقت ۾ گرميءَ جو درجو ڏينهن جي گرمي پد کان 25 سيڪڙو هيٺ لهي وڃي ٿو.

برسات جو مزاج :

ڏکڻ ڪوهستان ۾ برسات جي شرح فقط 18 کان 20 سينٽي ميٽر آهي. اتر ۾ 7.5 کان 10 سينٽي ميٽر آهي. انهن ٿورڙين پر ساليانين برساتن هن جبل کي مڪمل صحرا ٿيڻ کان بچائي ورتو آهي ۽ ان تي هلڪي هلڪي اويڙ ٿئي ٿي. زمين جي سطح ان هلڪي اويڙ سبب سڄ ۽ هوا جي سڌي حملي ۽ کاڌ (erosion) کان ڪي قدر بچاءُ هيٺ رهي ٿي ۽ ٻوٽا پنهنجين پاڙن سان مٽيءَ کي روڪي رکن ٿا. اڪثر ايئن به ٿيندو آهي ته ٻه سال مينهن نه پوندو آهي ۽ مال گاهه چري ويندو آهي. اٽڪري ڪوهستان ۾ هوا ۽ پاڻيءَ سبب کاڌ جو عمل واضح ڏسبو آهي. کيرٿر پاڻ ايترو اوچو نه آهي جو چؤماسي جا ڪڪر جهلي سگهي. اٽڪري برساتون گهٽ پون ٿيون ۽ ان تي پوندڙ مينهن نئون ۽ ڊورا ٺاهيندا پنهنجو پنهنجو ديوتا نما چوڙ ٺاهين ٿا. انهن مان سڀني کان اهم چوڙ (fan) نه گاج جو آهي جيڪو 200 ڪلوميٽرن ۾ پکڙيل آهي.

ڪوهستان ۾ اڪثر مينهن اونھاري ۾ ۽ ڪي ٿورا سياري ۾ پوندا آهن پر سياري جا مينهن وڌيڪ فائديمند ٿين ٿا. انهن مينهن تي ٻوٽا، جانور ۽ مال وڌن ٿا. روزانو ماڪ پوي ٿي، اٽڪري زمين نم رهي ٿي. اتر ڪوهستان ۾ چؤماسو عام طور 15 جولاءِ کان ۽ ڏکڻ ڪوهستان ۾ جولاءِ جي پهرين هفتي کان شروع ٿيندو آهي. اتر ۾ اٽڪل ڇهه ست ڏينهن مينهن پوندو آهي ۽ ڏکڻ ۾ ست اٺ ڏينهن. برسات جي وڌيڪ اڀياس سان پتو پوي ٿو ته ڪوهستان ۾ وڏي وڌ برسات هر چئن سالن ۾ هڪ ڀيرو 5 اٺن کان وڌيڪ پئجي سگهي ٿي. ڏکڻ ۾ جهمپير وٽ اهڙو مينهن پنجن مان ٻن سالن ۾، ٿاڻي بولا خان ۾ پنجن سالن دوران هڪ ڀيرو، سيوهڻ کان اولهه پاسي ڏهن سالن ۾ هڪ ڀيرو ۽ ڏاڙهياري طرف ويهن سالن ۾ هڪ ڀيرو پئجي سگهجي ٿو.

اهڙن مينهن سبب نه رڳو کاڌ ٿئي ٿي پر وڏيون ٻوڏون به اچن ٿيون. اهڙيون تباهيون سن 1942، 1956، 1977، 1994 ۽ 2006 ۾ آيون هيون. نه گاج جي وڏي ڪئمپينٽ بلوچستان ۾ آهي. اهو علائقو موسمي درجي بنديءَ جي لحاظ کان 15-20 سالن ۾ هڪ ڀيرو 24 ڪلاڪن اندر 10 انچ برسات وارو آهي. اٽڪري دادو، جوهي،

خيرپور ناٿن شاھ وغيره ۾ سخت نقصان پهچي ٿو بلوچستان ۾ گاج جي ڪئمينٽ 2500 چورس ميل (6400 چورس ڪلوميٽر) يا 1.6 ملين هيڪٽر آهي 1954ع ۾ 24 ڪلاڪن اندر 19 انچ مينهن پيو هو پر جيڪڏهن ان جو فقط ٽيون حصو يا 6 انچ پائي وڃي ٿو ته به اهو 24 ڪلاڪن ۾ 800,000 ايڪڙ فٽ يعني چار لک ڪيوسڪ وهڪرو هوندو اهو سنڌو نديءَ ۾ وڃين درجي جي ٻوڏ جيترو پاڻي آهي.

هوائون:

ڏکڻ ڪوهستان ۾ 15 اپريل کان 15 سيپٽمبر تائين ڏکڻ-اولهه ڏکڻ هوائون عربي سمنڊ کان راجستان جي صحرا ڏانهن روزانو 8 کان 10 ڪلاڪ 26 کان 40 ڪلوميٽرن جي رفتار سان ۽ ٻيا 8 کان 10 ڪلاڪ 25 کان 30 ڪلوميٽرن جي رفتار سان هلن ٿيون. اتر ڪوهستان ۾ هوائون ڏکڻ-سخت گرمي ۽ سوڪهڙي سبب هلن ٿيون اتر ڪوهستان ۾ گرم هوائون مئي مهيني ۾ لاڳيتو 6-7 مهينا 40-50 ڏينهن هلنديون آهن جنهن کي سنڌ جا ماڻهو 'چاليهو' چوندا آهن اهي صحيح معنيٰ ۾ ڪنهن گرم صحرا جا ڏينهن آهن انهن ڏينهن ۾ تيز هوا جا جهڪڙ لڳندا ۽ لوجتو مٿي ڪڍندا آهن اهي منظر ڏکڻ کان وڌيڪ اتر ڪوهستان ۾ ڏسبا آهن ڏکڻ ۾ اونھاري دوران ڏکڻ-اولهه هوائون معمول سان گھلنديون آهن پر انهن ۾ ڪي سخت ڏينهن به ايندا آهن اتر سنڌ جا وڃوڙا ايٽا طاقتور ۽ خطرناڪ ثقا ٿين پر ڪن ڪمزور وڻن ۽ گهرن کي ٻاهي وجهندا آهن انهن ۾ ننڍڙا ننڍڙا جيت ڪڇي ويندا آهن ۽ مٿل حالت ۾ پٽ تي اچي ڪرندا آهن.

سڄو کيرٿر سامونڊي طوفانن جي حملن کان ڪافي پريرو آهي اتر ڪوهستان ۾ 15 ڪلوميٽر في ڪلاڪ هوائون عام آهن ڏکڻ ۽ اتر ڪوهستان ۾ لڳندڙ هوائون ۽ طوفانن ۾ هڪ خاص فرق آهي ڏکڻ ڪوهستان ۾ ڏوڙيا لڳندا آهن ۽ آسمان تائين وڃي پهچندا آهن سڄي ماحول ۾ رڻو پڪڙجي ويندو آهي ۽ مٽيءَ سبب ميات رهندو آهي اٽڪري، اُس جي ڪرڻن ۾ رنڊڪ پوندي آهي ۽ نتيجي ۾ گرمي پد 3 کان 5 ڊگريون سينٽي گريڊ گهٽ هوندو آهي پر رات جي وقت گرميءَ جو

درجن کان پنج درجا وڌيڪ هوندو آهي. اتر ڪوهستان ۾ مٽي يا دڙ گهٽ هوندي آهي، ان ئي سبب ڪري گرمي به گهڻي هوندي آهي.

ڪي ٻيا تفصيل:

ڪوهستان ۾ بخارات ٿيڻ جي شرح ڪافي وڌيڪ آهي، خاص ڪري اتر ڪوهستان ۾. هڪ اندازي موجب ان علائقي ۾ ٻوٽن مان بخارات اڻڻ جو ساليانو مقدار 1000 اٽچ (ايڏي ميٽر) آهي. اوجاين وارن علائقن ۾ اها شرح گهٽ آهي. سنڌ جي صحرائي علائقي خاص ڪري ٿر ۾ ماڪ جو مقدار 1.5 ملي ميٽر عام آهي. ٿر ۾ اڃا به وڌيڪ ماڪ پوي ٿي. ان ريت سنڌ ۾ ٻنن جي سطح ۽ ٿڙن تي 250 کان 300 ملي ميٽر ماڪ پوي ٿي، جنهن تي ٻوٽا گذارو ڪن ٿا. ٻن ۽ ٿر وغيره ماڪ ڇهي وٺندا آهن. صحرائي ٻوٽن جي بقا جو اهوئي لهر راز آهي. سڄي ڪوهستان ۾ گهر ڪونه پوندي آهي، سواءِ برساتي مند يعني جُونِ جُولاءِ جي. سنڌ ۾ ڳڙو گهڻو ڪونه پوندو آهي، ان ڪري ڪوهستان ۾ به شرح تمام ٿوري آهي. ڏکڻ ڪوهستان ۾ هر تن چئن سالن ۾ هڪ ڀيرو ۽ اترڪوهستان ۾ هر پنجن چئن سالن کان پوءِ ڳڙو پئجي سگهي ٿو. ڏکڻ ڪوهستان ۾ هر ڏهن سالن ۾ هڪ ڀيرو ۽ اتر ڪوهستان ۾ هر پنجن سالن ۾ هڪ ڀيرو ڀارو به ڄمي سگهي ٿو. ڪاڇي ۾، ۽ کيرٿر تي هر سال ڪي ڏينهن ڀارو ڄمي سگهي ٿو.

برساتن سبب کاڌ:

اولهه کان اتر پاسي ڪوهستان ۾، 6586 چورس ڪلوميٽرن جو برساتي پاڻي ڏيڍ درجن نئين مان تيزيءَ سان لنگهي وڌي کاڌ ڪندو آهي. انهن نئين جو پاڻي ريت کڻي تمام طاقت سان پنهنجي پنهنجي چوڌ ڏانهن ٻوڙي ٿو، ان وهڪري سان گڏ ننڍيون گول پٿريون ۽ وڏيون چنبن به لوهنديون اينديون آهن. جيئن ئي پاڻي جبلن ۽ ٽڪرين جي حدن مان ٻاهر نڪري ماڻو ٿئي ٿو. پاڻيءَ جو زور به گهٽجي ٿو ۽ ان جو سڄو ريت جبل جي دامن ۾ سڻجي ويندو آهي. اهي چنبن فقط پاڻيءَ جي زور تي ڪونه ڌڪجنديون آهن پر اهي مٽائين پاڻيءَ جي زبردست ثقلي ڪشش سبب مٽي

ڪنڊيون آهن جڏهن وهڪري جي رفتار 50 سينٽي ميٽر في سيڪنڊ يا 113 ميل في ڪلاڪ ٿئي ٿي، تڏهن مٽيءَ جي ذرڙن جي کاڌ شروع ٿئي ٿي. ڪاڇي ۾ جابلو ڏامن ويجهو اها رفتار عام آهي جيئن ته مٽيءَ ۾ ڇهڻ جي صلاحيت هوندي آهي ان جي کاڌ يا ان کي پنهنجي جاءِ تان پٽڻ لاءِ وڏي تيزي گهرجي. هڪ ڀيرو مٽيءَ جا جزا ڌار ٿي ڪڍي ويا ته پوءِ اهي گهٽ رفتار تي به لڙهندا ويندا آهن برساتي پاڻيءَ ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ٿئي ٿو جيڪو پٺن، ڊولومائٽ، چن پٿر ۽ ٻين حل پذير پٿرن کي ڳاريندو رهندو آهي. هتي گرر منڊن ۾ زمين جي مٿين سطح تي مٽيءَ جا ڇاپوڙا ٺهي، ڌري پوندا آهي ان جو سبب اونهارِي توڻي سياري ۾ گرميءَ جي درجي ۾ گهٽ وڌائي ٿيڻ آهي.

قدرتي وسيلو پوٽا ۽ بقا:

اتر ڪوهستان جي متوازي جابلو سلسلن ۾، وچ وچ ۾ سوڙهيون ۽ ويڪريون ماڻهيون آهن. ڪوهستان جي ان ئي حصي جي اوڀر واري آخري قطار ۽ سنڌوءَ جي وچ وارو ويڪرو پٽ ’ڪاڇو‘ سڏجي ٿو. ڪاڇي ۽ سنڌوءَ جي ميداني علائقي جي وچ وارو سنڌو ’اڀرنڌو نارو‘ آهي، جيڪو تازي پليستوسين عرصي ۾ ٺهيو آهي. مٿيان ميدان جبلن تان لهندڙ پاڻي ۽ هوڻن جي گڏ سبب ٿيل نفيس چن پٿري ذرڙن تي مشتمل کاڌ سان ٺهيا آهن. انهن ۾ ڪيلشيم ۽ مئگنيشم جو چڱو مقدار آهي پر ان ۾ ٽامي، لوھ، جست (zinc)، مئگنيش (manganese) ۽ بورون (boron) جي کوٽ آهي، جيڪي نامياتي عمل ۾ اهر هوندا آهن جبلن سان لڳ ويجهن علائقن ۾ مٽيءَ جي گاري ۾ پٿرڙيون يا بحري موجود آهي، جنهن کي مقامي ماڻهو ساڪر چون ٿا.

انهن ٽڪرين تان برساتي پاڻي نئين جي تيزيءَ سان خارج ٿيندو آهي جنهن سان ڪاڇي جون قدرتي هيٺاهيون ۽ ڏکڻ طرف پٿر ۾ کڏون ڀرجي وينديون آهن. 1932 کان اڳ جڏهن سنڌو ۽ ڪاڇي جي وچ ۾ بچاءُ بند ڪونه هو تڏهن اهو پاڻي اُلهندي ناري تائين ڏوڪيندو هو ۽ وچ واريون ميداني بستيون ناس ڪري ويندو هو. اتر ڪوهستان جو سڀ نئون اولهندي ناري ۾ چوڙ ڪنديون هيون انهن پاڻين سان حمل ڏيندو به ڀرجي ويندي هئي، جنهن جو پاڻي مٿن ناررا وٺي ڊرين ذريعي منڇر ۾ پهچائي سگهجي ٿو.

ٻيون ننڍيون ڏينون وقت سان هر سال سڪي وينديون آهن ۽ زمين جا ڪلراڻا ۽ لوڻيانا مادا رهجي ويندا آهن پر هر سال اها لوڻيات برساتن ۾ لڙهي منڇر ذريعي سنڌو ۽ نيٺ سمنڊ ڏانهن رواني ٿيندي آهي.

ڏکڻ ڪوهستان ۾ سالياني 15-20 سينٽي ميٽر برسات سبب ميدان گاهه سان ڀرجي ويندا آهن گاهن جون پاڙون مٽيءَ کي سوگهو جهلينديون آهن. جنهن ڪري کاڌ جو عمل گهٽ هوندو آهي. پر جڏهن مٽي ان گرفت کان آزاد هوندي آهي تڏهن اها اونھاري جي ڏکڻ-اولھہ-ڏکڻ هوائن دوران سولائيءَ سان (اپريل کان سيپٽمبر تائين) راجستان ۽ جوڌپور تائين اڏامي ويندي آهي. انهن ئي ڏينهن ۾ رائي سبب ڏکڻ سنڌ ۾ گرميءَ جو درجو به ٿي ڊگريون گهٽ ۽ سج جي تپش ۽ روشني ڪجهه جهڪي هوندي آهي. اها دز برساتن دوران ۽ برساتن کان پوءِ وارن ڏينهن ۾ زمين تي اچي پوندي آهي ۽ ڏکڻ سنڌ ۾ سيپٽمبر ۽ آڪٽوبر بيحد گرم ٿي ويندا آهن. هوائن جو سڀ کان اهم ڪم پٿرن کي چلڻ ۽ گهڙڻ هوندو آهي. اٽڪري جبلن جا پاسا ۽ چوٽيون ۽ پٿر هر وقت چلڻا رهندا آهن ان مٽيءَ ۾ نامياتي جزا مشڪل سان هڪ سيڪڙو هوندا آهن.

سنڌ جو جابلو خطو اُتر کان ڏکڻ اٽڪل 360 ميل (575 ڪلوميٽر) آهي. ڏکڻ ۾ ان جي وڌ ۽ وڌ ويڪر 150 ڪلوميٽر (ڪراچيءَ کان ڄامشوري تائين) ۽ گهٽ ۾ گهٽ 35-30 ڪلوميٽر (گاج بنگلي کان ٿڻ تائين) آهي. ان سڄي ڪوهستان ۾ ڪوبه جابلو سلسلو ايترو اوچو نه آهي جو اهو بادلن کي جهلي سگهي يا اهڙي رنڊڪ پيدا ڪري جيئن اتر ۾ هماليه يا هندوڪش وٽ ٿئي ٿو. جبلن جي گهٽ اوچائيءَ جي ڪري هتي رواجي ته نه پويو ڇوڻاسي جا مينهن به گهٽ پون ٿا.

ڏکڻ ڪوهستان ۾ برسات جي شرح 18-20 سينٽي ميٽر آهي. اتر ڪوهستان جي چيڙي تي ڳڙهي خيرو وٽ اها مشڪل سان 7-10 سينٽي ميٽر پوي ٿي. ڏکڻ ڪوهستان ۾ ٿورڙين برساتن ان خطي کي مڪمل صحرا ٿيڻ کان بچائي ورتو آهي. ان برسات تي ٿوري گهڻي لويڙ ٿئي ٿي، جيڪا زمين کي سج ۽ هوائن جي تيزي ۽ خطرناڪ حملن کان بچائي ٿي. وڻ ۽ ٻوٽن جون پاڙون مٽيءَ کي جهلي کاڌ ۽ تباهيءَ کان بچائين ٿيون. اتر ڪوهستان ۾ برسات گهٽ آهي اتي اڪثر ٻن لڳاتار سالن تائين

برساتون نه پونديون آهن ۽ ٿورو گهڻو ڦٽل گاه به مال چڙڻ سبب ختم ٿي ويندو آهي.
انڪري اتر ڪوهستان ۾ هوا ۽ برسات جي کاڌ (erosion) وڌيڪ آهي.

جبل ۾ برسات سياري توڻي اونھاري پوي ٿي پر سياري جي برسات انڪري
فائديمند ۽ بهتر آهي جو ان جي نمي هوا ۾ گهٽ بخار بڻجي ٿي ۽ نميءَ سبب جبل
گاه سان پرڇي وڃن ٿا. پر ضروري آهي ته اها برسات گهٽ ۾ گهٽ هڪ سينتي ميٽر
پوي ته جيئن جَر ۾ پاڻي لهي پوٽا ساوا ٿين.

اتر ڪوهستان ۾ چؤماسو 15 جولاءِ کان شروع ٿيندو آهي ۽ ڏکڻ
ڪوهستان ۾ 7 جولاءِ کان. پر سنڌ ۾ عام طور برساتون تمام گهٽ پون
ٿيون. آسمان تي ڪڪر ڏسبا آهن جيڪي بنا وسڻ جي گرم ٿي ويندا آهن. يا
ته بادل اڃا پوريءَ طرح مڙندا ئي ناهن ته ٽڪڙن مسافرن وانگر جهٽ ۾
اوجھل ٿي ويندا آهن. ان جو سبب به سنڌ جي تپش آهي. هتي برسات جي
شرح ان حد تائين انڪري گهٽ آهي جو تپش سبب هوا سخت گرم ۽ خشڪ
آهي جو برسات جو پاڻي زمين کي ڇُهڻ کان اڳ ئي ٻيهر بخار بڻجي وڃي ٿو.
جيڪڏهن صحرا ۾ چڱي برسات پوي ۽ هڪ ڪلاڪ کن پوي ۽ اها هڪ
سينتي ميٽر کان مٿي پوي ته پوءِ پاڻي وهڻ شروع ٿئي ٿو. پر جيڪڏهن
طوفاني برسات پنجن پنجن کان مٿي پوي ٿي ته وڏا وڏا پٿر به ان ۾ لڙهي وين
ٿا... ان وهڪري جي سامهون جيڪا به شئي، ماڻهو مال جانور يا وڻ آيو سو
ختم ٿيو وڃي. جبل ۾ تيز ۽ ٿوري وقت واري برسات ڪو فائدو نه ٿي
ڏئي. ضروري آهي ته اها گهڻو وقت پوي. ان سان کڏون کوبا پرڇن. جبل جي
ٻوڙن ۾ ۽ جَر ۾ پاڻيءَ جو ذخيرو وڌي ٿو ۽ ڍورين جي پيٽ ۾ جمع ريتي
بحريءَ جي ذريعي جذب ٿيندو رهي ٿو. ٽڪڙو پاڻي هڪدم وهي وڃي ٿو ۽
وڃي مقرر جاءِ تي ڇوڙ ڪري ٿو يا ٻوڏ آڻي تباهي مڃائي ٿو.

کرهستان پر موسر جو چارٽ

بھارات	سج جي روشني علاھ	برسات (ملی میٽر)	گهر جي نسبت (%)	ماڪ جو دھر (%)	ماڪ	گرمي پد وٽ پر وٽ (سٽي گريڊ)	گرمي پد گھٽ پر گھٽ (سٽي گريڊ)	گرمي پد سلسر (سٽي گريڊ)	مھينو
25-51	8.50	5.08	50	3.88	ھا	24.44	10.0	17.22	جنوري
76-102	10.00	5.08	50	7.22	ھا	27.77	11.66	20.00	فيبروري
153-178	9.25	2.54	50	10.55	ھا	33.33	17.22	24.44	مارچ
203-230	10.75	5.08	50	13.33	ھا	38.88	22.22	30.00	اپريل
230-254	10.50	10.16	60	23.88	ھا	42.22	25.55	33.88	مئي
178-203	10.00	76.2	60	23.88	ھا	40.00	27.77	33.88	جون
178-230	8.75	50.8	70	23.88	ھا	36.94	26.80	32.22	جولاءِ
178-203	9.00	15.24	70	22.22	ھا	35.83	25.83	30.38	آگسٽ
178-203	10.50	0	60	20.55	نہ	36.38	25.00	30.00	سيپٽمبر
127-153	10.50	2.54	60	15.00	نہ	36.66	20.83	28.33	آڪٽوبر
51-76	10.00	2.54	60	8.88	نہ	31.11	15.27	23.33	نومبر
51-76	9.00	2.54	60	6.66	ھا	25.55	11.11	20.00	ڊسمبر
1628-1959	9.72	177.6							

کیرتر پر موسر جو چارٽ

بھارات	سج جي رشتي حالاڪ	برسات (ملی میٽر)	گهر جي نسبت (%)	ماڪ جو درجو (%)	ماڪ	گرمي پد وڌ ۾ وڌ (سيٽي گريڊ)	گرمي پد گهر (سيٽي گريڊ)	گرمي پد سلسرو (سيٽي گريڊ)	مھينو
51-76	9.50	5.08	50	5	ھا	21.1	3.3	11.1	جنوري
76-102	10.00	10.16	50	7.2	ھا	24.4	6.7	17.2	فيبروري
153-178	9.00	10.16	40	12.2	ايشيا 15 ڏينھن	34.4	15.6	23.3	مارچ
230-254	9.00	10.16	30	10	نہ	40.0	21.1	30.0	اپريل
203-230	10.50	2.54	30	11.6	نہ	44.9	24.4	33.3	مئي
203-230	10.50	5.08	40	21.6	ايشيا 15 ڏينھن	42.2	25.6	36.1	جون
203-230	9.50	20.32	60	26.6	ھا	40.0	27.8	33.3	جولاءِ
127-153	9.75	2.54	60	28.3	ڪجهه ڏينھن	39.2	27.5	32.3	آگسٽ
153-178	10.50	10.16	60	24.4	ھا	37.8	23.3	31.1	سيپٽمبر
127-153	10.50	0	50	16.1	ھا	35.0	15.0	26.7	آڪٽوبر
51-76	10.50	0	50	8.3	ھا	28.8	7.8	18.3	نومبر
25-51	9.50	2.54	40	6.1	ھا	22.22	4.2	13.1	ڊسمبر
1602-1911	9.85	78.74							

کیرٿر ۾ مختلف نئن جي ڪئچمينٽ

ترتيب	نئ جو نالو	ڪل برسات ڪيويڪ ميٽر	سراسر برسات ملي ميٽر	ايراضي چورس ڪلوميٽر
1.	ڪينجي	59,863,482	114.3	523.74
2.	سيٽا	65,546,478	114.3	573.46
3.	مزاراڻي	57,590,055	114.3	503.85
4.	اونهڙ	37,508,688	114.3	328.16
5.	ٿرڙي	17,428,464	114.3	152.48
6.	اونهڙ ۽ ٿرڙي گڏيل (دلان)	14,775,561	114.3	129.27
7.	ٻُڙي	48,875,823	114.3	427.61
8.	مڪي	67,440,429	114.3	590.03
9.	ٺڪي، سوري، جهول ۽ گاج سنڌ وارو حصو	64,030,860	114.3	560.20
10.	گاج بلوچستان ۾	740,664,000	114.3	648.0
11.	نري	53,421,534	114.3	467.38
12.	انگئي	97,246,567	139.7	696.11
13.	نئنگ	44,917,741	139.7	321.53
14.	Thani	22,690,074	139.7	162.42
15.	نري، انگئي ۽ نئنگ جي ٻوڙ	17,598,009	139.7	125.96
16.	لوئي	11,576,939	139.7	82.87
17.	ٻنڌڻي	7,270,267	139.7	520.42
18.	Chin Cani	58,810,906	139.7	420.98
	ڪُل	1,487,259,180		6586.47
	لڳ ڀڳ 1500 ملين ڪيويڪ ميٽر			

بهرحال. پاڻي 50.000 هيڪٽر ميٽر وهي ٿو جنهن کي مناسب
ٽيڪنڪ ۽ سنڀال سان استعمال ڪجي ته اٽڪل 40.000 هيڪٽر سيلابي
يا هڪ لک ايڪڙ پوک ڪري سگهجي ٿي.

ڪوهستان ۾ مختلف نئين جي ڪئچمينٽ

ترتيب	نءِ جونالو	ڪل برسات ڪيرڪ ميٽر	سراسر برسات ملي ميٽر	ايراضي چورس ڪلوميٽر
1.	بارڻ Baran	490,936,880	174.24	2,817.59
2.	Mahrai Trangur	107,427,670	174.24	616.55
مهاڙي				
3.	ڏيسوئي Desoi	53,153,654	174.24	305.06
4.	Sorhi سوڙهي	90,210,716	200.66	449.57
5.	Kalu Kuhar ڪلر ڪوهر	167,533,040	200.66	834.91
6.	Khadeji ڪڍيجي	105,984,210	185.42	571.59
7.	Mol مول	166,106,290	185.42	626.18
8.	Thaddo Konkar	17,861,508	185.42	96.33
ٺٽي ڪونڪر				
9.	ملير Malir	77,661,930	215.13	361.00
10.	Wattenwari	63,142,926	185.42	340.54
وٽن واري				
11.	لياري Lyari	32,657,948	195.58	166.98
12.	حب Hub	19,627,854	189.48	1,035.88
13.	Jungshahi جنگشاهي	148,618,820	200.66	740.65
14.	رن Ren Pethani	56,744,641	200.66	282.79
پٽيائي				
15.	پپري Pipri	82,104,052	200.66	409.17
16.	لنگهجي Langheji	22,074,606	200.66	110.01
17.	جرندرو Jarandro	22,293,046	185.42	120.23
	ڪل	1,674,139,791		9,944.78

حياتي دني

نباتات ۽ جانور

خشڪ ۽ ويران منظرن واري کيرٿر ۾ زندگيءَ جا اڪيچار قسم موجود آهن. هڪ تازي کوجنا کان پوءِ اندازو هنيو ويو ته هن علائقي ۾ 475 قسم جا ٻوٽا موجود آهن. اوسي پاسي جي خطن مان پڻ نون ٻوٽن، جانورن ۽ پکين جون نيون جنسون هتي اڀرڻ ۽ واڌ ويجهه ۾ مصروف آهن. نباتيات ۾ ٻي، ٿوهر ۽ ٻير جون نيون جنسون *Acacia Senegal*, *Euphorbia*, *Zizyphus nummularia*, *caducifolia*, *Commiphora* علائقي ۾ پکڙجي ويون آهن. جانورن ۾ چنڪارو غزال، بچو يا گوريٽ، آفريڪي گنڊائون، ڪوئي، Cape hare سيڙھ، *Hemiechinu* چاهو ۽ وارياسو ٻلو به هاڻي کيرٿر ۾ رهن ٿا. انهن کان سواءِ آفريڪي نسل جا پکي چٽڪرو، پت تتر، ڊگهي پُچ وارو ريگستاني چنڊول، مشرقي *clandra* چنڊول ۽ ڌاريدار گاهير ڦوسڻي به موجود آهن، جيڪي ايتوپيائي زوئاگرافيڪل خطي جا آهن. ٻين اهم جانورن ۽ پکين ۾ سَڙھ، گڊ، بگهڙ، جهنگراڙ ٻلي چڪور، سيسي تتر، تلور ۽ خطي جا اڪثر لاڏوڻي پکي سياري ۾ هتي موجود هوندا آهن. هتي خطي مان مراد يورپ، اتر آفريڪا ۽ اتر ايشيا *Palacarcctic Zoogeographic Region* خطو آهي. ان حياتيات کان سواءِ کيرٿر ۾ سيڙھ، لومڙ، چلو مرون، سهڙ، کان ڪٽو، چانهه، ڪار- پُٺي گجھه، ڪاريهر نانگ ۽ شاهي ڪوئا مار بلا، پتاپتي هاتار، گدڙ، ڳوھ، باغبان سانڍو، هڻ ڪڙ، نيرو ڪرئون، ڪارو ڪرئون، ڳلوئي، ڪاريهر ڪرٽ، ارڙ، ڪوراڙ، ڊمر، ويٽنس، لُنڊيون، ڪپڙ، عقاب، ڦوسڻيون ۽ ٻيا ٻولڻا پکي رهن ٿا.

کيرٿر ۾ حياتياتي چڪر:

اهو سچ آهي ته صحرا، صحرا ئي آهي ۽ اڪثر حالتن ۾ سمورا صحرا هڪجهڙا لڳندا آهن. عام ماڻهو سمجهندا آهن ته صحرا ڪا ويران

پڙيانگ جاءِ هوندي آهي، جتي اجاڙ پهاڙ ۽ ريگستانن ۾ اُڃ ۽ بڪ پئي واکا ڪندي آهي. بَر ۾ بلائون هونديون آهن. ٻيو مڙئي خيرا اها ڳالهه ڪنهن هنڌ تائين درست آهي ۽ کيرٿر ۾ صحرا جون سموريون وصفون آهن. صحرائي مندُون، صحرائي ٻوٽا ۽ جانور به آهن. پر کيرٿر ۾ زندهه صحرائن وانگر پنهنجو حياتياتي نظام آهي ۽ زندگي پنهنجا سمورا مرحلا ڪاميابيءَ سان مڪمل ڪري ٿي.

هتي مندائتن مينهن ۾، جيڪي اڪثر جُولاءِ، آگسٽ ۽ سياري ۾ پون ٿا گُلدار جهنگلي ٻوٽا ڦٽي اچن ٿا. اهي مختصر عرصي لاءِ (مهينو ڏيڍ) علامتي ڪي جابلو باغ ۾ بدلائي ڇڏين ٿا. اهي ٻوٽا ميوات جهلين ٿا جيڪي پڪي ڪائين ٿا يا وري جڏهن اهي ٻوٽا پنهنجا ٻج وسيع تعداد ۾ ڇڏين ٿا تڏهن انهن تي پڪي پڪڻ، تَنڊڻ ڏينئي، ماکوڙا، پروانا، پويٽ، ٻيا جيت ۽ ننڍڙا جانور تڳين ٿا. انهن جيتن، انهن جي آئن، لارُون ۽ ننڍڙن جانورن تي گوشت خور مماليه، ڪِرڙانگ ۽ ٻيا جانور پڪي پلجن ٿا. انڪري، علامتي ۾ ڳوهر، سانڊا، لومڙيون، گدڙ، بگهڙ، جهنگ پلا، هاتار ڪافي تعداد ۾ آهن. جابلو پهڙو سره، گڊ، هرڻ ان چراگاهه جي مناسب ماحول ۾ نسل وڌائين ٿا. جيئن ته اهي موسمي ۽ ارضياتي حالتون انسانن لاءِ سخت آهن، انڪري هتي، جهنگلي جيوت محفوظ طور پلجي ٿي ۽ هيترن شڪارين جي اڃ وڃ جي باوجود مڪمل خاتمي کان بچي وئي آهي. انڪري ئي کيرٿر جي ڏاکڻي حصي کي، ’کيرٿر نيشنل پارڪ‘ جو درجو حاصل ٿيو آهي. برساتي مندَن دوران کيرٿر ۾ وڏو ڇهڇهو هوندو آهي. جڏهن ريڍار ٻڪرار پنهنجو مال ڪاهي جُوءِ ۾ نڪري پوندا آهن، تڏهن سندن جُهونگارون، پکين جون ٻوليون، مال جي خوشي ۽ نظارا سڀڪجهه ڏسڻ جهڙا هوندا آهن. هڪ فقير جي لفظن ۾، ”وينو مولا جا رنگ ڏس!“

پر جڏهن مندُون موٽي وينديون آهن ته اهو به ’مولا جو رنگ‘ هوندو آهي. ماحول اُڃايل صحرا ٿي پوندو آهي، سخت تپش ۽ گهٽ خوراڪ سبب اڪثر جانور مري ويندا آهن. اهو وقت دوزخ ۾ جيئڻ جي برابر هوندو آهي،

خاص ڪري اپريل، مئي، جُونِ ۽ جولاءِ جا مهينا. بس! ويچارا ساهسي ڪوشش ڪري محفوظ ترين جاين ڏانهن لڏي ويندا آهن. سڄو ڏينهن ڪٿي ڌڙن جي ڇانوَ ۾ لڪي ويٺا هوندا آهن ۽ صبح يا شام جي ڪجهه ٿڌن بهرن ۾ ڊاٽي پاڻيءَ لاءِ نڪرندا آهن.

هن علائقي ۾ برسات جي شرح 250 ملي ميٽر سالياني کان به گهٽ ٿئي ٿي ۽ گرمائش تمام گهڻي. گهٽ گهر سبب بخارات يا ٻاڦ جو عمل گهڻو آهي جيڪو عام حالتن جي پيٽ ۾ ڏهوڻو ٿي سگهي ٿو. پنهور صاحب موجب سج جا ڪرڻا ڌرتيءَ تي 90 سيڪڙو پهچن ٿا، انڪري خشڪي ريگستان جي مکيه صفت بڻجي ٿي.

کيرٿر ۾ حياتياتي چڪر

دنيا ۾ صحرا ٻن قسمن جا ٿين ٿا. هڪڙا اهي جن ۾ زندگيءَ جو نالو نشان به نه هوندو آهي، اهي مٿل دنيا وانگر هوندا آهن، ۽ ٻيا اهي جن ۾ بظاهر مڪمل موت نظر ايندو آهي پر اتي حياتي موجود هوندي آهي پر صرف اکين کان اوجھل ٿئي ٿي. اتي پاڻي، نمي ۽ نباتات گهٽ ٿئي ٿي پر اتي جا رهواسي انهن حالتن موجب پنهنجو پاڻ کي تبديل ڪري چڪا هوندا آهن. کيرٿر ۾ حياتياتي چڪر ڪنهن به ٻئي زرخيز خطي کان مختلف نه آهي. ماڳهي اسان ڏسون ٿا ته هن جهان ۾ ست عدد مختلف ماحول آهن جن ۾ مختلف قسمن جا جاندار رهن ٿا.

وڻ ۽ ٻوٽا:

سنڌ جي صحرائن ۾ وڏن وڻن جي کوٽ آهي. اتي وڻن جون ڪي ٿوريون جنسون نظر اينديون آهن. البت کيرٿر ۾ جهنگلي ٻوٽن ۽ ٻوٽن جي کوٽ نه آهي. اهي ئي ٻوٽا کيرٿر ۾ زندگيءَ جي سڄي حياتياتي چڪر کي سنڀاليو بيٺا آهن. اتان جي چراگاهي ماحول ۾ گهٽ ۾ گهٽ 2000 قسم جا ٻوٽا آهن. پر اهي ٻوٽا جبل جي ڪڇ ۾ موجود ڍنڍن، جابلو ميداني چراگاهن،

نئن جي پيٽن، جبل جي ڪرنگهي ۽ اونهن ڏرڙن ۾ آهن، انهن تائين عام انسان کان وڌيڪ جهنگلي جيوت جي پهچ هوندي آهي.

وڻ ڊگها ٻوٽا هوندا آهن، جن جو ٿڌو ڪاٺ جو هوندو آهي. اهي عام طور تي ويهارو کن فٽن جي اوچائيءَ تائين وڌندا آهن، پر کيرتر ۾ ايئن تمام گهٽ آهي. ڪجهه ٻوڙا به ڪافي اوچا هوندا آهن جيئن سنڌ جي صحرائن ۾ ڪٻڙ آهي ان قسم جي ٻوڙن جا ڪيئي ٿڌا هوندا آهن.

دنيا ۾ وڻ ٽن قسمن جا ٿين ٿا، ويڪرن پنن وارا پن گهڻي برسات يا وڌيڪ پاڻيءَ واري ماحول ٿيندا آهن جيڪو کيرتر ۾ ڪونه آهي. ٻيا مخروطي شڪل جا وڻ جيئن سرو ۽ ڪڇي، انهن مان ڪڇي کيرتر جي نخلستانن ۾ ٿئي ٿي. يا وري ان جنس جو ٻوٽو ڦيش آهي پراڻو ايترو ڊگهو ڪونه ٿيندو آهي، جو ان کي وڻن ۾ شامل ڪجي.

وڻ، خاص ڪري ڪڇي به حقيقت ۾ هڪ قسم جو ڊگهو گاهه آهي. وڻن جي ٿڌ تي چوڏو چڙهيل هوندو آهي، شاخن ۽ تارين جو بار ٿڌ تي هوندو آهي. شاخن تي پن، گل ۽ ميوا لڳندا آهن. ڪجهه وڻن ۾ ميون جي بدران ڪوڪڙا لڳندا آهن. وڻ وڏو هجي يا پاڻي هيٺ هجي ته وڻ جو پاڙون زمين ۾ اندر ڪافي پري تائين وينديون آهن. پاڙون وڻ جو وزن سنڀالينديون آهن ۽ ان کي مضبوطيءَ سان زمين ۾ جهلي بيهارينديون آهن. پاڙن جي ذريعي وڻ پاڻي ۽ معدنيات کي جذب ڪندو آهي.

صحرائي وڻ جي زندگيءَ ۾ شروع جا ڪجهه هفتا يا مهينا ڏاڍا ڏکيا سوندا آهن. نئڻ جي پيٽ ۾ بيٺل هڪ وڏو لوهيڙو هزارين ٻج پيدا ڪندو آهي، پر انهن مان ڪي ٿورڙا ٻج ئي وڻ ٿي سگهندا آهن. ٻج ۾ بند غذا گهڻو عرصو نٿي رهي. جڏهن حالتون سازگار هونديون آهن، تڏهن ٻج ڦٽندو آهي ۽ ٻوٽو نِسرندي آهي.

ٻج زمين تي ڪرندو ضرور آهي، پر جڏهن ان کي مناسب اُس ۽ پاڻي ملي تڏهن ئي ڦٽندو آهي. ٻج جو وڌيل اندروني حصو ٻج جي ٻاهرين خول ۾ ڌار وجهندو آهي، پوءِ ان مان هڪ پاڙ نڪرندي آهي ۽ زمين ۾

پنهنجي جاءِ ٺاهي وٺندي آهي. جڏهن اها پاڙ وڌي زمين ۾ مضبوط ٿي ويندي آهي، تڏهن بچ جو خول پاڻمرادو ڌار ٿي ويندو آهي. بچ مان نڪرندڙ گوڻج نئين ٻوٽي کي ان وقت تائين ضرورت مطابق قوت پهچائيندا آهن، جيستائين اصلي پن نڪري اچن. اصلي پن ۽ انهن مان نڪتل ننڍيون ننڍيون پاڙون به ٻڌنديون ۽ پکڙجنديون رهنديون آهن. ايندڙ سال ان ننڍڙي وڻ ۾ مڪڙيون، چوڏا ۽ ڪاٺ جو هڪ ننڍڙو ٿڙ به ظاهر ٿيندو آهي. وڻ ۾ ڪاٺ جو هڪ ٿلهو ڏندو هوندو آهي جنهن کي ٿڙ چئبو آهي. ڪجهه وڻن جو ٿڙ سڌو ۽ ڊگهو هوندو آهي. ڪجهه وڻن جو ٿڙ ٻن ٽن شاخن ۾ ورهايل هوندو آهي.

وڻ جڏهن وڌندا آهن ته مختلف شڪليون اختيار ڪندا آهن. ان جو دارومدار وڻ جي قسم تي آهي. ويڪرن پنن وارا وڻ گنبدي شڪل ۾ وڌندا آهن. ڪي وڻ مخروطي هوندي آهن. ڪجيءَ جو نمونو پکي وانگر هوندو آهي. وڻ جي شڪل تي زمين ۽ موسم جو ڪافي اثر پوندو آهي. سنڌ جي ڏاکڻي جابلو حصي ۾ هڪ ئي پاسي کان هلندڙ لوڻيائين سامونڊي هوائون وڻن کي هڪ ئي پاسي ۾ وڌڻ ڏينديون آهن. اهي وڻ جيڪي جابلو لاهين تي ڦٽندا آهن، گهڻا ڊگها ۽ گهڻا ڪونه ٿيندا آهن. انهن جون تاريون به ننڍيون هونديون آهن. ان جو سبب خشڪ هوائون آهن. کيرٿر ۾ اڪثر وڻن کي پوري ڄمار نصيب نه ٿيندي آهي، اهي جلد ئي ٻڪرارن هٿان وڃي ويندا آهن. ڪجهه وڻن کي ان طرح ڇانگيو ويندو آهي يا انهن مان رس ڪڍي ويندي آهي جو واڌ بند ٿي ويندي اٿن، ۽ مري ويندا آهن. مقامي ماڻهو پوءِ انهن کي ٻارڻ ڪريو ڇڏين.

مختلف وڻن ۽ ٻوٽن جا پڻ مختلف شڪيلن ۽ ڊيگهه جا هوندا آهن. ڪجهه پنن جا ڪنارا سڌا يا هموار هوندا آهن ۽ ڪجهه پڻ نوڪدار ۽ لهر دار هوندا آهن. ڪن صحرائي ٻوٽن جا پڻ سڀن يا ٽيلين وانگر هوندا آهن. گهڻا پن سائي رنگ جا هوندا آهن پر ڪن پنن جو رنگ پيلو، نارنگي ۽ پورو به ٿي سگهي ٿو. ساوڻ پنن ۾ هڪ مادو ڪلوروفيل هوندو آهي. پڻ اُس جي ذريعي وڻن لاءِ غذا ٺاهيندا آهن. پنن ۾ سنهنا سنهنا سوراخ ٿيندا

آهن. ڏينهن جي وقت ۾ پَن هوا مان ڪاريان ڊاءِ آڪسائيڊ کڻندا آهن ۽ ماحول ۾ آڪسيجن ڇڏيندا آهن. پَن انهن سوراخن جي ذريعي رطوبت به خارج ڪندا آهن. پَن جي ٺاهيل غذا گلوڪوز آهي. اها ننڍين ننڍين نسن يا رڳن جي ذريعي وڻ جي مختلف حصن ۾ ويندي آهي، جتي اها استعمال يا ذخيرهو ٿي ويندي آهي. اڪثر وڻن جا پن سال ۾ هڪ ڀيرو ڇڻي ويندا آهن، پوءِ انهن جي جاءِ تي نوان پن ڦٽي پوندا آهن.

چوڙو ڄڻ ته وڻ جي ڪل آهي. اهو مٿيون حصو وڻ کي سڄ، برسات ۽ ڦٽڪيءَ کان بچائيندو آهي. وڻ ۾ مٿئين حصي ۾ چوڙو ڪافي سٺو ۽ هموار هوندو آهي، پر هيٺيون حصو عام طور ڪهرو هوندو آهي ۽ ان ۾ ڌار پيل هوندا آهن. وڻ جيئن جيئن وڌندو ۽ پکڙجندو آهي، تيئن تيئن پراڻو ڌريل چوڙو لهي ويندو آهي، ۽ ان جي هيٺان ٺهيل چوڙي جو نئون تهه مٿي اچي ويندو آهي، بلڪل ايئن جيئن نانگ ڪينچلي بدلائيندو آهي. وڻ جي قسم مطابق چوڙو ٿلهو يا سنهو ٿيندو آهي.

نوريٽڙا، پکي ۽ ٻيا جانور چوڙي کي نقصان پيا پهچائيندا آهن، مثال طور ڪاٺ ڪٽا وغيره چوڙو توڙي ان ۾ اندر پنهنجا اکيرا ٺاهيندا آهن، نوريٽڙا ٿڌن مان مٺي رس حاصل ڪرڻ لاءِ چوڙي کي برباد ڪندا آهن. جڏهن چوڙو آلو هوندو آهي ته ان تي سينور يا ڦٽڪي لڳندي آهي. سينور وڻ ۾ اندر تائين هليو ويندو آهي ۽ ڪاٺ کي ڳاري ساڙي ڇڏيندو آهي، پوءِ وڻ سڙي مري ويندو آهي. ٽنڊڻ، پونٿرا ۽ ڪاٺ ۾ سوراخ ڪندڙ ٻيا جيت به چوڙن ۾ رهندا آهن ۽ ڪاٺ کي پتو يا ڪمزور ڪندا رهندا آهن. ان ريت وڻ اسان جي کيرٿر جي دنيا ۾ حياتياتي نظام جو پهريون بنيادي مرحلو آهي. جنهن ۾ جيت جڙا ۽ ننڍا جاندار وڻن ۾ پناهه ۽ خوراڪ گولين ٿا.

وڻ جو سڀ کان اهم حصو گل ٿئي ٿو، ايئن به چئي سگهجي ٿو ته وڻ جي زندگيءَ جو حاصل مقصد گل ۽ ٻج پيدا ڪرڻ آهي. گل (سواءِ ڪن ٿورين جنسن جي) سڀني وڻن ۾ ڦٽندا آهن. گل مان ميوو حاصل ٿيندو آهي جن مان ٻج ملندا آهن. نوان وڻ پيدا ڪرڻ لاءِ ٻجن جي ضرورت هوندي آهي.

چو ته ان سان ئي ان وٽ يا ٻوٽي جو نسل اڳتي وڌندو آهي. هر جنس جي وٽ جا گل ٻي جنس جي وٽ جي گلن سان ماپ شڪل ۽ رنگ ۾ مختلف هوندا آهن. اڪثر وڻن جي گلن ۾ نر عضوا هوندا آهن، جن کي نر وار چئبو آهي. ڪجهه وڻن ۾ مادي عضوا هوندا آهن. ڪن گلن ۾ هڪ ئي وقت نر ۽ مادي عضوا هوندا آهن. جڏهن هڪ گل جو ٻور ٻئي گل تائين پهچندو آهي ته اسان ان کي ڳچڻ يا لڳ جو عمل چوندا آهيون. ٿوري وقت کان پوءِ اهو گل ميوو ۾ تبديل ٿي ويندو آهي، جنهن ۾ بچ هوندا آهن.

اهي ئي جيت جيڪي گلن مان خوراڪ يا پناهه حاصل ڪرڻ ايندا آهن، غير شعوري طور گلن ۾ لڳ جو عمل مڪمل ٿيڻ ۾ مدد ڪندا آهن. هوا به پنهنجو ڪردار ادا ڪندي آهي. جيت جن گلن ۾ ٻور پهچائيندا آهن، انهن ۾ مٺي رس هوندي آهي، اهو ئي سبب آهي جو انهن گلن ۾ ماکيءَ جي مکين، پويتن ۽ ٻين مکين لاءِ ڪشش هوندي آهي. گلن جي خوشبوءِ جيتن کي پاڻ ڏانهن ڇڪيندي رهندي آهي.

جڏهن ڪنهن گل تي ٻور لڳي پوندو آهي، تڏهن ڪنهن گل جا مادي عضوا ميوو يا پير ٺاهيندا آهن. هوا وڻن جا ميوو، پير ۽ پيرون وغيره زمين تي پکيڙي ڇڏيندي آهي. سُهڻن رنگن وارا منا ۽ رسدار ميوو، پيرون ۽ پير پکي ۽ ڪي ڪي معاليه به کائيندا آهن يا انهن کي پاڻ سان کڻي گهڻو پري وڃي ان جو ذخيرو ڪندا آهن. جيڪي بچ پکين ۽ جانورن جو کاڌ ٿيڻ کان بچي ويندا آهن ۽ انهن کي خوش قسمتيءَ سان مناسب ماحول ملي ويندو آهي، انهن مان نوان ٻوٽا ڦٽي ايندا آهن. گهڻا وڻ ميون بدران سخت ڦريون ۽ ڪوڪڙا پيدا ڪندا آهن. ڪي وڻ ڊگهيون انٽريون جهليندا آهن جن ۾ بچ ڀريل هوندا آهن. انٽريون ڦاٽي پونديون آهن ۽ بچ هوا ۾ پکڙجي ويندا آهن.

کيرٿر ۾ قدرتي بيلا ڪونه آهن. البت اڪثر نئن جي ٻيٽ ۾ سٺي وڻڪار ٿيندي آهي جنهن کي هر سال تيز برساتي وهڪرا پاڙون پتي لوڙهي ويندا آهن. کيرٿر جي اولهه ۾ ٽڪي بارڻ ويجهو نءُ بارڻ جي ڪنڌين تي قدرتي بيلا موجود هئا، پر هاڻي ماڻهن اهي وڏي ڇڏيا آهن. کيرٿر جي نئن ۾

تارو لئڻ ڪنڊي ۽ لوهيڙو گهڻو ڏسبو آهي. ڦيش، ڪجي، ڪبڙ به ڄام ٿئي ٿو. جبل تي مٿي ٿڌن علائقن ۾ جهنگلي ڏاڙهون، بادام ٿوري تعداد ۾ آهي پر گهو ڄام ٿئي ٿو. کيرٿر ۾ وڻ جو دشمن ان جو پنهنجو ڪاٺ آهي. ڪاٺ فائديمند شئي آهي. ماڻهو زمانن کان وٺي باهه ٻارڻ ۽ جهوپڙيون ٺاهڻ لاءِ ڪاٺ استعمال ڪندا پيا اچن. انهن وڻن کي ڪيئي نمونن سان نقصان پهچي سگهي ٿو. جيت، مثال طور ڪاٺ خور يا پَن خور مڪيون وڻن ۾ رهنديون آهن. اُڏوهي، ۽ ٽنڊڻ وڻن جي پاڙن کي نقصان پهچائيندا آهن. پهرو ڪُتريندڙ جانور ۽ پکي وڻ جي ڪجهه حصن کي نقصان پهچائيندا آهن. وڻ عام طور تي اهڙن حملن جو مقابلو ڪري ويندا آهن پر انسان وڻن کي تمام گهڻو نقصان ڏيندا آهن. اهي وڻن کي وڍي، تاريون پيچي ڇڏيندا آهن. ڦنگي بيماريون وڻن تي حملي آور ٿينديون آهن. ڪن وڻن کي وڻ ويڙهيون ويڙهي سگائي ڇڏينديون آهن. اهي بي پاڙيون وليون پين ٻوٽن کان طاقت وٺي زندهه رهنديون آهن. ڪڏهن فنڪس پڪڙجندي آهي ته سٺي کان سٺي ٻوٽي کي به ساڙي ڳاري ڇڏيندي آهي.

وڻ ۽ هيل جهنگلي جانورن، پکين ۽ جيتن جي زندهه رهڻ لاءِ ضروري آهن. اهي جهنگلي مخلوق جو گهر آهن. پکي وڻن ۾ پنهنجا اکيرا ٺاهيندا آهن ۽ انهن کي وڻن مان ئي پنهنجي خوراڪ جو اڪثر حصو ملندو آهي. جيت به وڻن ۾ پنهنجا گهر ٺاهيندا آهن. ڏينپو ۽ ماڪيءَ جون مڪيون مانارا جوڙينديون آهن. پويت ۽ ٽنڊڻ پَن کائيندا آهن. نوريٽڙا وڻن جي ٿڙن ۾ پنهنجا گهر ٺاهيندا آهن. سها، پهرو، لومڙيون ۽ ٻيا گهڻا جانورن وڻن جي هيٺان رهندا آهن، ۽ انهن کي پنهنجي حفاظت لاءِ استعمال ڪندا آهن.

پَن ۽ تاريون وڻن تان ڪري ڳرڻ کان پوءِ مٽيءَ کي زرخيز ڪري ڇڏيندا آهن، انهن ۾ جيتن ۽ ٻي مخلوق جي تمام سٺي اوسر ٿيندي آهي. اهي ڪريل پَن ۽ تاريون مياڪوڙين سانپن، سؤيرين ۽ قسم قسم جي جيتن لاءِ گهر جو ڪم ڏينديون آهن. سچ پچ ته وڻ نه رڳو ميدانن ۾ پر صحرائن ۾ به قدرت جي نظام ۾ توازن رکن ٿا.

سڀني جنسن جا ٻج ماڻ، شڪل ۽ رنگ ۾ مختلف هوندا آهن، پر انهن سڀني جو بنيادي نمونو ساڳيو هوندو آهي. ڪوبه ڳيٺيل ٻج ٻوٽو بڻجي نٿو سگهي ٿو. سڀ ٻج ته نه، بهرحال، انهن مان اڪثر وڻ بڻجي ويندا آهن. جڏهن ٻج زمين تي ڪرندا آهن، تڏهن امڪان هوندو آهي ته ٻج جي اندر زندهه حصو پاڙ ۽ سلو ڪڍي ۽ ڦٽي پوي. پر ان لاءِ ضروري آهي ته ٻج کي ضرورت مطابق گرمائش، نمي ۽ هوا ملي.

پنهنجي اصل وڻ تان ڪريل ٻج به ڦٽي سگهي ٿو پر ممڪن آهي ته اهوان مضبوط ۽ صحتمند ٻوٽي جي هيٺان اُڀري نه سگهي. ٻوٽن ٻج کي ٻين جاين تائين پکيڙڻ لاءِ پنهنجا طريقا اختيار ڪيا آهن. ان کي ٻج جو ڦهلاءُ چئبو گهڻا ٻج هوائن جي ذريعي پکڙجندا آهن. ڪي ميوا جانور ۽ پکي کائيندا آهن انهن ميون ۾ اندر سخت ڪوپو هوندو آهي، انڪري جانور انهن کي هضم ڪري نه سگهندو آهي. اهي جسر مان لنگهي ڦولڙين سان ٻاهر نڪري ايندا آهن. ڪي ٻج ننڍڙن وڪڙدار ڪنڊن سبب جانورن جي پشم سان چپٽي پوندا آهن ۽ پري پري وڃي پهچندا آهن. وهندڙ چشمن جي ڪناري کي ٻج پاڻيءَ ۾ ڪري پوندا آهن ۽ سطح تي ترندا پري هلندا آهن. اهي ٻج هلڪا ۽ سٺا هوندا آهن. ڪي ٻج ڦوٽن، ڦرين يا ڪيپسولن ۾ ٿيندا آهن جيڪي ٻجڻ تي ڦاٽي کلي پوندا آهن.

گلن وارا ٻوٽا هر هنڌ ڦٽندا آهن. جيڪڏهن ٻج ڪنهن اهڙي جاءِ تي پهتو جتي حالتون سٺيون ۽ سازگار آهن، اهو ڦٽي پوندو ۽ مضبوط ٻوٽو بڻجي ويندو. تمام گهڻا گل قدرتي جهنگلي ماحول ۾ ڦٽندا آهن. اهي رستن جي پاسن کان، نئن جي ڪنارن تي ۽ خالي ميدانن ۾ ڦٽي پوندا آهن. جهنگلي گلن وارا ٻوٽا سخت جان ۽ مضبوط هوندا آهن ۽ لڳ ڀڳ هر جاءِ تي ڦٽي سگهن ٿا.

ڪي زمينون گهڻي پاڻيءَ واريون ۽ گيرائيون هونديون آهن، ٻيون خشڪ ۽ وارياسيون ٿين ٿيون. ڪجهه زمينن ۾ تيزابيت هوندي آهي. جهنگلي گلن وارا ٻوٽا هر قسم جي زمين ۾ ڦٽندا آهن، مٽي، چاڪ، سينواريل نباتيات

يا واريءَ ۾. تمام خشڪ ۽ سخت گرم صحرائن ۾ ڪي گهڻا ٻوٽا نه ٿيندا آهن پر ڪي ٿورڙا بچي به پوندا آهن. گرمي پد جو هراڻ جاءِ تي وڏو اثر ٿئي ٿو جتي ٻوٽا ٿين ٿا.

معالیه:

کيرٿر جي حياتياتي چڪر جو هڪ اهم حصو معالیه (mammals) به آهن. دنيا ۾ مختلف قسم جا هڪ ڪروڙ جاندار آهن. انهن ۾ پکي، ريڙهيون پائيندڙ جانور (ڪريڙاڻگ reptiles)، مڇيون، ڪينڙاڻ، ماکوڙا يا جيت ۽ هڪ ئي وقت خشڪي ۽ پاڻيءَ ۾ رهندڙ جَلَقَلِيَا (amphibian) به شامل آهن. انهن ئي جانورن مان هڪ قسم معالیه آهي. معالیه اصل ۾ کير پياريندڙ جانورن کي چئبو آهي. معالیه جاندار پکين، جيتن، ماکوڙن ۽ ٻين جانورن کان مختلف آهن. انهن جي جسم تي وار ڪل ۽ پشم ٿيندي آهي. ٻيو اهو ته انهن جو رت گرم هوندو آهي. يعني سياري يا اونھاري ۾ انهن جي جسم جي گرميءَ جو درجو ساڳيو رهندو آهي. تيون هي ته کير پياريندڙ جانور هميشه پنهنجي ماءُ جي کير تي پلجندا ۽ وڏا ٿيندا آهن.

معالیه جانورن جي جسم ۾ هڏين جو ڍانچو ۽ ڪرنگهي جي هڏي هوندي آهي. جيڪا جسم جي وچ مان لنگهندي آهي. معالیه آنا نه پر اهي بچا ڏيندا آهن. معالیه جانورن جي هلڻ، گهمڻ ۽ ڦرڻ جا ڪيئي طريقا آهن. ڪي معالیه زمين تي ريڙهيون پائيندا آهن، ڪي ڊوڙندا آهن، ڪي ٽپا ڏيندا آهن ته وري ڪي وڻن جي تارين تي لڏندا آهن. کيرٿر ۾ توڻي سڄي سنڌ ۾ وڻن جي تارين تي لڏڻ وارو ڪو به معالیه ڪونه آهي.

کيرٿر ۾ معالیه جا گهڻي ئي ڪُٽنب آهن. مثال طور ٻليءَ جي ڪُٽنب ۾ جهنگراڙ ٻلي، هرول، ڦيڪاريو ۽ چتو شامل آهن. اهي سڀ ٻين جانورن جي پويان ڊوڙي انهن جو شڪار ڪندا آهن. ڊگهي تنگن وارا پشم دار ڪُٽنب جا جانور تمام تيز ڊوڙندا آهن. کيرٿر ۾ سرھ (جابلو پڪر) ۽ هرڻ

وغیرہ جون تنگون ڊگھيون ۽ سنهيون ٿينديون آهن. هتي چمڙو کير پياريندڙ واحد مخلوق آهي، جيڪا اڏامي سگهي ٿي.

ماليه مختلف قسمن جون شيون کائيندا آهن. انهن جانورن جي جسم ۾ موجود ڪي خاص عضوا ڏسي اسان اندازو هڻي سگهون ٿا ته اهي جانور ڪهڙيون شيون کائيندا هوندا، مثال طور سامهون وارا وڏا ڏند، ڏانن کان اڳ نوڪدار ڏند، وات جي بناوت ۽ ڇاڙيءَ جو نمونو. نهنن ۽ چنبا وغيره گوشت خوريءَ ڏانهن اشارو ڪن ٿا. گوشت خور جانور پنهنجا چنبا ۽ ڊگها ڏند جانورن کي جهلڻ ۽ چيرڻ ڦاڙڻ ۾ استعمال ڪندا آهن.

ڪُٽري کائيندڙ جانور جهڙوڪ ڪوئي، نوريڙي ۽ لڏڙي جا سامهون وارا ڏند ڊگها نوڪيلا ۽ تمام تيز هوندا آهن. گاهه خور جانور ساون پتنن ۽ چاري تي گذارو ڪندو آهي ۽ پنهنجو کاڌو چٻاڙي تمام سنهو ڪري پوءِ ڳهنڊا آهن. گوشت خور جانورن جا ڏند تيز ۽ نوڪيلا هوندا آهن. اهڙيءَ طرح اهي گوشت کي چيري ڦاڙي سولائيءَ سان کائي ويندا آهن. سڀ ڪجهه کائيندڙ جانور انسانن وانگر گوشت ۽ گاهه پوتا کائيندا آهن. جيت خور جانور مثال چليرو اڏوهيون، ماکوڙا ۽ ٻيا جيت کائيندا آهن.

اسان جا صحرائي ماليه جسم جي مختلف عضون مان مختلف ڪم وٺندا آهن. جن ماليه جي مٿي تي سڱ هوندا آهن. اهي انهن کي پنهنجي بچاءُ يا ويڙهه لاءِ استعمال ڪندا آهن. کير پياريندڙ جانورن ۾ ڪرنگهي جي هڏي ضرور هوندي آهي. انهن جانورن جو پُچ ڪرنگهي جي هڏيءَ سان لاڳيتو جڙيل هوندو آهي. هر جانور جو پُچ مختلف قسم جو هوندو آهي. ڪي جانور پاڻ کي گرم رکڻ لاءِ پنهنجي پُچ کي مفلر طور استعمال ڪندا آهن، ڪي ان کي لوڏي مڪيون به هڪليندا آهن. ڪتو خوشيءَ ۾ پُچ لوڏيندو آهي ۽ ڊپ مهل ان کي ٻنهي تنگن جي وچ ۾ دبائي ڇڏيندو آهي.

وڏي جسم وارا ماليه عام طور تي کليل ماحول ۾ رهندا آهن. اهي گهر نه ٺاهيندا آهن ۽ اڪثر گروهه جي صورت ۾ رهندا آهن ته جيئن محفوظ رهن. تيز چنبن وارا ڪي ماليه پاڻ کي خشڪ ۽ گرم رکڻ ۽ دشمن کان بچاءُ

لاءِ گهر يا آکيرا ناهيندا آهن يا زمين ۾ جُر کوتي وٺندا آهن. ڪي جانور پنهنجا گهر وٺڻ جي کوکڻ ٿڙڻ ۾ يا پٿرن پٿرن ۽ ڇنڇن جي وچ ۾ ناهيندا آهن. سڀا زمين ۾ اندر اٽڪڙ وٺڙ سرنگهون کڻيندا آهن ۽ ڪنهن گهيريل جاءِ ۾ رهندا آهن. ڇچوندر به ساڳي طرح زمين ۾ سرنگهون کڻيندا آهن.

پيدائش جي وقت مماله جي ٻچن جي جسماني ڪيفيت جدا جدا هوندي آهي. ڪجهه جانورن جا ٻچا ٻڏي، ڏسي ۽ سونگهي سگهندا آهن. انهن جي سڄي جسم تي وار هوندا آهن ۽ اهي هڪ ڪلاڪ جي اندر گهمي ڦري ۽ ڊوڙي سگهندا آهن. سڀ دار گروه جي تقريباً سڀني جانورن جا ٻچا ايئن چمندا آهن. ڪُٽري کائيندڙ جانورن جهڙوڪ ڪوئي ۽ نورٽري جي ٻچن جي پيدائش وقت انهن جي جسم تي گلابي رنگ جي ڪل هوندي آهي. انهن جي جسم تي وار نه هوندا آهن. پيدائش وقت اهي نه ڏسي سگهندا آهن ۽ نه ٻڏي. ٻلي جي ڪُٽب سان تعلق رکندڙ جانورن جي ٻچن جي جسم تي پيدائش وقت وار يا پشم هوندي آهي. جيت خور جانور ڇچوندرجو ٻچو ماءُ جي پيٽ ۾ به هفتا رهندو آهي ڪن جانورن جا ٻچا ماءُ جي پيٽ ۾ ڪجهه مهينا رهندا آهن. ڪي مماله هڪ کان وڌيڪ ٻچا ڏيندا آهن.

مماله جانورن جا ٻچا جسماني طور مڪمل ٿيڻ کان اڳ پيدا ٿي ويندا آهن، مماله پنهنجي ٻچن جي سار سنڀال سٺي نموني ڪندا آهن. ماءُ انهن کي کير پيئاريندي آهي، دشمنن کان بچائيندي آهي ۽ زبان سان چٽي صاف سٿرو رکندي آهي. ڪجهه مماله تمام جلد وڏا ٿي ويندا آهن، مثال طور ڪُٽري کائيندڙ جانور فقط ٻن هفتن ۾ پنهنجو ٺڪاڻو ڇڏي ويندا آهن ۽ چئن هفتن ۾ پاڻ ٻچا جڻڻ جي لائق ٿي ويندا آهن.

ڪي ڪي مماله پنهنجي ڪُٽب جي ٻين جانورن سان گڏ رهڻ پسند نه ڪندا آهن پر اڪثر مماله ڪُٽب يا گروه ۾ رهندا آهن. گڏ رهندڙ جانور عام طور تي پاڻ ۾ مٿ مٿ هوندا آهن. عام حالتن ۾ هر گروه جو هڪ اڳواڻ يا سربراه هوندو آهي. ڏڻ ۾ جانورن جو تعداد انهن جي پنهنجي نسلي افزائش مطابق هوندو آهي. بگهڙ ڏهن کان سورهن جي تعداد ۾ گڏجي شڪار

ڪندا آهن. ڪُٽري ڪاٺيندڙ جانور پنهنجي ڪالوني ۽ ۾ يا ڪنهن گهيрил جاءِ ۾ هزارن جي تعداد ۾ گڏجي رهي سگهن ٿا. ڪي جانور جوڙن جي شڪل ۾ گڏجي رهندا آهن. نر ۽ مادي گڏجي شڪار ڪندا آهن ۽ ٻچا به گڏجي پاليندا آهن. ٻچا وڏا ٿي پنهنجي لاءِ ڪو ساٿي ڳولي وٺندا آهن.

مماليه ۾ ڏسڻ، ٻڌڻ، چُڻڻ، ڍڪڻ ۽ سونگهڻ جي صلاحيت هوندي آهي. اهي انسانن وانگر ڳالهائي نه سگهندا آهن پر ڪي جانور مختلف قسمن جا آواز ڪڍي سگهندا آهن. رات جو شڪار ڪندڙ جانورن جي نظر تمام تيز هوندي آهي. ساڳي طرح جيڪڏهن ڪو جانور زمين ۾ اندر رهي ٿو ته پوءِ ان ۾ اونڌاهيءَ ۾ رهڻ جي عادت ٿي پوندي آهي. مماليه ۾ شايد سونگهڻ جي صلاحيت سڀ کان وڌيڪ تيز هوندي آهي. ان صلاحيت سبب انهن کي ٻين جانورن جي موجودگيءَ جو احساس ٿي ويندو آهي ۽ غذا به ڳولي وٺندا آهن. اڪثر مماليه کي سڀ ڪجهه فقط اڇو ۽ ڪارو ئي نظر ايندو آهي. گهڻن جا ڪُن وڏا هوندا آهن، جن کي آواز ڏانهن موڙي وٺندا آهن ۽ تمام پري کان ايندڙ ڪافي ڏيما آواز به ٻڌي وٺندا آهن. ان لاءِ سهڙ جو مثال مناسب آهي.

ڪي مماليه تمام بهادر هوندا آهن ۽ دشمن سان چمي مقابلو ڪندا آهن. ڪي سادڙا ۽ معصور هوندا آهن ۽ ٻچي جند ڇڏائيندا آهن. مقابلي جي وقت پهرو ۽ ٻيا مماليه پنهنجين ٽولين سان هڪ وڏو دائرو ٺاهيندا آهن ۽ ٻجن کي ان دائري جي وچ ۾ رکندا آهن. ٻچاءَ لاءِ ڪي جانور پنهنجا سڱ استعمال ڪندا آهن. سيڙھ پنهنجي پٺيءَ جا ڪنڊا اُٻا ڪري پاڻ کي بچائيندي آهي. ڪيئي مماليه پنهنجي رنگين ۽ يا نقشدار گل سبب ڪيموفلاج ذريعي پاڻ کي حملو ڪندڙن جي نظرن کان لڪائڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندا آهن.

کير پياريندڙ جانور وڏي تعداد ۾ خشڪ زمين تي رهندا آهن پر انهن جا ڪجهه قسم پاڻيءَ ۾ به رهندا آهن. انهن جو جسم پُڇ واري پاسي سنهو ۽ ڦنگدار هوندو آهي. انهن جانورن جا ابا ڏاڏا لکها سال اڳ زمين تي رهندا هئا، پر هوريان هوريان انهن جي پيرن ۾ تبديلي اچڻ لڳي ۽ اهي مڇين جي

ڦٽنگن جهڙا ٿي ويا. هاڻي انهن کي پاڻيءَ ۾ رهڻ وڌيڪ راس اچي ويو آهي. وهيل مڇ ، ويسر ويلڙو ، ڊالڦن، مالهار، ٽاڀي، بحري ڳئون ۽ سيل وغيره ان قسم جي آبي ممالين جا ڪجهه قسم آهن. سنڌ ۾ ڊالڦن جو هڪ قسم انڌي ڊالڦن آهي، جنهن کي اسان ٻلهڻ چوندا آهيون. اها سنڌو درياھ جي لڙو پاڻيءَ ۾ وڏي عرصي کان رهي ٿي. انڪري اکين کان ڪم نه ٿي وٺي سگهي. اها ميري پاڻيءَ ۾ پنهنجو رستو آوازي لهرن سان ٺاهي ۽ ڳولي سگهي ٿي. ڊالڦن جو هي نسل نابود ٿيڻ جي خطري ۾ آهي.

جيتن جي دنيا:

کيرٿر جي حياتياتي چڪر جو هڪ تمام اهم حصو جيتن تي مشتمل آهي. ان تي لڳ ڀڳ سمورن ڪرڙانگن ۽ ننڍن پکين جو گذارو آهي. ڪي ڪي مماليه به جيت خور ٿين ٿا. دنيا ۾ ڪروڙا نندڙا جاندار آهن، پر اهي سڀ جيت نه آهن. دنيا ۾ جيتن جا 8 لکن کان مٿي قسم آهن. جيتن جون ڪي خاص صفون هونديون آهن.

جيتن (insects) جو تعلق جاندارن جي هڪ وڏي گروه سان آهي، جنهن کي غير ڪرنگهيدار چئبو آهي. غير ڪرنگهيدار جاندارن کي پٺيءَ جو ڪنڊو (ڪرنگهه) يا جسم ۾ هڏائون پڇرو نه هوندو آهي. ان جي بدران انهن کي جسم جو ٻاهريون کوپو ٿئي ٿو، جنهن کي ٻاهريون ڍانچو چئبو آهي. جيت ۽ اهو کوپو هڪ سخت مادي chitin جو ٺهيل هوندو آهي. سڀني بالغ جيتن (insects) کي چنگهن جون ٽي جوڙيون (چھ تنگون) هونديون آهن. جيڪي جسم جي وچين حصي سان ڳنڍيل هونديون آهن. جسم ٽن حصن تي مشتمل هوندو آهي، جنهن ۾ مٿو، وچون حصو (thorax) ۽ پويون حصو يعني ڍيري (abdomen) چئجي ٿو.

جيتن کي ٻه جڙا يا اينٽينا هوندا آهن. اڪثر جيتن کي زندگيءَ جي ڪنهن مرحلي ۾ پڙ نڪرندا آهن. ڪورپٽا، جونءَ ۽ وچون به غير ڪرنگهيدار آهن، پر اهي عام سانسِي اصطلاح ۾ جيت (insect) نه آهن.

انهن سڀني کي اٺ تنگيون آهن، ڇهه نه. صدفِي جانورن (slugs) ۽ ڪوڏن کي ته تنگيون ٿينديون ئي ڪونه آهن. کيرٿر ڪاڇي ۽ ميداني آبي علائقن ۾ جيتن جا بيشمار قسم رهن ٿا. مکيون، ڳاڙها تڏا، ماکوڙا، اڏوهي، تندڻ، ماکيءَ جون مکيون ۽ ڪارڙا (fleas) جيت آهن. جاندارن جا ڪوڙ قسم آهن، تنهنڪري ان ۾ حيرت جهڙي ڪابه ڳالهه نه آهي ته اهي مختلف طريقن سان واڌ ويجهه ڪن ٿا ۽ انهن جون عادتون به مختلف ٿين ٿيون. سڀني بالغ جيتن جو جسم مٿي، ٿاريڪس ۽ ڍڍريءَ تي مشتمل هوندو آهي.

بالغ جيت وڌيڪ وڏا نه ٿيندا آهن. انهن جو ٻاهريون ڪوپو سندن اندروني حصن کي وڏو ٿيڻ کان روڪي ٿو. ٻاهريون ڍانچو سندن سڄي بت کي ڍڪي ٿو ان ڪري ڪوپو حصو وڏو ٿي نٿو سگهي. جيتن جا ٻچا بالغ جيتن کان بلڪل مختلف هوندا آهن. اهي مختلف طريقن سان وڏا ٿيندا آهن. جيت ٻن گروهن ۾ ورهايل آهن، ان جو مدار ان ٻچي جي نموني تي آهي، جيڪو اهي پيدا ڪن ٿا.

پهرئين گروهه ۾ ڳاڙها تڏا، مڪڙ، اڏوهيون ۽ تندڻ شامل آهن. اهي آني مان ڦٽي وڏا ٿين ٿا. ٻچا ڪيٽ (nymphs) سڏبا آهن. اهي ڪيٽ وڏا ٿي روپ بدلائي بالغ ٿين ٿا. ٻئي گروهه ۾ ڏينپس، ماکوڙا، ماکيءَ جون مکيون، مکيون، پويت، پروانا، تندڻ ۽ ڪارڙا شامل آهن. بيضن مان لاروا ڦٽي ٿو ڪينٿان ۽ سوٽ ٿين ٿا. لاروا ڪيئي ڀيرا وڌي ۽ ڪوپو بدلائين ٿا ۽ پيپو پيدا ٿئي ٿو. پيپو کي پَر ڦٽندا آهن.

جيت پنهنجي جسم ۾ موجود لاڳيتن سنهڙن سوراخن وسيلي ساهه کڻندا آهن. هوا انهن سوراخن مان لنگهي اندروني نلڪين ۾ داخل ٿئي ٿي. هوا مان آڪسيجن جذب ٿي رت ۾ حل ٿي، جسم ۾ پهچي ٿي. جيتن کي ڪاٺڻ، آنا ڏيڻ ۽ اڏامڻ جي طاقت وٺڻ لاءِ خوراڪ به گهرجي. جيت مختلف قسم جي خوراڪ کائين ٿا. ڪي جيت ٻوٽا کائين ٿا ۽ ٻيا ٻين جيتن کي کائين ٿا. جيتن جو وات انهن کي مرضيءَ جي خوراڪ کائڻ ۾ مدد ڏئي ٿو. ڪجهه جيتن جون ڏانئون چيندڙ سڀن جهڙيون يا اسفنج وانگر هونديون آهن،

جيڪي خوراڪ کي جذب ڪري. ونديون آهن يا وري ڪي ڊگهين ۽ چوسيندڙ نلڪين جهڙيون هونديون آهن. گاهه خور جيتن، مثال طور ڪيئنن، تنبڻن ۽ اڏوهيءَ کي پڻ، بچ ۽ ڪاڪ چٻاڙڻ لاءِ مضبوط زنبور هوندا آهن. ڪي جيت تمام سخت ڪاڪ چٻاڙي سگهندا آهن.

شڪاري جيت مثال طور 'بيبيءَ جو گهوڙو' پنيپوريون ۽ ٻين جيتن کي کائيندو آهي. اهي پنهنجي اڳين تنگن سان شڪار جهلي پنهنجين مضبوط ڏانن سان چٻاڙيندا آهن. پويت هڪ ڊگهي نلڪيءَ يا سونڊ جي ذريعي گلن جو رس چوسيندو آهي ۽ مچر سئيءَ جهڙي ڊگهي نلڪي چمڙي ۾ داخل ڪري رت چوسي وندو آهي.

جيت به سڀني جاندارن وانگر خوراڪ جي تلاش، آکيرو ٺاهڻ ۽ زندگيءَ جو شريڪ ڳولڻ لاءِ متحرڪ رهندا آهن. اهي مختلف طريقن سان حرڪت ڪندا آهن، انهن کي پرن جون هڪ يا ٻه جوڙيون جسم جي وچين ڀاڱي (thorax) سان ڳنڍيل هونديون آهن. جن جيتن کي پرن جي هڪ جوڙي هوندي آهي، انهن ۾ مڪيون، ڳاڙها تڏا، پونٿرا ۽ چٽڪرا ڳاڙها تنبڻ شامل آهن. ڪجهه جيتن کي پرن جي هڪ جوڙي انهن جي اڏامڻ لاءِ هوندي آهي ۽ اهي پَر جسم لاءِ حفاظتي خول جو ڪم به ڪندا آهن. ڪجهه جيتن کي اڏامڻ لاءِ پرن جون ٻه جوڙيون هونديون آهن. انهن ۾ پويت، پروانا، ڪنپڙيون (Mayflies) ۽ پنيپوريون شامل آهن. ڪي پنيپوريون 100 ڪلوميٽر في ڪلاڪ جي رفتار سان اڏامي سگهن ٿيون.

ڪارڙن، تڏن ۽ مڪڙن جون پويون تنگيون ڊگهيون ۽ مضبوط ٿين ٿيون. اهي انهن تنگن سان اسپرنگ وانگر ٽپو ڏيئي وڏي فاصلي تائين پهچي سگهندا آهن. ڪارڙو 30 سينٽي ميٽرن کان وڏو ٽپو ڏئي سگهي ٿو. ڳاڙهو تڏو پنهنجين تنگن کي تيزيءَ سان ڊوڙڻ لاءِ استعمال ڪندو آهي. پونٿرو پنهنجين تنگن جي مدد سان پاڻيءَ تي ڊوڙي سگهي ٿو. ڪي جيت پنهنجون تنگيون پاڻيءَ ۾ ترڻ لاءِ ڪم آڻيندا آهن. تڏا پنهنجي پرن کي حرڪت ڏيئي تمام زور سان آواز ڪيندا آهن. تڏ دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ آواز ڪندڙ جيت آهي.

جيئن عام انسان دنيا کي پنهنجين اکين، ڪنن، زبان، نڪ ۽ ڄمڙيءَ ذريعي ڇهي سان محسوس ڪندا آهن، جيتن وٽ محسوس ڪرڻ لاءِ اهي سڀ عضوا نه هوندا آهن. انهن وٽ حسي عضون ۾ اينٽينا ۽ مرڪب اکين جي هڪ هڪ جوڙي ٿئي ٿي. ڪافي جيتن کي جسر تي وار يا تنگن تي ڪنڊا ٿيندا آهن. انهن مان ڪي وار جيتن کي احساس، ڏاڙهي ۽ بوءِ وٺڻ ۾ مدد ڪندا آهن. اڏامندڙ جيتن جي پيشانيءَ جي سنهڙا وار ٿيندا آهن جن مان انهن جي رفتار معلوم ڪري سگهجي ٿي. اهي وار هوا ۾ پوئتي مڙي ويندا آهن. جيتن ۾ ڏاڙهو وٺڻ جي صلاحيت انهن جي پيرن تي موجود وارن ۾ هوندي آهي. مثال طور مک ڪنهن شئي (مناڻ وغيره) جو ڏاڙهو پنهنجي پيرن سان چڪيندي آهي. اينٽينا يا جسا جيت جي مٿي تي لڳل هوندا آهن، انهن جون مختلف شڪليون ۽ ماپون ٿين ٿيون. اينٽينا تي لڳل ننڍڙا وار بوءِ وٺڻ جي ڪم اچن ٿا.

ننڍڙي جيت (لاروا) کي اکين جون ڏهن تائين جوڙيون ٿي سگهن ٿيون. انهن سان جيتن کي فقط ايتري خبر پوي ٿي ته هن وقت ڏينهن آهي يا رات. اڪثر بالغ جيتن جون اکيون مرڪب ٿينديون آهن. اهي ڪوڙ سارن ننڍڙن عددن تي مشتمل ٿين ٿيون. جيت پنهنجي چؤطرف ڏسي سگهي ٿي پر انهن جون اکيون حرڪت ڪري نه سگهنديون آهن، ان ڪري انهن کي حملي جي خبر نه پوندي آهي.

اڪثر جيت خوراڪ واري چڪر ۾ سڀ کان هيٺين جاءِ تي آهن. اڪثر جانور جيت کائيندا آهن. وڏا جانور، ننڍا جانور، ڪرڙاڻگ (reptiles)، پکي، جلقليا (amphibians) ۽ ڪي جيت به جيت خوري ڪندا آهن. جيت بيشمار آنا ڏيندا آهن. جيڪڏهن حالتون بلڪل ٺيڪ هجن ته پوءِ هڪ اڪيلو مهلو (aphid) هڪ سال ۾ اربها مهلا پيدا ڪري سگهي ٿو. عام مک به هزار آنا ڏيئي سگهي ٿي. جيڪڏهن اهي سڀ آنا ڦٽن ۽ ٻجا بالغ ٿين ته سڄي دنيا مڪمل طور جيتن سان ڀرجي وڃي! پر ايئن ڪڏهن به ڪونه ٿيندو. ڇو ته اڪثر آنا تباهه ٿي يا کاڄي ويندا آهن. جڏهن آنا ڦٽن ٿا ۽ لاروا ٿين ٿا تڏهن

اڪثر ڪري مناسب خوراڪ موجود نه هوندي آهي، انڪري لارو مري ويندا آهن. بالغ جيب به يقيناً ڪاڇي ويندا آهن يا جيت مار دوائن سان ختم ٿي ويندا آهن. ان ريت انهن جو تعداد ضابطي ۾ رهي ٿو.

پنهنجي زندگي بجائڻ لاءِ جيت ماحول ۾ لڪڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. ڪافي جيتن کي مختلف دڙائين جا رنگ هوندا آهن جنهنڪري اهي زمين تي مٿل پٺن، ساون پٺن ۽ چوڏن تي لڪي سگهن ٿا. ڪجهه جيتن جون شڪليون پٺن، ڪاٺڙين ۽ تيلين جهڙيون هونديون آهن، جن سان اهي پٺن يا سنهين تارين تي لڪي سگهن ٿا. ڪجهه جيتن کي شوخ رنگ ۽ چٽ هوندا آهن، جن سان اهي ٻي مخلوق کي خطرناڪ لڳندا آهن. ڪي جيت زهريلا هوندا آهن.

جيت هر قسم جي باين تي آنا ڏيندا آهن. اهي گهڻو ڪري کليل جاءِ، پٺن ۽ ٿڙن تي آنا ڏيندا آهن. ڪافي جيت خاص گهر ناهي انهن ۾ آنا ڏيندا آهن. اڏوهيون مٽيءَ جا دڙا ناهينديون آهن. ان دڙي اندر کوڙ ڪمرا ۽ سرنگهون هونديون آهن. اڏوهيون ڪاٺ ۽ ڦنگي ڪاٺ پسند ڪنديون آهن. اهي نون ٻوٽن يا گريل سڙيل ڪاٺ ۾ سرنگهون ناهينديون ۽ ڪاٺ ڪائينديون آهن. ڪي ماکوڙا پنهنجو ٻر زمين ۾ اندر ناهيندا ۽ انهن کي سرنگهن ذريعي هڪٻئي سان ڳنڍيندا آهن. تاندوري ماکوڙو لارو مان پيدا ٿيل چنڊندڙ ڏاڳي نما مادي سان پٺن کي ويڙهي وڪوڙي ڇڏيندو آهي.

ماڪيءَ جي مک، ڏينهن ۽ ڪوڙو جا ڪيئي قسم آهن. انهن مان ڪي گروهه پسند جيت آهن. اهي ڪالونيون ناهي گذ رهندا آهن. ماڪيءَ جون مکيون مانارا ناهي انهن ۾ آنا لاهينديون آهن. ماناري ۾ سوين جدا جدا ڪوٺڙيون هونديون آهن. راڻي انهن ڪوٺڙين ۾ آنا ڏيندي آهي. اهي مکيون ڪن خانن ۾ ماڪي جمع ڪنديون آهن. گهريٽڙيون مٽيءَ مان ننڍڙا گهر ناهيندا آهن، انهن ۾ به آنا ڏيڻ لاءِ ڪوٺڙيون هونديون آهن.

ڪافي جيت ٻين جيتن کي ڪائيندا آهن. ڪي تمام هوشيار ۽ چالاڪيءَ ۽ مهارت سان شڪار ڪندا آهن. وڏو ڳاڙهو ماکوڙو، ٻين ماکوڙن

کي کائيندو آهي. ان وڏي ماڪوڙي جو لارو وارياسي زمين ۾ کڏ ڪوتي ان جي تري ۾ ٻر ڪوتي اتي وات ڦاڙي انتظار ۾ ويهي رهندو آهي. جڏهن ڪر جيت ان کي ويجهو ايندو آهي، تڏهن اهو پنهنجي وات سان ان کي پڪڙي وٺندو آهي. ان ريت جيت جي بچڻ جو ڪوبه امڪان نه رهندو آهي.

ڪافي جيتن کي زهريلو ڏنگ هوندو آهي. ان ڏنگ سان اهي ٻئي جيت کي بيهوش ڪري ڇڏيندا آهن. مثال طور مادي شڪاري ڏينيو ڪنهن ڪينٺين کي پنهنجي ڏنگ سان بيهوش ڪري، پوءِ ان شڪار کي پنهنجي ماناري ۾ کڻي ويندي آهي ۽ ان تي آنا ڏيندي آهي. جڏهن اُن مان لارو ڦٽندو آهي، تڏهن لارو ان ڪينٺين تي پلجندا آهن. ماڪوڙين جا ڪافي قسم آهن. اڪثر ماڪوڙين جي ڄاڙي ڊگهي ۽ تيز هوندي آهي. اهي شڪاري آهن ۽ نرم جيت کائينديون آهن. ڪي ماڪوڙيون ٻوٽا کائينديون آهن. 'ڪاٺ ماڪوڙيون' شڪاري هونديون آهن. اهي هزارين جيت پنهنجي آڪيزي ۾ گڏ ڪنديون آهن. ماڪوڙيون پنهنجي وزن کان وڌيڪ وزني شيون کڻي سگهنديون آهن.

خوراڪي چڪر کي غور سان ڏسبو ته هڪ خاص قسم جو تسلسل نظر ايندو. مختلف جيتن جي خوراڪ مختلف ٿئي ٿي. ڪي جيت فقط ٻوٽا کائيندا آهن. ڪي شڪاري آهن ۽ ٻين جيتن تي پلجندا آهن. خود جيت، مختلف جانورن جي خوراڪ جو اهم ذريعو آهن. جانورن سميت اڪثر جيت، جيت خور آهن. ٻوٽا سڄ جي توانائيءَ ذريعي پاڻ خوراڪ ٺاهيندا آهن. ٻوٽا خوراڪ پيدا ڪندڙ آهن. گاهه خور جانور ٻوٽا کائيندا آهن. اهي واپرائيندڙ آهن. گوشت خور جاندار گاهه خور جانورن کي کائيندا آهن. انهن کي ثانوي واپرائيندڙ چئبو آهي. سو سڀ جانور خوراڪ جو هڪ وڏو تسلسل ٺاهين ٿا.

ڪنهن به خوراڪي تسلسل ۾ جانورن جو پاڻ ۾ تعلق (link) جڙي ٿو. ڪنهن خوراڪي تسلسل ۾ گهڻا تعلق هوندا آهن ته ڪنهن ۾ ٿورا. مثال طور ڪا صحرائي ڪرڙي جيت پڪڙيندي آهي. صحرائي ڪرڙي ۽ اهو جيت خوراڪ جي تسلسل ۾ ڳنڍيل آهن. جيت گلن جي رس تي پلجي ٿو ان ريت

اها هڪ ٻي ڪڙي بڻجي ٿي. صحرائي ڪڙيءَ کي ڪو ٻيو جانور کائي سگهي ٿو، ان ريت هيءَ هڪ ٽين ڪڙي ٿئي ٿي. خوراڪ جي تسلسل ۾ ڇهه ڪڙيون آهن. جيڪي هن ريت ٿي سگهن ٿيون: پن، ڪينئون، تنبڻ، ڪوٺ، نانگ ۽ عقاب.

جيتن جي ساهه واري سرشتي جي اڀياس مان پتو پيو آهي ته انهن جي ارتقا خشڪيءَ تي ٿي آهي. کيرٿر جي دامن واري آبي ماحول ۾ به جيتن جا ڪوڙ سارا قسم موجود آهن. يعني، ڪافي جيتن پاڻيءَ ۾ زندگي گذارڻ جو طريقو اختيار ڪيو آهي. انهن پاڻيءَ مان ساهه کڻڻ جا طريقا به ٺاهي ورتا آهن. ڪن جيتن کي ساهه کڻڻ لاءِ مٿي سطح تي اچڻو پوندو آهي ته وري ڪي جيت ٻنهي ڀرڻ جي هيٺيان هوا گڏ ڪري رکندا آهن.

ڪي جيت، مثال طور مڇر، ڀنڀوري، ڪنڀڙي ۽ پاڻيءَ جا تنبڻ وغيره پنهنجي زندگيءَ جو ابتدائي مرحلو پاڻيءَ ۾ گذارين ٿا. ٻيا جيت جهڙوڪ 'ملاح'، 'پاڻيءَ ڪڇڻا' ۽ پونٿرا پنهنجي سڄي عمر پاڻيءَ ۾ گذاريندا آهن. مادي ڀنڀوري پنهنجا آنا پاڻيءَ جي چنبڙندڙ ٻوٽن تي لاهيندي آهي. آنا ڦٽڻ کان پوءِ ڪيٽ به ٽي سال پاڻيءَ ۾ رهندا آهن ۽ ڏيڏرن جي پتڪڙن ٻچن سميت تمام ننڍڙي مڇيءَ تي گذارو ڪن ٿا. جڏهن اهي وڏا ٿين ٿي پاڻيءَ کان ٻاهر ايندا آهن تڏهن پنهنجي ڪل لاهي ڀردار بالغ ڀنڀوري طور ڏسڻ ۾ ايندا آهن.

سنڌ جي ڍنڍن ۽ ڍورن ۾ پونٿرا پاڻي جي سطح تي تمام تڪو هلي سگهن ٿا. پاڻيءَ ڪڇڻ (Water measurers) جيتن جون تنگيون وڏيون هونديون آهن ۽ اهي پاڻيءَ تي هوريان پنڌ ڪري سگهندا آهن. ڪافي جيت پنهنجا پير چٻوڙ يا پيڊل طور استعمال ڪندا آهن ۽ پاڻيءَ جي سطح کان هيٺ اندر ٿي اندر تري سگهندا آهن.

جيت هونئن ئي وڏي ڪمر جو جاندار آهي. جيت مختلف طريقن سان اسان جي مدد ڪندا آهن. اهي مختلف پکين ۽ جانورن لاءِ خوراڪ جو ذريعو آهن. اسان انهن پکين ۽ جانورن کي کائيندا آهيون، انڪري اڻ سڌيءَ طرح

جيت اسان کي خوراڪ مهيا ڪن ٿا. ڪن ملڪن ۾ ته جيت مثال طور ڪينٿان، سوٽ، اڏهيون، ساڻو مڪڙو ۽ مڪڙ خوراڪ طور استعمال ٿيندا آهن. ماکيءَ جي مک ماکي ٺاهي ٿي. ماڻهو جبل جي ماکي ڏاڍي شوق سان کائيندا آهن جو اها جابلو گلن ٻوٽن جي عرق مان ٺهيل هوندي آهي. تندن، پوٽ، ماکيءَ جون مکيون ۽ مکيون گل جو ٻوٽو ڪٽي ٻئي گل تائين پهچائين ٿيون. ان طرح ٻوٽن جو لڳ ٿئي ٿو ۽ ٻوٽا گل ميوو جهلين ٿا ۽ بچ پيدا ڪن ٿا. ان ڪم جي موت ۾ گل جيتن جي کائڻ لاءِ رس پيدا ڪري ٿو.

پکي:

پکي ڪنڀن وارا ڪرنگهيدار جاندار آهن. سڀني پکين کي ٻه پير ۽ ٻرن جو هڪ جوڙو ٿيندو آهي. پکي اڪيلي مخلوق آهي جنهن جي جسم تي ڪنڀ هوندا آهن، جيئن نانگ کل مٽائيندو آهي تيئن پکين جا ڪنڀ به بدلاجندا آهن. اهو سلسلو هر سال يا مند آخر هلندو آهي ڪنڀ تن قسمن جا هوندا آهن. انهن جو ڪم ٻٽ ڍڪڻ آهي، جسم جا هيٺيان ڪنڀ نرم ۽ بچدار هوندا آهن ۽ پکيءَ کي گرم رکندا آهن. ڪنڀڙائين جا ڪنڀ اڏامڻ ۽ رخ بدلائڻ ۾ مددگار هوندا آهن.

پکيءَ جي بناوت ڪجهه اهڙي ٿئي ٿي جو ان کي لس اڏامڻ ۾ سهوليت ملندي آهي، پکيءَ جي ڪنڀڙائين ۽ ڇاتيءَ جون مشڪون تمام مضبوط هونديون آهن ڇاڪاڻ ته انهن کي ڀر ڦڙڪائڻ ۽ هوا ۾ اڏامڻ لاءِ مضبوط مشڪن جي ضرورت هوندي آهي. پکي پنهنجي قد بت جيترن ٻين جانورن جي پيٽ ۾ تمام هلڪا ٿيندا آهن ڇو ته انهن جون هڏيون ڪوڪليون هونديون آهن.

پکيءَ به گرم رت وارو جاندار آهي. ان ڪري ان جي جسم ۾ گرميءَ جو درجو ٿڌي توڻي گرم مند ۾ ساڳيو رهندو آهي. سنڌ ۾ سڀ کان وڏا پکي ٻيٽ ڪونجون ۽ گجهون آهن. سنڌ ۾ پکين جا کوڙ قسم ٿين ٿا، جيڪي ڇهن مختلف ماحولن ۾ رهن ٿا. اڳي، سنڌ ۾ ٻن قسمن جون ڪونجون

اينديون هيون، انهن مان هڪ سارس ڪونج ماڻهوءَ جيڏي ڊگهي ٿئي ٿي. اهي سياري جا لاڏوڻي پڪي آهن. سارس هاڻي سنڌ جو رخ نه ٿي ڪري.. باقي عام ڪونجون سنڌ جي ڏکڻ ڏانهن هليون وينديون آهن. ڪي ٻيا ڊگها آبي پڪي جهڙوڪ سانھ، ٿور ۽ لاکو ڇاڇي سنڌ جي ڍنڍن تي لهندا آهن. هِمالياڻي گجھه به ماڻهوءَ جيڏي ڊگهي هوندي آهي. ان جي پرن جي پکيڙ ٽون فٽن کان مٿي ٿي سگهي ٿي. اها گجھه سنڌ ۾ به ٿئي ٿي، ان جي پٺيءَ تي اڇو چٽو ٿيندو آهي.

کيرٿر، ڪاڇي ۽ ميداني علائقن ۾ ننڍن ننڍن پکين جا بيشمار قسم رهن ٿا، انهن ۾ ڪي لاڏوڻي ته ڪي مقامي آهن. سنڌ ۾ دنيا جو سڀ کان ننڍڙو پڪي 'ميٽريا تيل وهيڙو' به رهي ٿو. اهو انسان جي آڱوٺي جيترو ٿئي ٿو ۽ گلن جو عرق پيئندو آهي. سنڌ ۾ سڀ کان عام پڪي جهرڪيون، ڦوسڙيون، ڪانءِ، ڪبوتر، ڳيرا ۽ طوطا وغيره آهن. پاڻيءَ جا عام پڪي بدڪون، ٽوبا، پگھ ۽ ٽيٽا آهن. اڪثر پڪي تن کان اٺ سال زندهه رهندا آهن. ڪيناڙي جي عمر تيهه سال ٿي سگهي ٿو. ابا بيل دنيا ۾ سڀ کان تيز رفتار پکين ۾ شامل ٿئي ٿو. سنڌ ۾ ابا بيلن جا گھٽ ۾ گھٽ ٻه قسم آهن.

جڏهن پڪي اڏامڻ چاهيندا آهن، تڏهن اهي هوا ۾ گھٽ هڻي پوري طاقت سان پر ڦڙڪائيندا آهن. گجھون وغيره ايتريون وڙني هونديون آهن جو انهن کي اڏامڻ لاءِ پهرين زمين تي ڊوڙ ٿو ۽ زور زور سان پَر هڻڻا پوندا آهن.

پکين لاءِ اڏامڻ انڪري ضروري آهي ته جيئن اهي پنهنجا آڪيرا بلند جابن تي ٺاهي سگهن. جڏهن، چؤطرف خوراڪ گھٽجي ۽ ٿڌ شروع ٿي ويندي آهي تڏهن انهن کي خوراڪ لاءِ تمام پري گرم علائقن ڏانهن وڃڻو پوندو آهي. ڪي پڪي مثل طور ٽڪ يا ملهالا اڏامي خوراڪ جهٽيندا آهن، ڪي اڏامي اڏامي زمين تي خوراڪ گوليندا آهن. ڪن پکين کي خشڪيءَ تي رهندڙ دشمن کان بچڻ لاءِ هوا ۾ اڏامڻ پوندو آهي.

پکي اکيرا ٺاهڻ ۽ آنا ڏيڻ لاءِ وري زمين تي لهندا آهن. ڇاڪاڻ ته زمين تي ان ۽ پاڻي آهي. اهي پنهنجن چوڙن کي غزا ڪرائيندا آهن، آڻن تي آرو ڪندا آهن، پنهنجي نوع جي پکين سان ملندا، لڳ ۽ آرام ڪندا آهن. پکي زمين تي لهڻ مهل پهرين پير رکند آهي ۽ پنهنجا پير ۽ پُڇ پُراشوت وانگر پکيڙي پنهنجي رفتار گهٽائي ڇڏيندو آهي.

ڪي پکي مثال طور عقاب وغيره پنهنجا پير پکيڙي هوا تي ترندا رهندا آهن. وڏا پکي پنهنجا پير هوريان هوريان ۽ ننڍا پکي تيز تيز ڦڙڪائيندا آهن. آسمان ۾ تمام مٿي اڏامندڙ ڪن پکين کي پير ڦڙڪائڻ جي ضرورت پوندي آهي، اهي هوا جي زور تي مٿي ٿيندا ۽ ترندا ويندا آهن.

پکين کي ڏند ڪونه ٿيندا آهن، ڏندن جي بدران انهن کي چهنڀ ٿيندي آهي. انهن چهنڀن جي شڪل يا ماپ به مختلف هوندي آهي ڇاڪاڻ ته پکي مختلف قسمن جون شيون کائيندا آهن. مثال طور ڪانءُ جي چهنڀ مضبوط ۽ نوڪيلي ٿئي ٿي ڇو ته اهي بيس پکين جي آڻن سميت لڳ ڀڳ هر شئي کائي ويندا آهن. ان ڪم لاءِ کين تيز ۽ نوڪدار چهنڀ گهرجي.

سِرڻ جيئن ته ڍونڍ خور پکي آهي انڪري اها ننڍڙا ۽ مئل جانور گولي کائيندي آهي. ان جي چهنڀ جي نوڪ تيز ۽ مڙيل هوندي آهي، جنهن کي گوشت ۾ تنبي ان کي چيري ڦاڙي ڇڏيندي آهي. عام جهرڪي پنهنجي چهنڀ سان بچ توڙيندي آهي. ان جي چهنڀ ننڍي ۽ مضبوط ٿيندي آهي. تيل وهڻو گلن جي رس تي پلجي ٿو. ان ڪري ان جي چهنڀ ڊگهي ۽ سنهي ٿيندي آهي. ڪاڪ ڪٽو پنهنجي چهنڀ کي چيٽيءَ وانگر استعمال ڪري چوڏن ۽ ڪاڪ کي کوٽيندو آهي.

اڪثر آبي پکين جي چهنڀ ڊگهي هوندي آهي. اهي مڇي خور آهن. انهن مان ڪي پکي گپ ۾ رهندڙ ننڍڙا جانور ۽ جيت کائيندا آهن. ٻيٽيهه جي چهنڀ ڊگهي ۽ سنهي هوندي آهي جنهن سان گپ ۾ شڪار پيو گوليندو آهي. لاکو ڇاڇي پنهنجي چهنڀ سان گپ ڇاٽيندو آهي. ڪانهرن جي چهنڀ ڏند دار هوندي آهي، جن سان مڇي جهليندو آهي.

پکي پنهنجي آواز سان هڪٻئي کي اشارا ڪندا ۽ خطري جو چٽاءُ ڏيندا آهن. اهي قسمن قسمن آواز ۽ ٻوليون ڪندا آهن. ڪي پکي چيخندا آهن. ڪي لاتون لئوندا آهن. ڪي هڪ ئي سُر ٻيا ورجائيندا آهن. ٻيا مليون ٻوليون ٻولي سگهندا آهن ۽ مختلف سر ڪيندا آهن. چڪچڪا منو ٻوليندا آهن. ان ريت هو هڪ ٻئي سان رابطو ڪندا آهن يا ماحول ۾ موجود خطرن يا خوشگوارِي جو اظهار ڪندا آهن، يا هڪٻئي کي سڏيندا آهن. پکي ٻين طريقن سان به هڪٻئي سان رابطو ڪندا آهن، آهر پَر ڦڙڪائي ۽ هوا ۾ مٿي اڏامي ٻين پکين کي خطري کان آگاهه ڪندا آهن.

ڪي ٿر پکي (مثال طور مور يا ڪبوتر) آواز ذريعي يا ناچ ذريعي مادين جو ڌيان ڇڪيندا آهن يا رجھائيندا آهن. ڪي پنهنجن رنگين کنيڻ جي نمائش ڪندا آهن. لڳ جي مند ۾ عام طور تي نر پکين جا کنڀ شوخ ۽ رنگين ٿي ويندا آهن. اڪثر پکي پاڻ کي پنهنجي رنگ جي مدد سان ماحول ۾ لڪائيندا آهن. جيئن طوطو پاڻ کي وڻن ۾ لڪائڻ لاءِ پنهنجي رنگ کي استعمال ڪندو آهي. تلور ته پٿريلي ماحول ۾ بلڪل گم ٿي ويندي آهي.

پکين جي چنبن ۾ اڳيان ٿي ٿي وڏيون آڱريون ۽ هڪ ننڍي آڱر پوئين پاسي هوندي آهي. پکي انهن آڱرين جي مدد سان هلندا آهن، توازن برقرار رکندا آهن، شاخن تي ويهندا آهن ۽ وري کاڌو جهليندا آهن. شڪاري پکي باز ۽ شڪرو وغيره پنهنجن تيز چنبن سان نانگ ڪوٽا ۽ ٻيا جانور پڪڙي کائيندا آهن. ڪاٺ ڪٽا پنهنجن چنبن سان وڻ جي ٿڙ تي چڙهندا آهن. ’ٻار لڳا‘ وغيره پنهنجن وڏين پيرن ۽ ننڍين آڱرين جي مدد سان تمام تيز ڊوڙندا آهن. ڪن پکين جون آڱريون ننڍڙيون هونديون آهن، جيڪي سولائيءَ سان مڙي وينديون آهن. اهڙيون آڱريون سنهڙن ٽيلن کي پڪڙي ويهڻ لاءِ تمام مناسب آهن. پيهوڙي، جهنگ ڪڪڙ ۽ ڪُهنگ جون آڱريون سنهيون ۽ ڊگهيون ٿين ٿيون، جنهنڪري اهي پکي پاڻيءَ تي ترندڙ پٺن جي مٿان پٺڏ ڪري سگهندا آهن. سنڌ ۾ بدڪن ۽ قازن جا ڪافي قسم آهن، اهي گهڻو وقت پاڻيءَ ۾ گذارين ٿيون. انڪري انهن جي پيرن جو آڱريون ڪل وانگر هڪ

بردي سان پاڻ ۾ ڳنڍيل هونديون آهن. تپڻ، ڪانهرن ۽ چيڪلن وغيره جي پيرن جون آڱريون ان ريت ڳنڍيل هونديون آهن.

پکي آکيرا ٺاهي رهندا آهن. جتي پکي آنا ڏين ٿا ۽ اُن جي ڦٽڻ کانپوءِ چوڙن جي سنڀال ڪن ٿا. آکيرو چوڙن ۽ ننڍڙن پکين جي حفاظت ڪري ٿو ۽ انهن کي گرم رکي ٿو. مختلف پکي مختلف قسم جا آکيرا ٺاهيندا آهن. ڪي آکيرا ٿورڙن ڪلاڪن ۾ ٺهي ويندا آهن، ڪي ڏينهن ۽ هفتن ۾ تيار ٿيندا آهن. ڪي سادا ۽ ڪانڌين جا ٺهيل هوندا آهن، ڪي آکيرا ته تمام احتياط ۽ مهارت سان تيار ڪيل هوندا آهن. اهي عام طور تي نرم گاه سان ٺاهيل هوندا آهن. اڪثر پکين جا آکيرا وڻن تي ٿين ٿا، ڪي زمين تي به ٺاهيندا آهن. هُدهُد، ڪنگر ۽ توبا پنهنجا آکيرا پاڻيءَ جي ويجهو زمين جي ڪنڌين ۾ ٺاهيندا آهن. پتيرا ۽ جهنگ ڪڪڙ زمين تي هلڪيون کڏون گُڙي آکيرا ٺاهينديون آهن. بهر پکي پنهنجو آکيرو باقاعدي اُٿيندو آهي، ان ڪري مٿس اهو نالو پيو آهي 'درزي پکي'. ڪاٺ ڪٽا پُراڻن وڻن ۾ نونگن سان سوراخ ڪري آکيرو جوڙيندا آهن. بان سِرڻيون، ڪانءُ، گيرا ۽ ٻيا وڏا پکي ڪانڌين، گاه ۽ ڪنين سان پنهنجي لاءِ آکيرا جوڙيندا آهن. درزي پکي پنهنجي لاءِ ڊگها آکيرا سبندا آهن. تڪ پکي پيالي نما آکيرا ٺاهيندا آهن ۽ اباڻيل مٽي استعمال ڪندا آهن. ڪي پکي تمام سست، چالاڪ ۽ ٺڳ ٿيندا آهن. ڪوئل ۽ ڪي ٻيا پکي پنهنجا آکيرا نه ٺاهيندا آهن، اهي پنهنجا آنا ٻين پکين جي آکيرن ۾ لاهي ويندا آهن.

لڳ کان پوءِ پکي آکيرو جوڙڻ شروع ڪندا آهن. ڪڏهن سڄو ڪم مادي ڪندي آهي، ڪڏهن جوڙو گڏجي آکيرو ٺاهيندو آهي. جڏهن آکيرو تيار ٿي ويندو آهي، تڏهن مادي آنا ڏيندي آهي. اڪثر پکي هڪ وقت ۾ ٻه يا ٽي آنا ڏيندا آهن. مادي پنهنجي بيت ۾ گهڻو وقت آڻو جهلي نه سگهندي آهي، انڪري اڪثر پکين کي پنهنجا آنا گرم رکڻ لاءِ آکيري ۾ انهن تي ويهڻو يا آرو ڪرڻو پوندو آهي. ان دوران ٻچا اُن ۾ تيار ٿيندا رهندا آهن.

ڪُهنڱ پکي ۽ بدڪون هڪ ئي وقت ڏهه ٻارنهن آنا ڏينديون آهن. آنا ڦٽڻ وقت اڪثر چوڙا بي ڪنڀ هوندا آهن ۽ ڏسي به نه سگهندا آهن. ماءُ بيءُ انهن کي ڪارائيندا ۽ اڏامڻ سيکاريندا آهن. وڻن ۾ آکيرا ٺاهيندڙ پکي عام طور تي اڇي رنگ جا آنا ڏيندا آهن ڇو ته آکيرا گهڻو مٽي هوندا آهن، ڪنهن شڪاريءَ جو انهن تائين پهچڻ ڏکيو هوندو آهي ۽ بيضن کي گهڻي حفاظت جي ضرورت نه هوندي آهي. زمين تي ڏنل آنا عام طور تي رنگين يا چٽن وارا هوندا آهن، اهڙي طرح آنا نظرن کان لڪي ويندا آهن. سنڌو نديءَ جي ڪناري آکيرا ٺاهيندڙ پکين کي اهو ڌيان ۾ رکڻو پوندو آهي ته انهن جا آنا پاڻي چڙهڻ جي مند کان اڳ ڦٽي پون.

دنيا جي گهڻن ئي گرم ملڪن وانگر سنڌ به لاڏوڻي پکين لاءِ سياري جو گهر آهي. هتي پکي هر سال هجرت ڪندا آهن. دنيا جي ڪن حصن ۾ سياري دوران مند تمام ٿڌي ٿي ويندي آهي ۽ خوراڪ گهٽجي ويندي آهي. اهڙن علائقن ۾ رهندڙ سڀ پکي اڏامي ويندا آهن. اهي گرم ۽ گهڻي خوراڪ وارن علائقن ڏانهن لڏيندا آهن ۽ ڪجهه مهينن کان پوءِ واپس موٽي ويندا آهن. اڪثر لاڏوڻي پکي تمام پري تائين اڏامي سگهندا آهن، انڪري اهي هر سال هجرت ڪندا آهن. يعني انهن جا ٻه وطن ٿين ٿا. پهريون گهر اهو آهي جتي اهي آنا ڏين ۽ آکيرا ٺاهين ٿا، ٻيو گهر اهو اٿن جتي آرام ڪن ٿا ۽ سولائيءَ سان خوراڪ ملندي اٿن. ڪي پکي ٿورو پنڌ پري تائين هجرت ڪندا آهن. اهي ميدانن کان جبلن ڏانهن ويندا آهن. سائنسدان اڃا تائين حيران آهن ته ڊگهي پرواز ڪندڙ پکي رستو پٽڪڻ کانسواءِ ڪهڙي طرح پنهنجي منزل تائين پهچي ويندو آهي. پکي گهڻو ڪري اتر کان ڏکڻ ۽ ڏکڻ کان اتر هجرت ڪندا آهن.

کيرٿر ۾ هر قسم جو پکي آهي. اناج خور کان وٺي گوشت خور ۽ ڍونڍ خور. ڪي پکي ميوو، پير، پڇ، ڦريون ۽ ٻوٽن جا ٻيا حصا کائيندا آهن يا گلن جو رس چوسيندا آهن. ڪي پکي جيت خور آهن پر کوڙ سارا شڪاري پکي ڪوئا نانگ، ڏيڏر ۽ ڪڙين جهڙا ننڍڙا جانور پڪڙي کائيندا آهن. انهن

جون چنهنبون تڪيون ۽ نظر تمام تيز هوندي آهي. چبرا، باز، شڪرا، عقاب پنهنجن پنهنجن مقرر وقتن ۽ جاين تي شڪار جي تاڙ ۾ هوندا آهن. سڀ کان گهڻو شڪار ڪوئن جو ٿئي ٿو. ڪوئا تمام جلد يعني هر ساڍن تن مهينن ۾ ٻچا ڪندا آهن. اهي ٻچا تمام جلد جوان ٿي ويندا آهن ۽ پاڻ به ٻچا چڻڻ لڳندا آهن. نتيجي ۾ ڪوئن جي پيدائش جو هڪ اڻڪٽ سلسلو هلندو رهندو آهي ان ريت هڪ بالغ جوڙي مان فقط هڪ سال اندر 1000 ڪوئا پيدا ٿي سگهن ٿا. ڪوئا فصلن لاءِ سخت نقصانڪار آهن ۽ بيماريون به پکيڙي سگهن ٿا. انڪري ڪوئا خور پکي انسانن لاءِ وڏي نعمت آهن. ساڳي طرح سرٿيون، گجهون ۽ ڪانءُ ’ڏونڊ خور‘ سڏبا آهن. اهي هر قسم جو ماس کائي ويندا آهن. گجهون مُردار جانورن جو ماس ڪجهه ڪلاڪن اندر کپائي ڇڏينديون آهن جنهن سان قدرتي ماحول ۽ هوا صاف رهي ٿي.

پکي نه رڳو سهڻا سُريلا آهن، اهي فطرت جي توازن ۾ منهنجو حصو ادا ڪن ٿا. سڀ کان پهرين ته اهي خود شڪار ٿي ٻين جانورن توڙي انسانن جي زندگيءَ جو سبب ٿين ٿا. شڪاري پکي نقصانڪار ڪوئا، حيت، مڪڙ ۽ ڪينٿان کائيندا آهن. ٻجن جي ڦهلاءَ ۾ پکين جو خاص ڪردار آهي. ڪي پکي مختلف قسمن جا پير، پيرون ۽ ميوا کائيندو آهن. ان کانپوءِ اهي ٻئي پاسي اڏامي پنهنجو ڦوڳ ڇڏيندو آهي، ان ڦوڳ ۾ ثابت ٻج به شامل هوندا آهن. انهن مان ڪي ٻج ڦٽي پوندا آهن ۽ اهو ميواڌار وڻ ڪنهن بي جاءِ تي حياتياتي محور بڻجي ويندو آهي.

مڇيون:

کيرٿر جي اوڀر پاسي واقع ڪاڇي ۾ ڍنڍن جو لاڳيتو سلسلو آهي. جن ۾ ساروه کان ڪاڇڙي ۽ حمل ۽ منڇر تائين مڇين جو جدا جهان آهي. ڏکڻ طرف ڪوهستان جي جهوليءَ ۾ ڪينجهر ۽ هاليجي ڍنڍن جو هڪ جدا نظام آهي. انهن سڀني ڍنڍن ۾ ڪي تمام ننڍڙيون مڇيون جهڙوڪ پوپريون، ڌرا، ديا، ڪانڊيريون ۽ ڍنڍ وغيره ٿين ٿا، جيڪي چند سينٽي ميٽر ڊگها هوندا

آهن انهن تي وڏيون گوشت خور مڇيون ۽ پکي پلجن ٿا، ٻيون مڇيون ڏنڀرو ٿيلهي، موراڪي شاکر وغيره انسانن جي خوارڪ ٿين ٿيون. حياتيءَ جي ان قسم ۾ جيئن جوانوڪو بندوبست آهي.

مڇيءَ کي وات ۽ اکين وٽ پاسن کان ڪليون هونديون آهن، جن جي مدد سان ساهه کڻندي آهي. ان کنڀڙيون ٿينديون آهن جن جي مدد سان ترنديون يا توازن برقرار رکنديون آهن. اڪثر مڇين کي چلر ٿيندا آهن. گهڻين مڇين جا چلر متوازي قطارن ۾ هوندا آهن. انهن جي شڪل ۽ ماپ جدا جدا هوندي آهي. ڪن مڇين جا چلر لسا ۽ نرم ٿين ٿا، ڪن جا چلر وڏا ۽ هڏاوان ٿين ٿا. کڳي کي چلر ٿيندا ئي ڪونه آهن پر سخت ڪل هوندي اٿس. مڇيءَ کي ٻه ناسون به هونديون آهن پر انهن مان ساهه نه کڻندي آهي، اهي فقط سونگهڻ جي ڪم اينديون آهن. کيرٿر جي اونهن ڪنهن ۾ مڇيءَ جو هڪ قسم ’ڪرو‘ ٿئي ٿو جيڪو هيٺ ڏنڊن ۾ ڪونه اچي پر ڪڏهن ڪڏهن نئن جي تيز وهڪري ۾ ڪي داڻا لڙهي ايندا آهن. اها ڪافي وڏي ۽ ذاتيديدار مڇي ٿئي ٿي.

پکين ۽ خشڪيءَ جي جانورن وانگر مڇين کي به گهڻا رنگ ۽ چٽ ٿيندا آهن. انهن رنگا رنگين جو بنيادي مقصد ماحول ۾ لڪڻ هوندو آهي. مڇي پنهنجي جسم جي رنگن سبب ڪاميابيءَ سان لڪي سگهي ٿي. ڪن مڇين کي جسم تي پٽا، ٽپڪا ۽ ٻيا ڪوڙ نشان ٿين ٿا. شوخ رنگن واريون مڇيون ڏنڊ ۾ موجود گاهن ۾ لڪنديون آهن. گپ ۾ لڪندڙ مڇين جو رنگ به گپ جهڙو هوندو آهي.

ڪيمو فلاج سان مڇيون محفوظ رهنديون آهن. شڪاري مڇيون رنگن جي مدد سان ڇپ هڻي شڪار جي انتظار ۾ ويهي رهنديون آهن. ڪنهن جهنگلي جانور کي چڻئي ڏسان کان نظر اچڻ جو خطرو هوندو آهي، پر مڇيءَ کي پاڻيءَ ۾ هر طرف کان خطرو هوندو آهي. مڇيءَ جو مٿيون پاسو گهري رنگ جو ۽ هيٺيون پاسو هلڪي رنگ جو هوندو آهي، انڪري جڏهن ان کي مٿان کان ڏسبو ته اها پاڻيءَ جي گهري رنگ ۾ نظر نه ايندي ۽ هيٺان کان

ڏسبو ته اها آسمان سان هر رنگ ٿي ويندي آهي. جنهن مڇيءَ جا داغ گول پٿرين جهڙا هجن، اها پٿرن ۾ رهندي آهي. جن مڇين کي جسر تي پتا هجن، اهي گاهه ٻوٽن ۾ لڪنديون آهن.

مٺي پاڻيءَ جي مڇيءَ جو جسماني نظام ڪاري پاڻيءَ جي مڇيءَ کان ڪي قدر مختلف ٿئي ٿو. ان ڪري مٺي جي مڇي ڪاري پاڻيءَ ۾ رکبي ته مري ويندي. ڪاري پاڻيءَ ۾ مٺي پاڻيءَ جي ڀيٽ ۾ تمام وڌيڪ لوڻياٺ ٿئي ٿي، مڇيءَ ۾ موجود جسماني رطوبتن ۽ مڇيءَ جي جسر کان ٻاهر موجود پاڻيءَ کي فقط مڇيءَ جي ڪل ٿي جدا جدا رکي ٿي. اها ڪل هڪ قسم جو پردو آهي، جيڪا اندر ۽ ٻاهر جي واري نمڪيات مطابق هڪ خاص توازن قائم رکڻ جو وسيلو ٿئي ٿي.

جڏهن مختلف ڪشافتن واري پاڻياٺ ڪنهن پردي جي ذريعي هڪٻئي کان ڌار هجن، تڏهن اها قدرتي ڳالهه آهي ته ٻئي پاڻيانون ڪشافتن ۾ باهمي توازن پيدا ڪن. انڪري، ڪمزور پاڻياٺ پردي مان لنگهي طاقتور پاڻياٺ کي حل ڪرڻ لڳندي آهي.

مٺي پاڻيءَ جي مڇيءَ ۾ موجود پاڻياٺ ان جي جسر کان ٻاهر موجود پاڻياٺ کان وڌيڪ گهڻائي هوندي آهي، انڪري ٻاهريون پاڻي ڪل مان لنگهي مڇيءَ ۾ داخل ٿيندو آهي، اهو ئي سبب مٺي جي مڇي ڇڏي پيشاب جي ذريعي گهڻو پاڻي خارج ڪندي آهي.

ڪاري جي مڇين ۾ صورتحال ڪجهه ابتڙ هوندي آهي. ان ڪاري ماحول جو پاڻي مڇيءَ جي اندروني پاڻياٺ کان وڌيڪ ڪثيف هوندو آهي. انڪري، ڪاري جون مڇيون پنهنجي جسر مان گهڻو پاڻي خارج ڪنديون آهن ۽ ٻيو پاڻي پيئنديون رهنديون آهن. ان ريت، اهي پاڻيءَ سان گڏ جسر ۾ شامل ٿيندڙ غير ضروري لوڻياٺ ٽورڙن پر گهڻن پيشابن ذريعي خارج ڪنديون آهن. مڇيءَ ۾ ڪليون ۽ بڪيون لوڻياٺ جو توازن قائم ڪرڻ ۾ مدد ڏينديون آهن.

اڪثر مڇيون پاڻيءَ ۾ آني تيرينديون آهن. ڪاري جون مڇيون

معتدل ماحول ۾ رهڻ سبب سڄو سال نسل وڌائينديون آهن. سنڌ ۾ مٺي جون مڇيون اونھاري جي ابتدا ۾ نسل وڌائينديون آهن. صحتمند آڙي تيزڻ لاءِ مڇيءَ جو صحتمند هجڻ لازمي آهي، سٺي صحت جو تعلق سٺي خوراڪ سان آهي جيڪا گرم مند ۾ ٿئي ٿي.

ڪجهه مڇيون لکن هزارن جي مقدار ۾ آنا ڏينديون آهن. پر انهن مان ڪي ٿورا بچندا آهن. اڪثر آنيون ٻين مڇين، ڏيڏرن يا ڪنهن ٻي مخلوق جو شڪار ٿي وينديون آهن. جيڪي مڇيون ٿورا آنا ڏينديون آهن، انهن کي آڻن ۽ انهن مان قتل ننڍڙن ٻچن جي سنڀال جو فرض پورو ڪرڻو پوندو آهي. ايئن نه ڪن ته هوند سندن نسل ختم ٿي وڃي! ڪي مڇيون جيئرا ٻچا ڄڻينديون آهن. ڪن مڇين ۾، جڏهن مادي آنا ڏيندي آهي تڏهن ٿر انهن کي ٻوڪيندو آهي. ڪي مڇيون پنهنجا آنا پاڻيءَ ۾ وڪيري ڇڏينديون آهن، پر ڪي مڇيون ڪا محفوظ جاءِ ڳولي اتي آنا ڏينديون آهن. ڪن مڇين جا آنا جنٽلڙ هوندا آهن. جيڪي ٻوٽن وغيره سان چهتي پوندا آهن.

جيتوڻيڪ مڇين کي ناسون هونديون آهن، پر اهي ساهه جي نظام سان جڙيل نه آهن. مڇيون ناسن سان فقط سونگهينديون آهن. مڇيون ڪلبن وسيلي ساهه کڻنديون آهن. جيڪي انهن جي منڍيءَ وٽ پنهي پاسي اکين کان ڪجهه هيٺ هڏائين ٿالھين جي پويان ٽين ٿيون. پاڻيءَ ۾ رهڻ سبب مڇيون کليل هوا مان ساهه نه کڻنديون آهن. جيئن ته پاڻي ۾ آڪسيجن ڪافي مقدار ۾ حل ٿيل هوندي آهي، انڪري مڇي گهريل آڪسيجن پاڻيءَ مان جذب ڪندي آهي. ڪي ٿوريون مڇيون کليل هوا مان به آڪسيجن کڻي. سگهن ٿيون. انهن ۾ لوڙھ ۽ سينگارو وغيره شامل آهن.

مڇي پنهنجي وات ذريعي پاڻي کڻي ڪلبن وسيلي خارج ڪندي آهي. ڪلبن ۾ سنھا سنھا پردا هوندا آهن، جن ۾ رت جون سنھڙيون سنھڙيون نسون هونديون آهن. اها آڪسيجن پاڻيءَ مان جذب ٿي مڇيءَ جي رت ۾ شامل ٿئي ٿي. ان رت آڪسيجن مليل رت جسم ۾ گردش ڪندو آهي ۽ ساڳئي وقت رت مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ پاڻيءَ سان گڏ خارج ٿيندي رهندي آهي.

پاڻيءَ ۾ ترڻ لاءِ مڇيءَ کي خاص جسماني بناوت حاصل آهي. اها جسم جي مشڪن کي هيڏانهن هوڏانهن موڙي ترندي آهي. اڪثر مڇين جو جسم چوطرف سنهو هوندو آهي جنهن ڪري مڇي سولائي سان پاڻيءَ کي چيري اڳتي وڌي سگهندي آهي. اڪثر مڇين کي ڪل ست پڪڙيون هونديون آهن انهن مان ڇهه عدد ٻن جوڙين ۾، ۽ ٽي اڪيليون هونديون آهن. ڪن سامونڊي مڇين کي پٺيءَ تي ٻه پڪ هوندا آهن. ڪابه مڇي پچ واري ڪنڀڙيءَ کي هيڏانهن هوڏانهن حرڪت ڏيئي جسم کي اڳتي ڏڪيندي آهي. پٺيءَ ۽ پٺي جي ڪنڀڙين سان جسماني توازن قائم رهندو آهي. انهن مڇين کي پٺي واري ڪنڀڙيءَ کانسواءِ سيني وٽ ۽ پاسي کان ٻه ٻيون ڪنڀڙيون هونديون آهن، جيڪي مڇيءَ کي پاڻيءَ ۾ مرضيءَ موجب هلڻ ۾ مدد ڏينديون آهن. هڏار مڇين ۾ هوا جي هڪ ٿيلهي يا ڦوٽو هوندو آهي. ان جي نسبت ٻاهرين دٻاءَ جي برابر هوندي آهي. ڦوٽي جي مدد سان مڇي پاڻيءَ ۾ مختلف سطحن تي تري يا بيهي سگهندي آهي. پر ڪن سامونڊي مڇين جهڙوڪ شارڪ، گامر ۽ پٽڻ مڇين ۾ اها ٿيلهي ڪونه ٿئي. انهن کي هر وقت ڪنڀڙيون يا ڦنگ هلائڻا پون ٿا. اهي جيڪڏهن هر وقت ڪنڀڙيون نه هڻنديون ته هيٺ هليون وينديون.

مختلف مڇين جي خوراڪ مختلف ٿئي ٿي. انهن جي کائڻ جو طريقو به جدا هوندو آهي. هر مڇي اهو ئي کائي ٿي، جيڪو انهن جي پنهنجي ماحول ۾ موجود آهي. ڪي مڇيون ننڍين مڇين کي شڪار ڪري کائينديون آهن. ڪي مڇيون آبي ٻوٽا، ٻين مڇين جون آنيون ۽ آبي جيت کائين ٿيون. مڇيون پنهنجو کاڌو نه ڇڏائينديون آهن، انهن جي وات ۾ جيڪي ڪجهه آيو اهو سڄي جو سڄو يا ننڍن ٽڪرن ۾ ڳيهي وينديون آهن. ڪافي مڇين کي ڏند هوندا آهن. اهي يا ته جاڙيءَ ۾ هوندا آهن يا وري نڙيءَ جي پوئين حصي ۾ ٿين ٿا. معدِي يا آندِي ۾ پھتل خوراڪ هضم ٿي، رت ۾ شامل ٿي، جسم ۾ گردش ڪندي آهي.

سڀني مڇين جا وات منڍيءَ ۾ ساڳي جاءِ تي نه هوندا آهن. ڪن

مڇين جو وات سامهون وڃ تي هوندو آهي. جيت خور مڇين جو وات مٿي مڙيل هوندو آهي. لوڙه وغيره جو وات هيٺ ٿئي ٿو ڇاڪاڻ اهي پٿرين جي هيٺان خوراڪ کوٽي حاصل ڪنديون آهن. مرجاني خطن ۾ رهندڙ ڪن مڇين، ڪنگن ۽ سامونڊي گهوڙي جو منهن ڊگهو هوندو آهي. مڇين جون جسون به مختلف انداز ۾ ڪم ڪنديون آهن. عام طور مڇين کي منڍيءَ جي ٻنهي پاسن کان هڪ هڪ اک هوندي آهي، انڪري اهي ٻنهي اکين کي ڪنهن هڪ شئي تي مرڪوز ڪري نه سگهنديون آهن. ڪي ٿوريون مڇيون جن جي منڍيءَ جي بناوت مختلف هوندي آهي، ايئن ڪري سگهنديون آهن. مڇيون فقط اکين جي حس تي ڪونه پاڙينديون آهن. ڪن حالتن ۾ پاڻي اونداهو يا وري لٽاشو هوندو آهي. ڪن جنسن ۾ ڇهه ۽ ذاتي جي حس گڏيل هوندي آهي. کڳي ۽ لوڙه وغيره کي حس مڇون ٿين ٿيون، جيڪي غذا جي کوج ۾ مدد ڪنديون آهن. انهن مڇن ۾ ذائقو محسوس ڪرڻ جي صلاحيت هوندي آهي. ڪجهه مڇين ۾ اها صلاحيت وات، مٿي ۽ جسم ۾ هوندي آهي. مڇين ۾ سونگهڻ جي صلاحيت به سٺي هوندي آهي، انهن جون ناسون تنهن ذريعي سڌيءَ طرح دماغ سان ڳنڍيل ٿين ٿيون. منگر ڪتب جون مڇيون رت جي بوءِ تمام پري کان سونگهي وٺنديون آهن.

مڇين کي ٻاهريان ڪن ڪونه ٿيندا آهن، پر پوءِ به انهن ۾ ٻڌڻ جي صلاحيت ٿئي ٿي. مڇين ۾ ٻڌڻ جا عضوا ڪوپڙيءَ جي پوئين حصي ۾ هوندا آهن. مڇين ۾ ڇهين حس به ٿئي ٿي، مڇيءَ جي پاسڙن کان قطار ۾ ننڍڙا سوراخ هوندا آهن جيڪي ماحول ۾ ڪنهن به قسم جي هلچل کي هڪدم محسوس ڪري وٺندا آهن.

سنڌ ڪوهستان جا ڪنارا ڇهندڙ سامونڊي خطي ۾ مڇين جون چار سئو کان وڌيڪ جنسون آهن. انهن مان فقط ٽي يا چار درجن قسم انساني خوراڪ ۾ شامل آهن. انهن مان اڪثر مڇيون 600 کان 700 فٽ تائين پاڻيءَ جي سطح ۾ رهن ٿيون، ڇو ته ان سطح جي پاڻيءَ تائين اُس پهچي سگهندي آهي. جنهن تي مڇيءَ جي خوراڪ لاءِ چڱا خاصا ٻوٽا پيدا ٿين ٿا. ان

کان هيٺيون پاڻي اونداھو ۽ ٿڌو هوندو آھي، پر ان اونھائيءَ ۾ بہ ڪافي مڇيون رهنديون آھن.

ڪِرڙانگ (ڪِرڙيون ۽ نانگ وغيره)

نانگ بہ کيرٿر جي دنيا ۾ اھم پائيوار آھن. اھي ٿڌي رت وارا جانور آھن. سائنسدانن جو خيال آھي تہ نانگ ڪِرڙين مان ارتقا ڪيل جانور آھن. سنڌ ۾ عام طور تي نانگ ۽ بلا ھم معنيٰ لفظ آھن، پر جوڳين وٽ نانگ معنيٰ cobra آھي ۽ بلائن ۾ بيا سمورا سڀ، ڪِرڙيون ۽ جھنگلي جانور شامل آھن. سائنسدانن جو خيال آھي تہ نانگ ارتقا جي لحاظ کان ڪا گھڻي پراڻي ڳالھ نہ آھي ۽ اھو اصل ۾ ڪِرڙين جي سلسلي مان اٽڪل 13 لک سال اڳ ڦٽي جدا ٿيل ھڪ نئون سلسلو آھي. ان دور ۾ مماليه جاندارن جا ڪوڙ سارا قسم پيدا ٿي چڪا ھئا. سائنسدانن کي اتر آفريڪا مان *lapparentophis defrennei* جنس جي ڪِرڙانگ (reptile) جي ڪرنگھي جون ڪجھہ ھڏيون مليون. اھو جانور 13 لک سال اڳ زندهہ ھو ۽ ڪِرڙيءَ کان وڌيڪ نانگ جھڙو ھو. ان جو جسم ڊگھو ۽ چنگھون سنھيون ۽ ڪمزور ھيون. اھو ڪِرڙانگ پنھنجين چنگھن جي سھاري ھلڻ جي لائق ڪونہ ھو. انڪري پيٽ ۾ ۽ جسم کي موڙا ڏيئي اڳتي رھندو ھو. سائنسدانن جو خيال آھي تہ ان جاندار جي اکين جا چنڀر پاڻ ۾ ملي ويل ۽ شفاف ھئا. ان جي ڪنن جا سوراخ يا تہ تمام ننڍڙا ھئا يا وري بند ھئا.

ليپارنٽوفس ڊفرنياڻي ڪا بلڪل انوکي مخلوق ڪونہ آھي. اڄ بہ دنيا ۾ اھڙيون ڪِرڙيون موجود آھن جن جو چنگھون ڪمزور ۽ ننڍڙيون ھونديون آھن. انھن کي *scincidae* ڪٽنب ۾ رکيو ويو آھي. فارسيءَ ۾ انھن کي ريگ ماھي چوندا آھن. بہ منھين ۽ ارڙ بلائن کي اخراجي سوراخ وٽ پٺھي پاسي ھڏيدار اُڀار ٿيندا آھن جن سان پتو پوي ٿو تہ اھي انھن جي گر ٿيل چنگھن جون آخري نشانين آھن. خيال آھي تہ اڄ کان ڏھ ٻارنھن لک سال اڳ ننڍڙن مماليه جانورن جي شڪار لاءِ ڪِرڙانگن کي رات جي وقت ۾ مماليه جي ڀرڻ ۾

گهڙڻو پوندو هو. مماليه گرم رت وارا جاندار هوندا آهن ۽ ڪرڙانگن جو رت ٿڌو هوندو آهي. اهي ڪرڙانگ پنهنجي جسم ۾ موجود خاص جسي عضون جي مدد سان گرم رت مماليه جي ٻرن ۾ گولي شڪار ڪندا هئا. سوڙهن ٻرن ۾ داخل ٿيڻ لاءِ انهن ۾ جسماني تبديليون آيون. جنگهون ٻرن ۾ داخل ٿيڻ ۾ رنڊڪ پئي ٿيون، انڪري اهي چٽي ويون اکين ۾ مٽي ٻوڙ کان بچاءُ لاءِ اکين تي شفاف چلر ٺهي ويا ۽ ڪن بند ٿي ويا. هاڻي، هي جانور زمين تي کڙڪن کي اندرين ڪنن سان محسوس ڪرڻ لڳا. نانگ بلاهن جي زبان ڊگهي ۽ دو شاخي ٿئي ٿي. جنهن سان اهو نه رڳو ذائقو وٺي ٿو پر سونگهي به سگهي ٿو.

نانگ جو جسم منڍي. ڌڙ ۽ پيچ تي مشتمل ٿئي ٿو پر اهي سڀ حصا پاڻ ۾ ان ريت ڳنڍيل هوندا آهن جو هڪٻئي کان ڌار نه ٿا لڳن. نانگ جو جسم چلر دار ڪل سان ڍڪيل ٿئي ٿو. ان جي گل ۾ ڪنهن به قسم جا غدود ڪونه هوندا آهن. اهي چلر جسم جي مختلف حصن تي خاص ترتيب ۽ ماپ جا ٿين ٿا، جنهن سان نانگ جي چرپر ۾ رنڊڪ نٿي پوي. انهن ئي چلرن سبب نانگ رهڙن ۽ ڌڪن کان محفوظ رهي ٿو. نانگ جي پيٽ جا چلر ويڪر ۾، ۽ هڪٻئي جي پويان منڍيءَ کان پڇڙيءَ تائين هوندا آهن. انهن جي مدد سان اهو تيزيءَ سان حرڪت ڪري سگهندو آهي. نانگ پنهنجي ٻاهرين چلر دار ڪل (ڪينچلي) بدلائيندو رهندو آهي. ڇاڪاڻ ته اها گات ۽ رهڙن سبب نه رڳو ڪمزور ٿي ويندي آهي. پر نانگ جو جسم به وڏو ٿيندو ويندو آهي، ان کي نئين ۽ وڏي گل جي ضرورت پوندي آهي. انڪري نانگ جي ٻاهرين ڪل جي هيٺان نئين ڪل هر وقت تيار ٿيندي رهندي آهي ۽ وقت سان ٽلهي ٿيندي ويندي آهي. هوريان هوريان ٻاهرين ڪل بي رنگ ۽ ڌنڌلي ٿيندي ويندي آهي. اک جو چلر به ڌنڌلو ٿي ويندو آهي، جنهن ڪري نانگ اٽڌو ٿي پوندو آهي ۽ ڪنهن ڪنڊ پاسي ۾ نڍال پيو هوندو آهي. ٻه هفتا کن بڪ ۽ تڪليف جي حالت ۾ رات کوليندو ۽ بند ڪندو رهندو آهي. اهڙي بيحال حالت ۾ پٿرن سان رڳڙون کائيندو آهي، ان وقت سڀ کان پهرين ان جي منڍيءَ تان

ڪل اُڏڙي پوندي آهي. اڪ تان ڏنڌلو چلڻ لهندي ئي بڪ ۽ اڃ ۾ چتو نانگ شڪار لاءِ بيتاب ٿي ڦيريون پائيندو آهي. ان عمل ۾ سندس پراڻي ڪل پٿرن ۽ ٻوٽن ۾ ڦاسي لهي ويندي آهي. نانگ پنهنجي پيدائش کان پوءِ هڪ کان ٻن هفتن اندر ڪل بدلائيندو آهي ۽ پوءِ اهو سلسلو ڦڌ، ڄمار ۽ جنس (genus) مطابق جاري رهندو آهي.

هر نانگ جي جسماني رنگت جدا ٿئي ٿي. ان جو تعلق ماحول سان هوندو آهي. ريتيلن ۽ وارياسن علائقن ۾ رهندڙ نانگن جو رنگ به ريتيلو ۽ وارياسو هوندو آهي. وڻن تي رهندڙ نانگن جو رنگ پٺن جهڙو زيتوني يا چوڏن جهڙو گهرو پورو هوندو آهي. نانگن جي جسم تي مختلف چٽ، آڏا ڦڏا، ليڪا يا چلي دار پٽيون هونديون آهن. اهي نانگن جي سڃاڻپ ۾ ڪافي مددگار ٿين ٿيون. عام طور تي سڀني نانگن جو پيٽ اڇو هوندو آهي. نانگ کي ان جو رنگ ماحول ۾ لڪڻ ۾ مدد ڏيندو آهي. ايئن به ڏٺو ويو آهي. ته ماحول جي تبديليءَ سان جسم جو رنگ ۽ ڇاپ به بدلجي ويندي آهي. ان جو رنگ ۽ ڇاپ سج جي گرميءَ کي جذب يا منعڪس ڪري سج جي تپش کان جسم جي حفاظت ڪندو آهي.

نانگ کائڻ جو شوقين هوندو آهي، گرم مند ۾ خوب کائيندو آهي، انڪري اضافي چرٻي چڙهندي ويندي اٿس. چرٻيءَ جا لوڙا ننڍي آنڊي جي ساڄي ۽ کاٻي پاسي هوندا آهن. سياري ۾ نِسٽائي واري ننڍ ۾ اها چرٻي هوريان هوريان گهري خوراڪ طور استعمال ٿيندي آهي.

نانگن جي رت جو سرشتو عام ڪِرڙانگن جهڙو هوندو آهي، ان جي دل جسم جي لحاظ کان تمام ننڍي هوندي آهي. ساهه جي نظام ۾ به ڦڦڙ هوندا اٿس، جيڪي نانگ تري ڄاڻن انهن ۾ ڦڦڙ جو پويون حصو هوا ڀريل هئڻ ڪري توازن قائم ڪندو آهي. خشڪيءَ جا نانگ شوڪاري لاءِ هوا ذخيرو ڪندا آهن، اها ئي هوا جسم ڦٽندڙ ۽ سسائڻ ۾ مدد ڏيندي آهي.

نانگن جي اڪثريت آنا ڏيندي آهي. نانگ جي آنن جو خول مضبوط پردي جي شڪل ۾ هوندو آهي، ڪي نانگ ٻچا ڏيندا آهن. نانگ

جي جس تمام تيز ٿئي ٿي، ڇو ته هن لاءِ پنهنجي جسم جي حفاظت وڏو مسئلو هوندي آهي. انڪري نانگ جبلي طور تي هر وقت پناهه گاهه جي تلاش ۾ هوندو آهي. نانگ جي ڪوشش هوندي آهي ته جسم کي ويڙهي وات جي ويجهو رکي ته جيئن دفاع بهتر هجي يا ڦڙتيءَ سان پڇي سگهجي. نانگ جي زندگي به خطرناڪ سان ڀريل هوندي آهي. ان کي پنهنجي شڪار جي ڪوچ ۾ هنڌ هنڌ هلڻو پوي ٿو ۽ هنڌ هنڌ مقابلو ڪرڻو پوي ٿو ان ڪري سندس جسمون به تمام تيز ٿي ويون آهن جسم جسياتي لحاظ کان تمام تيزيءَ سان رد عمل ڏيندو آهي.

ڪل نانگ جو حساس ترين حصو آهي، جنهن جي ڪارڪردگيءَ تي نانگ جي زندگيءَ جو دارو مدار آهي. نانگ جي سڄي ڪل ڇههءَ جي جس سان ڀرپور آهي. انڪري معمولي ڇههءَ به هڪدم رد عمل ظاهر ڪندو آهي. ان جي چلڻ جي وچ ۾ جس خليا اعصابي نظام سان ڳنڍيل هوندا آهن. انڪري ٻاهرين ماحول ۾ معمولي تبديلي به انهن اعصابن کي متاثر ڪندي آهي. انڪري گرمي پد ۾ لاٽ يا واڌ جو احساس به انهن ئي خليا جي ذريعي محسوس ڪري سگهجي ٿو. ارڙو مٿئين ڇنڇن جي چلڻ جي وچ ۾ خاص جس خليا جي ذريعي اونڌاهيءَ ۾ به گرم رت وارن جانورن جي موجودگيءَ کي محسوس ڪري ڦڙتيءَ سان پنهنجو شڪار پڪڙي وٺي ٿو.

نانگ جي اک جو شيشو عام طور پيلو ۽ بيضوي هوندو آهي. ٻين جانورن ۾ اهو شيشو گول ۽ اڇو ٿئي ٿو. ان پيلاھت سبب نانگ اونڌاهيءَ ۾ به سولائيءَ سان ڏسي سگهندو آهي ۽ مختلف رنگن جو فرق محسوس ڪري سگهندو آهي. پر نانگ جي نظر عام طور تي تيز نه هوندي آهي. اهو فقط ويهارو کن فٽن تائين چٽو ڏسندو آهي پر اوسي پاسي جي شين جو فاصلو سمجهي نه سگهندو آهي پر پنهنجي ماحول ۾ معمولي کان معمولي حرڪت کي هڪدم محسوس ڪري سگهندو آهي. زمين ۾ رهندڙ نانگ روشنيءَ جو فقط احساس ڪري سگهندا آهن. انڪري به منهيءَ جي نظر تمام گهٽ هوندي آهي.

کیرٿر جي صحرائي ۽ جابلو ماحول جي نانگن ۾ ڪاريهر، لنڊيون، کپڙ ڪور ڪند، ڊمر وغيره آهن جيڪي زهريلا نانگ آهن. ٻيا غير زهريلا نانگ گهوڙيال، چوڙيل، سرنگهون ۽ سيگهي بلائون آهن، جيڪي کيرٿر ۾ جام آهن.

نانگ گوشت خور جانور آهي، ان جي خوراڪ ۾ جيت، ڪوٺو ڏيڏ، سانڀا، پکي، ڪرڙيون، سها، نورڙڙا، مڇيون ۽ رڍ، پکري به شامل آهن. نانگ مٽي خور يا گاهه خور بلڪل نه آهي، جيئن عام تاثر آهي. نانگ کير يا پاڻي به ڪونه پيئندو آهي پر ڪنهن ڪنهن مهل ان ۾ زبان آلي ڪندو آهي. نانگ گهميل آبھوا ۽ شڪار ڪيل جانور ۾ موجود پاڻياٺ مان پنهنجي جسم لاءِ گهريل پاڻي حاصل ڪندو آهي. هر نانگ پنهنجي جسمات آهي شڪار ڪندو آهي. نانگ جوڙا يا گروه ٺاهي ڪونه رهندا آهن. اڪثر نانگ فقط لڳ جي مند ۾ جوڙو ٺاهيندا آهن، فقط ڪارو نانگ cobra ئي سڄي عمر جوڙي ۾ رهندو آهي.

صحرائي زندگي

جبل ۾ گرميءَ جو درجو سولائيءَ سان 50 ڊگريون سينٽي گريڊ، اُس ۾ زمين جي تپش 65 ڊگريون سينٽي گريڊ ۽ پٿر جو گرمي پد 75 ڊگريون سينٽي گريڊ ٿيو وڃي. صحرائي گرميءَ ۾ سنڌ جي سڀني جبلن سميت سمورا ٽاڪرو علامقا ويران ۽ پٽيانگ نظر ايندا آهن. اها ڌرتي ايئن لڳندي آهي، جڻ ويران آسماني گره جو ٽڪرو هجي! ان سخت گرميءَ کان بچڻ لاءِ سڀ ساهسي پنهنجي پنهنجي نموني سان جيئڻ جا جتن ڪري رهيا هوندا آهن. ڪو زمين جي ٻرن ۽ ڌڙن ۾ گهڙي ويندو آهي ته ڪو وڻن ۽ ٻوٽن جي پناهه ۾ ايندو آهي. هر ڪنهن پنهنجي جيئڻ جو رستو ڳولهي لڏو آهي، ان هوندي به گهڻا جانور پاڻ بجائي نه سگهندا آهن ۽ سندن تعداد گهٽجي ويندو آهي.

سندن جياپي جا سرشتا تمام دلچسپ آهن. صحرائي گرميءَ ۾ اڪثر جلتيا (amphibians)، ڪرڙانگ (reptiles) ۽ ننڍڙا مماله ٻر ڪوٽي زمين ۾

گهڙي ويندا آهن. پر جيئن ته سڀ جانور ٻر ڪوٽي نه سگهندا آهن، انڪري اهي پاڻ کي پگهر جي ذريعي ٿڌو رکڻ جي ڪوشش ڪندا آهن.

جانورن ۾ پگهر يا جسم مان پاڻيءَ جي اخراج جا ٽي نمونا آهن: چمڙي، مان پگهر جون نڪال، سهڪڻ يا وات مان گگهه گاڙڻ. مختلف جانور مختلف طريقا اختيار ڪن ٿا.

ڪرڙانگ، پکي ۽ لومڙيون ڦڦڙن جو استعمال ڪن. اهي گرميءَ جي وقت ۾ سهڪڻ لڳندا آهن. ان ريت انهن جو آلو ساھ هوا ۾ گهر ڇڏي ٿو. ڪي جانور گگهه گاڙين ٿا ۽ پنهنجو جسم ٿڌو رکڻ لاءِ جسم تي زبان ڦيريندا رهن ٿا.

گردار جانورن ۽ گهوڙن ۾ پگهر جا غدود انسان جي پيٽ ۾ ڪافي ترقي ڪيل آهن. ڪجهه جانورن جو معدو مرکب آهي. اهي پتن، گاه ۽ تارين تي مشتمل خوراڪ سان وڏي مقدار ۾ پروٽين هضم ڪن ٿا. هاضمي جي ان عمل دوران گرمي پيدا ٿئي ٿي ۽ ان گرميءَ مان اوباسيون ڏيئي جند ڇڏائين ٿا. سياري ۾ اهائي گرمي کين گرم رکي ٿي. (انڪري اوباسين جي ضرورت محسوس نه ٿي ٿئي). جيڪڏهن پاڻي موجود آهي ته جانور گهڻو پاڻي پيئڻ ۽ مٺڻ جي ذريعي پاڻ کي ٿڌو رکڻ جي ڪوشش ڪن ٿا.

گوشت ۽ جيت خور جانورن کي گاه خور جانورن جي پيٽ ۾ پيئڻ لاءِ وڌيڪ پاڻي گهرجي. گاه خور جانورن جي خوراڪ ۾ گلوڪوز ۽ نشاستو جامر هوندو آهي، ان ڪري انهن کي پگهر جي نڪال لاءِ گهڻو پاڻي نه گهرجي.

وچون، ڏينپو، ڪرڙ (گاڙهو-پيلو ڏينپو)، گهريٽيون، اڏوهي، ڪوريٽا، ماکي، مڪڙ، پويت، تڏون، ماکوڙا، تڏڻ ۽ سوپريون وغيره صحرا جا عام جيت آهن. انهن ۾ سڀني کان خطرناڪ وچون آهي. انهن وچن جي جسم تي هڪ قسم جي ميٺ ٿئي ٿي، جيڪا انهن کي پاڻي جي اخراج کان روڪي ٿي. جڏهن انهن جي جسم ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ وڌي ويندي آهي، تڏهن سندن ڦڦڙي عضوا کلي پوندا آهن ۽ ساھ ۾ مددگار ٿيندا آهن.

جيڪڏهن گهم 10 سيڪڙو کان گهٽ هجي ته ان مُند ۾ وڃون (116.5°F (47°C) = درجي جي گرميءَ تائين 24 ڪلاڪ گرمي برداشت ڪري سگهي ٿو. ڪن وڃڻ جي جسمن ۾ 86 سيڪڙو تائين پاڻي ٿئي ٿو جيڪو هو پنهنجي وزن برابر جيت کائي پورو ڪري وٺي ٿو. ڦاڪدار کوين جي ڪرنگهي وارا جيت (arthropods) سخت گرمي ۽ ٿڌ کان بچاءَ لاءِ ڀر ڪوتي ان ۾ گهڙي ويندا آهن ۽ اتي ئي آنا ڏيندا آهن. ان جي پيٽ ۾ وڃون گهڻو هيٺ تائين ڀر ڪوتي ٿو ۽ ان کي سُڪل پنن سان ڍڪي ڇڏيندو آهي. ڏينبو ۽ ماکوڙا هيٺ بهتر گهم تائين ڀر ڪوتين ٿا.

ڪي ٿورڙا ٻڌا، تَنڊڻ ۽ ڪوريٿڙا ڏينهن جو نظر ايندا آهن البت انهن مان اڪثر رات جو نڪرندا آهن. تَنڊڻن جي آبادي برساتن کان پوءِ هوريان هوريان وڌندي آهي ۽ فيبروريءَ تائين انتها تي پهچندي آهي. مئي واري مهيني کان اڳ، اپريل ۾ ئي اهي وڏي پئماني تي موت جو شڪار ٿيندا آهن ۽ بلڪل غائب ٿي ويندا آهن. گرم ترين ڏينهن ۾ اهي ڀڄن، آڻن ۽ لارڙن جي روپ ۾ هوندا آهن. ساڻن جي به اها ئي صورتحال هوندي آهي.

برساتن کان پوءِ ٻوٽن ۾ نئين زندگي ڀرڻ سان گڏ ڦل نروار ٿين ٿا، جن تي ماکي، ڏينبو، پريٿيون مڪيون ۽ ٻيا ڀرڌار جيت مست نظر ايندا آهن. انهن جيتن تي پلجندڙ وڃون، ڪوريٿڙا، وڏا ماکوڙا، تَنڊڻ، ڏينبو ۽ زهريلا مڪا ننڍڙن جيتن جي شڪار کي لڳي ويندا آهن. رات جا شڪاري جيت سياري ۾ سخت ٿڌ کان بچڻ لاءِ صبح جو سویر يا سج لٿي مهل نڪرندا آهن. ڪي جيت سُڪل ڪڪن ۽ پنن هيٺان رهندا آهن، جن تي ماکو سبب آلاڻ هوندي آهي، جنهن مان هو ٽمي حاصل ڪندا آهن.

ڪرنگهيڊار ۽ وڏن گوشت خور جانورن خاص ڪري (leopard) چٽي لاءِ سنڌ جي ڪوهستان ۾ گهڻو شڪار نه رهيو آهي، البت بگهڙ، گدڙ، لومڙ ۽ هاتار پنهنجو گذر ڪري وٺندا آهن.

صحرائي حيات ۾ شايد ڪِرڙانگ (reptiles) ئي سڀ کان وڌيڪ ڪامياب آهن. انهن جي ڪل ٿلهي، ڪهري ڪڙپڙ ٿئي ٿي ۽ چمڙي ۾ ڪي

خاص غدود ٿين ٿا جن جي ڪري پاڻيءَ جو خرچ گهٽ کان گهٽ آهي. ان جي ڦوڳ ۾ به پاڻياٺ گهٽ ۽ يورڪ تيزاب گهڻو ٿئي ٿو. اهي پنهنجو پاڻي پنهنجي شڪار جهڙوڪ ننڍڙن مماليه، جلتيلين (amphibians) ۽ جيتن مان حاصل ڪن ٿا. ڪي ڪرڙانگ گهميل واريءَ مان پنهنجي گل جي ذريعي گهم چوسي وٺن ٿا. صحرائي ڪرڙيون تيز ڊوڙنديون آهن. ڪافي ڪرڙيون نانگن وانگر 35-38 ڊگريون سينٽي گريڊ تائين گرميءَ پسند ڪن ٿيون پر اهي ڪرڙانگ 45 ڊگري (113 فارنهيٽ) جي گرمي برداشت نٿا ڪري سگهن ۽ فالج جي اثر هيٺ مري ٿا پوءِ انڪري اهي ڏينهن جي گرم وقت ۾ ٻرن ۾ گهڙي وڃن ٿا ۽ سج لٿي کان اڳ شڪار تي نڪرن ٿا ۽ سج اُڀرڻ کان جلد پوءِ ٻرن ۾ موٽي وڃن ٿا.

ننڍڙن جانورن جي رات جي وقت ۾ نڪرڻ واري عادت جو به اهو ئي ڪارڻ آهي ته انهن جي جسماني پکيڙ وزن جي ڀيٽ ۾ گهٽ آهي. اهي سڄو ڏينهن ٻرن ۽ ڌڙن ۾ پيا هوندا آهن جتي گرميءَ جو درجو 10-20 سينٽي ميٽرن جي اونهائيءَ ۾ سطح زمين کان 10-5 ڊگريون گهٽ ٿئي ٿو. ڪرڙانگن وٽ پگهر جا غڙوڊ ڪونه ٿين.

نانگ پاڻ کي اُگرميءَ کان بچائڻ لاءِ ويڙهجي سڙهجي سوڙهو ٿي ويهندو آهي ۽ اڪثر ڪنهن ٻوٽي جي چانوَ ۾ چَپ هڻي ويٺو هوندو آهي. سنڌ جي صحرائن ۾ اڪثر کير (*cchsis carinata*)، لُنڊي، سنگجور (*bumgaras cocrulus*) ۽ ڪاريهر (*nanja tripudian*) زهريلا آهن. ڪاريهر گرميءَ جي ڏينهن ۾ وات نه کولي سگهندو آهي ۽ نه وري ڪڪي سگهندو آهي. شام جي مهل جنهن وقت اهو جليبيءَ وانگر وڪڙ هنيو ويٺو هوندو آهي، تڏهن اهو ڪوٺڻ، ڏيڏرن ۽ جيتن جي تاڙ ۾ هوندو آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي به ڪڪي وجهندو آهي. سندس اهڙو ورتاءُ عام ماڻهن لاءِ ’فتيري‘ آهي، روايتي طرح صوفي فقير يا درويش هونئن ته ماڻهن کان پري رهندو آهي، پر ويجهو وڃڻ سان جلال ۾ اچي ڪو پارائو به ڏيئي سگهي ٿو.

سندھ ۾ ڳوھ Iguana (*varanus benglatensis*) عام آهي. سانڊو (*uromatic hard wickii*) آهي ۽ ان جي چرٻي طبي مقصدن ۾ ڪم اچي ٿي. صحرائي ڪرڙيون واري ۾ ايئن ٺهي هڻي سگهنديون آهن، جيئن لڏو پاڻيءَ ۾. انهن جي نڪ ۾ اهڙو چاڻيدار عضوو آهي جو سنهي ريتي نڪ ۾ داخل ٿي نه سگهندي آهي. جابلو ڪرڙيون ڇپن سان ايئن مضبوط چُهتي پونديون آهن جو انهن کي ڇڏائي نه سگهبا انهن جي پيرن ۽ گل ۾ هوا ڀرڻ جي صلاحيت هوندي آهي.

صحرائي پکي گهڻو ڪري جيت خور يا گوشت خور هوندا آهن. انهن جو جسماني گرمي پد مماليه جي پيٽ ۾ وڌيڪ ٿئي ٿو ۽ اهي 47 ڊگريون سينٽي گريڊ (116.6 فٽرنهائٽ) کان وڌيڪ گرمي برداشت ڪري نه سگهندا آهن. اهي پاڻ کي سهڪڻ جي نظام تحت ٿڌو رکندا آهن پر ان سان ئي بخار ٿي وڃي ٿي ۽ جيئن لاءِ کين پاڻيءَ جي ضرورت پوي ٿي. اها پاڻياٺ هُو جيتن ۽ مئل جانورن مان خوراڪ طور حاصل ڪن ٿا. هنن کي اڏامڻ جي اهليت سبب پاڻيءَ تائين جلدي پهچڻ جي سهوليت آهي.

سج جي تپش يا صحرائي زمين تي رکيل بيضا جلد خراب ٿي وڃن ٿا انڪري پکي پنهنجا آنا ڪنهن چانوري ۾ آڪيرو جوڙي لاهين ٿا. پکي عام طور تي بچ، نانگ ۽ ننڍڙا جانور کائين ٿا. گجھه پاڻ شڪار ڪري نه سگهندي آهي، انڪري مئل جانور ڳوليندي آهي ۽ سندس تيز نظر ڪوبه ڍونڍ ضايع ٿيڻ نه ڏيندي آهي.

ننڍڙا جانور گرم هوا، ڏوڙ ڏڏڙ وارين تيز هوائن کان بچڻ لاءِ پنهنجا طريقا اختيار ڪن ٿا. هنن کي پاڻي جامر پيئڻو پوي ٿو ڪٽرندڙ جانور پگهر ڪونه ڳاڙهندا آهن، پر اهي پنهنجي لعاب سان پنهنجي پشم کي آلو ڪن ٿا. لومڙيءَ جي خوراڪ جيت، ڪرڙيون، ڪٽيندڙ جانور، ڪجي، پير ۽ اهڙو ئي ٻيو جهنگلي ميوو آهي. انهن سڀني شين ۾ گهر موجود آهي. لومڙي ڏينهن جو گرميءَ کان بچڻ لاءِ ٻر ۾ پئي هوندي آهي. ڪٽرندڙ جانور


جهنگلي ٻوٽن جا ٻج کائيندا آهن. جيڪي وڏي تعداد ۾ ٿين ٿا. پکي پنهنجي وٽ سان پيشابي تيزاب چڱي خاصي مقدار ۾ خارج ڪندا آهن. وڏا جانور جهڙوڪ هرڻ، سره، گد، ۽ سهو وغيره گاهه ۽ پتن تي گذارو ڪن ٿا. انهن مان ڪي ته ٿور به کايو وڃن. گوشت خور جانور لومڙ، گدڙ، گوريت، چچوندر ۽ ٻيا ڪوئا جيت خوريءَ تي پلجن ٿا. اڪثر جانورن جو رنگ هيڊان مائل ٿئي ٿو. ڪن صاحبن جو چوڻ آهي ته اهو ماحول سان هم آهنگي يا ڪيموفلاج آهي. پر هڪ راءِ اها به آهي ته اها رنگت تيز اُس سبب آهي.

کيرٿر 'نیشنل پارڪ' هئڻ جي باوجود اتي عام طور تي آفريڪا جي سفاري پارڪن وانگر ڪوبه ڌڻ يا جهنگلي جانور نظر نه ايندو آهي. سبب اهو ئي آهي ته ڏينهن جي وقت ۾ هر جانور گرميءَ کان بچڻ لاءِ يا ته ڌڙ ۾ پيو هوندو آهي يا وري ٿوڙن ۽ اونهين سِيرن ۾ ڪٿي ڇانوري ۾ لڪو بيلو هوندو آهي. چوٽه ڪي ٿورڙا سينٽي ميٽر هيٺ پر ۾ گرميءَ جو درجو زميني سطح کان 10-15 سينٽي گريڊ گهٽ هوندو آهي. پر ۾ گهم به نسبتاً وڌيڪ ٿئي ٿي ۽ جانور پنهنجن اڪثر دشمنن کان به محفوظ رهي ٿو.

ان جي ابتڙ وڏا جانور سره، هرڻ، گد، گئون، پڪريون، اُٺ جيڪي ٻه ڪوئي نٿا سگهن، مختلف ترڪيبون اختيار ڪن ٿا. کين بچاءُ ۾ پاڻي گهرجي ته جيئن هو پگهرجن يا سهڪي سگهن. انهن مان هر هڪ جنس اُس کان بچڻ لاءِ پاڇي ۾ رهڻ جي ڪوشش ڪندي آهي. اُٺ، رد ۽ بکر سج جي تپش کان گهٽ متاثر ٿيڻ لاءِ ان کي پُٺي ڏينديون آهن ته جيئن جسم جو گهڻو حصو سڌي تپش کان پاسيرو هجي.

گد، گدھ گهوڙا وغيره جسم جي چرٻيءَ مان پاڻي خرچ ڪري سگهن ٿا. گدھ 20 سيڪڙو ۽ اُٺ بنا ڪنهن نقصان جي 30 سيڪڙو وزن وڃائي ٿو. اُٺ ڏهن منٽن جي لاڳيتو ڏوگهه سان ايترو ئي پاڻي واپس پي وٺي ٿو جيترو اهو ڊگهي وقت ۾ خرچ ڪري ٿو. اٺ پنهنجي اوجھه يا ٿوهي ۾ پاڻي ڪونه جهليندو آهي (جيئن عام تاجر آهي) پر ٿوهي ۾ چرٻي جمع

هوندي آهي، جيڪا اهو ڪا ٻي خوراڪ نه ملڻ جي صورت ۾ جسماني گهرجن جي پورائي لاءِ خرچ ڪندو آهي.



ڏکڻ ايشيائي ٿوهي دار
ڊگهو (Zebu) ٿوهي ۾ چرڻي جمع
ڪندو آهي ۽ رڍ پنهنجي پُڇ ۾
(جنهن کي دُڻب چوندا آهن). جيڪڏهن
گرمي ٻڌ 34 سينٽي گريڊ کان گهٽ
هجي ته اُت سال جا ڪيئي مهينا

پاڻيءَ کان سواءِ رهي سگهي ٿو پر ان جو دارومدار ساڻي گاهه ۾ موجود نميءَ تي آهي. اُت پاڻيءَ کان سواءِ ڪافي ڏينهن رهي سگهي ٿو، پر جيڪڏهن گاهه سُڪل آهي ته پوءِ هن کي پاڻيءَ جي ضرورت پوندي. ٿوهي ۾ رڳو سڻپ هوندو آهي. چون ٿا ته اُت گاهه ۽ پاڻيءَ کان سواءِ 40 ڏينهن زندهه رهي سگهي ٿو ۽ ان حالت ۾ جيڪڏهن پاڻي ملي وڃي ته 100 لٽر پي ويندو، پر ٿوهو مناسب گاهه خوريءَ کان پوءِ ڪجهه ڏينهن کان پوءِ ڦوڪبو.

جسماني گرمي وڌڻ سان ماڻهو بگهر ڳاڙي ٿو ۽ ڪُتي جو هُلو لڳڻ شروع ٿئي ٿو، ان صورت ۾ ڪُتي جي جسم مان لُوڻياڪ ضايع نه ٿي ٿئي پر ماڻهوءَ جا لُوڻياڪ ضايع ٿين ٿا. ڪُتو پنهنجي جسم جو ڪُتل پاڻي ڏوگهه ذريعي پورو ڪري ٿو پر ماڻهوءَ کي پاڻيءَ سان گڏ لُوڻياڪ به گهرجي. انڪري ماڻهوءَ جي خوراڪ ۾ روزانو لُوڻ لازمي آهي. انساني جسم هڪ هفتي کان پوءِ صحرائي حالتن موجب عادي ٿي سگهي ٿو.

ڪوهستان ۾ نباتات

هوتا عام طور تي گهڻي مٽيءَ ۾ يا نئ جي پيٽ ۾ نه وڌندا آهن. ٽڪرين جي وچ وارين وادين ۾ پاڻيءَ جي وهڪري وارو لنڪهه ڇڏي، باقي حصن ۾ گاهه هوتا ٿيندا آهن. صحرائي ٻوٽن ۾ سوڪهڙي کي منهن ڏيڻ لاءِ

بقا جو خاص نظام موجود هوندو آهي. انهن ٻوٽن ۾ اها صلاحيت هوندي آهي ته اهي پهرين برسات کان پوءِ جهٽ پٽ ڦٽي پوندا آهن. سڪل تارين تي پڻ ڦٽي پوندا آهن ۽ ڪنڊن جي وچ ۾ گل مڪڙيون نروار ٿي پونديون آهن.

برسات کان پوءِ 21 کان 25 ڏينهن اندر اڪثر صحرائي گاهه ٻوٽا گل ۽ ٻج جهلي ويندا آهن ۽ ڇهن کان اٺن هفتن اندر مري ويندا آهن. جيئن ته گهم باقي نه هوندي آهي. انڪري، ڪريل ٻج ٻن يا ٽن سان کان پوءِ جڏهن جڏهن به مينهن پوندا آهن، ٻج ڦٽي پوندا آهن. عام طور تي جانور اهو گاهه چري ويندا آهن. ٻجي ويل گاهه آخري وسڪاري کان پوءِ به مهينا ساڻو رهندو آهي ۽ باقي هڪ مهينو سڪل حالت ۾ بيٺو هوندو آهي. ڪي وڏا ٻوٽا پڻ ڇاڻي يا سڪائي پاڻ کي بچائيندا آهن ۽ ڪن ٻوٽن جو ساڻو ٿڙ انهن جي ڪلوروفل جي ضرورت پوري ڪندو آهي. سوڪهڙي کي منهن ڏيندڙ ٻوٽا هوريا هوريا واڌ ڪندا آهن. ٿورھ ۽ Salvadora ڪوهستان ۾ تمام هوريا وڏا ڪندا آهن. سوڪهڙي خلاف مزاحمت ڪندڙ ٻوٽا يعني ٿورھ وغيره رسداز ۽ گردار آهن ۽ برسات دوران پاڻ ۾ چڱو خاصو پاڻي جمع ڪري ڇڏيندا آهن ۽ سوڪهڙي ۾ بلڪل گهنججي ويندو آهي. وري جيئن ئي برساتون پونديون آهن، اهي جلد پاڻي چوسِي پنهنجي اصل قد بت تي واپس اچي ويندا آهن. ٿورھ ۽ ڪيرول جنسن ۾ اهي وصفون موجود آهن.

اڪثر صحرائي ٻوٽا خشڪ مند ۾ زمين اندر بي واڌ حالت ۾ زمين اندر باقي رهندا آهن ۽ برساتن کان پوءِ پڻ، ٻج ۽ گل ڪڍندا آهن. اڪثر قحرائي وڻن ۽ پٽن جون پاڙون ڊگهيون هونديون آهن. Mesquite جون پاڙون 15 ميٽر هٿ جر تائين هونديون آهن. ٻهر جي پاڙ به ڊگهي جر تائين هوندي آهي. سطحي پاڙن جو نظام ڌرتيءَ تي وڃايل ٿئي ٿو ۽ بنيادي طرح گهم چوسڻ لاءِ هوندو آهي. اهو نظام به ڪامياب آهي ۽ ان تي ٻوٽا سڄو سال زندهه رهي سگهندا آهن.

صحرائي ٻوٽن ۾ بقا لاءِ ٽي صلاحيتون ٿين ٿيون. پهرين اها ته اهي هڪ خاص جاءِ والارين ٿا، ٻيو ته اهي پنهنجي اندر يا ويجهو ئي ٻئي ٻوٽي

کي وڌڻ جو موقعو نه ڏيندا آهن. اهي وسيع علائقو والاري ان ۾ پنهنجيون پاڙون پکيڙيندا آهن. اهي پاڙون به زمين ۾ لڪل ۽ ڍڪيل هونديون آهن، انڪري خشڪ ڪونه ٿين. زمين تي پهتل ٿوري به نمي جهٽ جوسي جمع ڪري ڇڏين ٿيون. انڪري اهي پاڙون جيترو وڌيڪ پکڙيل هونديون، بقا جي اوتري خطري رهندي. ان ريت ٻوٽ ايندڙ برساتن تائين زندهه رهڻ ۾ ڪاميا ب ٿي وڃي ٿو. ڪي ٻوٽا ٻين ٻوٽن کي ماري ڇڏڻ جي اهليت رکندا آهن، انڪري اهي ماحول ۽ مٽيءَ ۾ موجود سڄي نمي ۽ غذائيت پاڻ کڻي وٺندا آهن. بهرحال، ڪن ٻوٽن تي اهو زهر اثر نه ڪندو آهي. بقا جو ٽيون نظام پنهنجي پاءَ زمين ۾ گهڻو هيٺ يعني پاڻيءَ تائين لاهڻ آهي. اهڙي نبات ۾ وڻ، سدا بهار گاه ۽ اهڙيون جنسون شامل آهن جن کي گنديدار پاڙ هوندي آهي. اهي پنهنجي اندر ۾ نمي ۽ غذا جمع ڪندا آهن ۽ زمين جي سطح تي موجود سختين کان بچڻ لاءِ پنهنجا پن، گل ڄاڻي ڇڏيندا آهن ۽ جيئڻ جي سڄي سگهه پاڻ ۾ سموئي ايندڙ برساتن ۽ چڱن ڏينهن جو انتظار ڪندا آهن.

ڪوهستان ۾ ڏيٺ هزار يا ان کان به وڌيڪ قسمن جا وڻ، گاه ، جڙيون ٻوٽيون ۽ گلدار ٻوٽا آهن. انهن ۾ خاص ڪاڇرو يا معاشي اهميت جا وڻ ٻوٽا ڪجهه هن ريت آهن: گيدوڙو يا ليسوڙو (*Cordia myxa*) ليوار (*Rothi*) ديسي پير (*Zizyphus rountifolia*) ، *Salvadora* کبڙ *zyzyphus mummerlia* (*olcoides*)، ڪنول جنهن جا ٻه قسم ٿين ٿا. انهن مان هڪ جي پاڙ ’لوڙهه‘ آهي ۽ ٻئي جي ٻهه. انهن جا ٻيٺ ڏاڍي شوق سان کائبا آهن. ٻيا ميوا گيدوڙا، نموريون، ڏيلها، پيرون، چيڙ، متيرا، ۽ ٻيا جهنگلي ميوا ٿين ٿا. ان کان سواءِ جهنگلي ڀاڄيون جهڙو مريٽو مٽي ۽ ٻيا وکر جامر آهن. ڪاڇي ۾ قدرتي پنگ به ٿيندي هئي، پر هاڻي لڪ چوريءَ پوکي ويندي آهي.

ڪاڇي ڪوهستان ۾ گدرو، هندائو ونگو، ڪڪڙي، توري، ڪريلو، ڪڍو، چٻڙ ڪڍو، ميهو، بصر، ڪپهه، گڙهو، مرج، ڏاٽا، سونف، آهر، جوئر، ٻاجهري، ڪڻڪ به پوکي وڃي ٿي. قدرتي جڙين ٻوٽن ۾ قيش، ڪنوار ٻوٽي، ڪنڊي، پنير، اک، چريو ڌاتورو، ڪانڊيرو لوط ۽ ٻيا اڪچار قسم آهن.

ڪوهستان جي ايراضي:

سنڌ ۾ اڪثر صحرائي علائقا خاص ڪري ٿر ۽ ڪوهستان اڻ سروي آهن، ان ڪري سنڌ ڪوهستان جي ايراضي نيڪ نيڪ معلوم نه آجي. البت هڪ اندازي موجب سنڌ جو ٽاڪرو علائقو؟ (ڪراچي ۽ ٺٽي جي ٽاڪرو حصن سميت) سنڌ جي ڪل ايراضيءَ جو جو لڳ ڀڳ 25 سيڪڙو ٿيندو. کيرٿر ۾ صحرا جو سموريون وصفون آهن. هتي صحرائي موسم، صحرائي ٻوٽا ۽ جانور به آهن: مجموعي طور تي هتي اهي سڀ وصفون آهن، جيڪي ڪنهن به صحرا ۾ ٿي سگهن ٿيون پر هي ڪو مردار صحرا نه آهي. هي پوريءَ طرز زنده صحرا آهي، جنهن ۾ حياتي چرپر ڪري ٿي ۽ زندگيءَ جا سمورا مرحلا طئي ڪري ٿي.

اڪثر ماڻهو سمجهندا آهن ته کيرٿر ۾ اونھاري دوران ٻيو ڪجهه به نه هوندو آهي ۽ پڙيانگ جبلن ۾ ساڙيندڙ اُس، ٺڪ، بي آب ڪڏون ۽ زندگيءَ کان خالي ڏينون هونديون آهن ۽ فقط برسات کان پوءِ ئي صحرا ۾ مختصر وقت لاءِ گل ٻوٽا ٿيندا آهن. اونھاري دوران موتمار سناڻو ضرور محسوس ٿيندو آهي پر اهو هڪ وهر هوندو آهي. هڪ پاسي خشڪ زمين جي پنهنجي سونهن ۽ ڪشش هوندي آهي ته ٻئي پاسي ان ۾ زندگيءَ جي نظر نه ايندڙ چرپر موجود هوندي آهي. ان ماحول ۾ جيت ڪوريٽڙا، وچون، مڇيون، نانگ سها، پليون، ڪوئا ڄمڙا، گدڙ، نگهڙ، لومڙ، پکي وڻ، ٻوٽا ٿين ٿا.

صحرا ۾ زندگيءَ جو بنيادي محور يا حيات بخش هنڌ ڪي خاص قسم جا وڻ ۽ ٻوٽا ٿي ٿين ٿا. جيڪي بي حيات يا غير نامياتي مادي مان ناميات ٺاهيندا آهن. ان عمل ۾ اهي ٻوٽا اُس ۽ هوا مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي استعمال سان خوراڪ ٺاهين ٿا، ۽ پوءِ اتان حياتياتي چڪر شروع ٿي ويندو آهي. وڻ ۽ ٻوٽا جيترا وڌيڪ هوندا، جانور به اوترا گهڻا هوندا ڇو ته خوراڪ جي پنهنجي سائيڪل ٿئي ٿي. جيتن جي اڪثريت نباتات تي پلجي ٿي، جيتن تي ننڍا جانور پلجن ٿا ۽ ننڍن جانورن ۽ پکين تي وڏا جانور پلجندا آهن. هڪڙا جانور گاهه خور ٿين ٿا، ٻيا جيت خور ۽ تيان ڍونڍخور ٿين. جڏهن

مينهن پوندا آهن ۽ نباتات ڦٽي پوندي آهي تڏهن جيتن ۽ جيت خور جانورن جي آبادي تمام وڌي ويندي آهي ۽ ڪجهه عرصي لاءِ صحرائي سناتو ختم ٿي ويندو آهي.

صحرا ۾ اڪثر ٻه مندون هونديون آهن. هڪ مند برسات جي آهي جنهن ۾ گل پڻ، ميوا ۽ بچ جامر هوندا آهن، جن تي ٽنڊڻ، ڏينس، پروانا، پويت ۽ ٻيا جيت خوراڪ لاءِ ايندا آهن ۽ انهن ۾ گهر ناهيندا آهن. انهن جو گذارو ٿي پوئ تي ٿئي ٿو. اهي اتي ئي نسل وڌائيندا ۽ مري ويندا آهن. انهن جا آنا، لارڙا، ڪيت، پيپا ۽ انهن جا مرده جسم پکين، ڪرڙانگن ۽ ننڍن جيت خور مماليائن جو ڪاڇ ٿيندا آهن. انهن سان گڏ آبي جيوت پڻ ٿئي ٿي، جيڪا ڪڏن ۾ ظاهر ٿيندي آهي. جنهن ۾ خاص ڪري ڏيڏر نظر ايندو آهي. ٻي مند سوکھڙو آهي، جنهن ۾ محدود جانور زندهه رهندا آهن.

کيرٿر ۾ اڳي بهتر چراگاهن ۽ وڻڪار جا اهڃاڻ موجود آهن، پر هاڻ ماڻهن جي آبادي واڌ ۽ برساتن ۾ لاٽ سبب خراب اٿي پيو آهي. وڻن جي واڌي ٿيندي رهي آهي، مال جي چاري طور گاهه جو خرچ وڌي ويو آهي. چلهه لاءِ ٻارڻ ۽ گهرن جي اڏاوت لاءِ به وڻن جو استعمال وڌيو آهي. نباتات جي ان لاڳيتي لاٽ ۽ قتل عام سبب جهنگلي حيات به گهڻي قدر گهٽي آهي. بقا جا قدرتي وسيلا گهٽجندا پيا وڃن ۽ ڦر ان جي بحاليءَ جو ڪو پروگرام نظر نٿو اچي.

ڌنارڪي ۽ مالند سماج جي بهتريءَ لاءِ ضروري آهي ته گهريلو مال جي جاري لاءِ ڪي اصول مقرر ڪجن.

صحرائي معشيت:

صحرائي معشيت جو دارومدار زراعت کان وڌيڪ چوپائي مال تي آهي. پر صحرائي ڌنارڪي سماج ۾ به مال پالڻ جي وڌ ۾ وڌ هڪ حد يا گنجائش ٿئي ٿي، ڇو ته ان جو تعلق قدرت جي نظام تي آهي. جيڪڏهن قدرتي چارو ڪافي مقدار ۾ آهي ۽ توازن بگڙجڻ جو خطرو نه آهي ته پوءِ وڌيڪ مال پالي سگهجي ٿو ته قدرتي سگهه سان گڏوگڏ مال جو تعداد به

گهٽجندو ويندو اها صورتحال سڏيءَ طرح زمين جي تباهيءَ ڏانهن وٺي وڃي ٿي، جنهنڪري هوا جي کاڌ ۽ زمين جي زرخيزي متاثر ٿئي ٿي.

ٻوٽو پاڻ کي صحرائي حالتن ۾ ڪيئن ٿو بچائي؟

پلاسٽوسين وقتن ۾ ڌرتيءَ تي موسمي حالتون اڄ کان ڪي گهڻو مختلف ڪونه هيون. ارتقا جي انهن ڏينهن ۾ ٻوٽن پنهنجي بقا لاءِ سخت حالتن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪي طريقا اختيار ڪيا. اهي ڪافي دلچسپ آهن. ٻوٽن جي پٽ هيٺان پوري زمين پوري زمين پاڻي ڇهندي ۽ جذب ڪندي آهي. صحرائي زمين ٻوٽن هيٺان به ٿي ميٽر ڪافي پوري هوندي آهي. اهو پوري ٻوٽي جي پاڙن سان ٺهندو آهي. ريگستان جا اڪثر ٻوٽا تيز ڪنڊيدار هوندا آهن. جنهنڪري اهي پاڻ کي چرڻ کان بچائي وٺندا آهن. ڪن ٻوٽن خاص ڪري ٿوهر جا پن ڪنڊن وانگر هوندا آهن ته جيئن انهن ۾ پاڻي بخار بڻجي ضايع نه ٿئي. ڪي ٻوٽا پنهنجي پاڙ زمين ۾ پري پري تائين (ڪن حالتن ۾ 30 ميٽرن تائين) دائري ۾ پکيڙيندا آهن ته جيئن اهي 11 مهينن جي ڏڪر ۾ بقا جو سامان هٿ ڪري سگهن. ڪن ٻوٽن جو ماڙون زمين جي سطح کي ويجهيون هونديون آهن ته جيئن اهي ماڪ ۽ برساتي پاڻي ڇهي سگهن. ڪوهستان جا جهنگلي ٻوٽا ۽ ڀاڄيون ماڪ ڇهندا آهن. کيرٿر جي چوٽين تي ٿيندڙ گهڻو ڦيٽ، ٿرهارو ۽ وڏن وڻن وغيره جو گذارو ناڪافي برسات تي نٿو ٿئي انڪري ماڪ انهن لاءِ پاڻيءَ جو اهم ذريعو آهي. پنن تي ماڪ جو مقدار روزانو 2 کان 3 ميٽر ٿي سگهي ٿو. پن اها ماڪ ڇهي وٺندا آهن ڪن پنن تي ڪوٺر يا روغن ٿئي ٿو جيڪو پاڻيءَ کي بخار ٿيڻ کان روڪي ٿو ته جيئن ٻوٽو سوڪهڙي کي منهن ڏيئي سگهي. ڪي ٻوٽا سوڪهڙي کي سٺيءَ طرح منهن ڏيئي سگهندا آهن. خاص ڪري جاڳري پير ۽ ٻيهر.

جنرل ايوب خان جي دور ۾ آميرڪي نسل جي هڪ ٻوٽي (جنهن کي سنڌ ۾ ’ڏيو‘ چوندا آهن) جو بچ ٿر ۽ ڪوهستان ۾ ڇڏيو ويو هو. اهو هاڻي ڪافي پکڙجي ويو آهي. ان جو بچ مضبوط خول ۾ ٿئي ٿو جيڪو

سخت گرمي ۽ گهر ۾ تڙڪي ڦٽي پوندو آهي. اهو ٻوٽو ٿر ۽ ڪوهستان ۾ رڌن پڪرين ۽ گڏهن جي ذريعي گهڻو پکڙيو آهي ۽ چٽي واڌ ڪندڙ آهي ڇو ته اهو بچ جانورن جي آندي مان ٿيندو ڦولن ۽ لڏ ذريعي پري پري تائي وڃي ٿو.

انسان صحرا وڌائي ٿو:

زمين جي بيجا ۽ بي حساب استعمال سان زمين جي زرخيزي ختم ٿئي ٿي. اهڙا ڪوڙ مثال آهن جتي اڳي ساوڪ هوندي هئي پر هاڻي ويران ٿي واکا ڪري. انسان جي ڪم علمي، هبچ ۽ لالچ صورتحال کي خراب ڪندي پئي وڃي. سنڌ ڪوهستان ۾ مٺي پاڻيءَ جا زخيرا کي گهڻا ڪونه آهن. تمام گهڻو پاڻي، تمام ٿورو پاڻي يا لوڻيائو پاڻي زمين کي خراب ڪندو آهي. ماڻهو زمين جو ڪارو پاڻي هٿرادو ذريعن سان ڪڍي وڌي پئماني تي آبپاشي ڪن ٿا ۽ زمين جي پيداواري صلاحيت ڏينهن ڏينهن گهٽائين ٿا. ڪن جاين تي زمين جي صلاحيت کان وڌيڪ پوک ڪئي وڃي ٿي. زمين جي پيداواري سگهه کان وڌيڪ مال چاريو وڃي ٿو. مشينن ۽ جانورن جي چرپر ۾ واڌ سبب زمين لتڙ ۾ رهڻ لڳي آهي ۽ نباتات کي ڌڪ لڳو آهي. ماڻهو پنهنجي جياپي لاءِ نباتات کي خرچ نه ڪن ٿا پر ان جي بقا جي اهميت ۽ واڌ جي قدرتي نظام جي اهميت کي اڃا نڪ طرح سمجهي نه سگهيا آهن.

جهنگلي جيوت : جانور پکي ۽ ڪرڙاڻگ

کيرٿر جي دنيا کي عام سمجھ لاءِ سولائيءَ سان ستن ماحولن ۾ ورهائي سگھجي ٿو جن ۾ مختلف جانورن ۽ پکين پنهنجي پنهنجي جيئڻ جو جدا جدا نمونو اختيار ڪيو آهي.

ماحول : 1 ڊگھين جابلو لاهين تي مشتمل آهي ان ماحول جي خاص نباتات ۾ ٻير (Acacia)، ٿوھري ٻوٽا (Euphorbia)، ٻير (Zizyphus)، ڪٻڙ (Salvadora)، جوڪار (Haloxylon) ۽ پوئي (Lemongrass) (Cymbopogon) وغيره شامل آهن. هن ماحول ۾ چڪور، گڏ ۽ چتوشينهن رهي ٿو.

ماحول : 2 ۾ اوجا جبل، اُڀيون لاهيون ۽ جهنڊا شامل آهن. هن ماحول ۾ چوٿين تي سڌا جابلو پٽ، مٽي ڀريل ڌڙ ۽ ٿوڙ ٿين ٿا، جيڪي مضبوط پر خائف جانورن لاءِ بهترين پناه گاهون آهن. هن انتهائي محفوظ ماحول ۾ جتي سرھ پناه وٺن ٿا، اتي پکي به انهن ڌڙن ۾ پنهنجا اکيرا ٺاهين ٿا. هن علائقي ۾ نباتات ڪجھه هن ريت ملي ٿي: ٻير (Acacia)، ڏنڊا ٿوھ ڪيرول، ڏڏيو، ٿوھري ٻوٽا (Euphorbia)، ڳاڙهي (Grewia)، ڊامڻ (Chrysopogon)، پوئي (Cymbopogon)، گُگر (Commiphora)، گوراگو (Seddera).

ماحول : 3 وارين ميدانن ۽ واريءَ جي ڌڙن تي مشتمل آهي ۽ هنن خطن ۾ واري جا ڌڙا اڏامندا رهن ٿا. هتي جي نباتات ۾ خاص طور ديوي (Prosopis)، ٻير (Zizyphus)، ڪٻڙ (Capparis) جا وڻ، ڳاڙهي (Grewia) گوراگو (Seddera)، شانھر (Rhazia) جا ٻوٽا ۽ گاه ۾ پوئي (Cymbopogon)، Ochthochloa Indigofera ۽ ٿوھري ٻوٽا (Euphorbia) شامل آهن ان ماحول ۾ اڪثر جيت، ڪوريٽرا، ڪوٽا، ڪرڙاڻگ، ۽ انهن تي پلجندڙ ٻيا جانور رهن ٿا. هن علائقي ۾ شايد وڏي ۾ وڏو حياتياتي نظام آهي جنهن ۾ ڳجهن جا ٽيئي قسم، عقابن جا ڪيئي قسم، شڪرا، بگا تس، تلوڻ، ٻارنگا، سيسي پت تس، باٽيڻ، ڳيرن جا ٽي قسم، چبرا، چپاڪا، چنڊول، بلبلين، قوسيون، ملهالا،

ميٽر، چٽليون، پوريون، ست رنگا سانڊا، لُنڊيون، ڪاريهر، چنڪارا، ڇاها، ڄمڙا، گُوريت، نور، چيتائي بليون، ڦيڪاري ۽ ٻيا جانور رهن ٿا.

ماحول : 4 پٿريلي ماحول تي مشتمل آهي. هن خطي ۾ اڪثر نباتات هن ريت ٿئي ٿي: ٻيٽر (Acacia)، ٿوهري ٻوٽا (Euphorbia)، گُگر (Commiphora)، جوڪار (Holoxylon)، گوراگو (Seddera)، ڪيٽر (Salvadora) وغيره. هن علائقي ۾ تَنڊڻ، وڇون، چنڊولن جا ڪي قسم، سها، پت تر، لومڙيون ۽ ڪي ٻيا جانور رهن ٿا.

ماحول : 5 ۾ سُڪل ڍوريون ۽ نئين جون ڪنڌيون شامل آهن. هن ماحول ۾ لُٿو، لُٿي (Tamarix)، ديوي (Prosobis)، سڻ ڪانهه (Saccharum) ۽ ڦيش (Nannorrhops) وغيره ٿئي ٿو. هن ماحول ۾ جهنگلي جيوت رهي ٿي، پر اهو خطو اڪثر حالتن ۾ جانورن جي گذر گاه هوندو آهي. اتي باز، گُججهون، چنڊول، ابايل، قوسڙيون، چلومرون، ڄمڙا، ڇاها وغيره رهن ٿا.

ماحول : 6 ۾ ڪيت، نخلستان ۽ آباديون شامل آهن. هي بنيادي طرح انسانن جو ٺاهيل يا انهن جي رهائش وارو علائقو هوندو آهي، جنهن جي ويجهو گدڙ، هاتار، ۽ پڪي رهن ٿا. گدڙ انساني فضلي لاءِ ايندو آهي، هاتار هڏين لاءِ ۽ پڪي گهرن جي چٽين تي فصلن ۾ ۽ باغن تي پناه وٺن ٿا. هتي جهرا، تڪلا، چانهه پڪي، طوطا، ڪاٺ ڪُٽا، هڏ هڏ، ڪوئل، ڪاٺڪڇي، وهيا، بلبل، قوسڙيون، چنڊول، ليلها، هيٽها، ملنگ مٿاه، ملهالا، ڪانءُ، ڄمڙا، جهنگراڙ ٻلا، نورڙا، سيڙه، ڪوئن جا ست اٺ قسم ۽ ٻي جيوت رهي ٿي.

ماحول : 7 آبي ماحول تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ لڳ ڀڳ هر قسم جا آبي پڪي (منچر، حمل، هاليجي، ڪينجهر جي ماحول سميت) مڇيون، مماليه ۽ جلتليا جانور موجود آهن. جبل جي ڪنڀن ۽ چشمن ۾ واڳون ۽ سيسر به ڇڏو ڇڏو موجود آهي.

سنڌ ۾ جهنگلي جيوت هاڻي ڪافي تيزيءَ سان ختم ٿيندي پئي وڃي ڇاڪاڻ ته انهن لاءِ گهريل قدرتي رهائشي ماحول تمام تيزيءَ سان ختم ٿي رهيو آهي. ڪي جانور ته هزارين سال اڳ موجود هئا، هاڻي انهن جو وجود دنيا بچي

تختي تان ميسارجي ويو آهي. انهن مان ئي ڪنهن هڪ اڌ مماله، ڪِرڙانگ وغيره جا پنڊ پهڻ سنڌ مان لڏا ويا آهن. البتہ آبي مخلوق جا پنڊ پهڻ ڪافي تعداد ۾ ۽ گهڻن قسمن جا آهن.

هتي ڪوشش ڪئي وئي آهي تہ ماضي بعيد جي معلوم ۽ ختم ٿي ويل جانورن سان گڏ ويجهي تاريخي دور ۾ سنڌ مان ختم ٿيل جانورن جو بہ ڪجهہ ذڪر ڪجي. هونئن تہ اهڙن جانورن، پکين ۽ نانگن بلائن جي لسٽ ڪافي ڊگهي ٿي سگهي ٿي. پر هتي ڪن اهر جنسن جو ذڪر شامل ڪيو ويو آهي.

ماحول جي بحاليءَ لاءِ ڪجهہ تجويزون

کيرٿر فقط چؤماسي جو جهجٽو ۽ باغ نہ آهي، پر عملي طرح ان جي حياتياتي چڪر ۾ وڏي لات آئي آهي. ڊگهين خشڪ سالين، معمولي برساتن ۽ انسان جي وڌندڙ سرگرميءَ سبب وڻڪار ۽ چراگاهن تي وڏو اثر پيو آهي. ڌنار لوڪ ۾ ٻاڪري ۽ ريڍي مال جي چاري جي پُورت لاءِ وڻ ڇانگين ٿا، جنهن ڪري ان جو بچ ڏيڻ وارو سلسلو ختم ٿي وڃي ٿو ۽ وڻن جي نسل ڪشي ٿئي ٿي. وڻ ڇانگڻ کان پوءِ ان کي ٻيهر ڦوٽهڙي جو موقعو بہ نہ ٿو ڏنو وڃي ۽ ان جي واپسي شروع ٿي وڃي ٿي. خود جبل جو ماڻهو ئي چونڊو ”سُڪل وڻ هو مون منهن ۾ ڪام وڌي تہ ڇا ٿي پيو؟... ادا ٻارڻ لاءِ ڪاٺيون تہ کپن. سُڪل وڻ جون تاريون ڪم آڻيون ٿا، نہ ڪيون تہ ڇا ڪيون؟“ جيستائين انهن ڳوٺاڻن کي تعليم ۽ ضرورتن جو متبادل نہ ٿو ملي، هنن کان ڪنهن بهي جواب جي توقع ڪرڻ اڃائي آهي.

ان ريت جڏهن وڻڪار ختم ٿئي ٿي، زندگيءَ جو ڦٽو خراب ٿيڻ شروع ٿئي ٿو. سڄو حياتياتي چڪر ڊهي ٿو پوي ۽ ان چڪر سان واڳيل سڀ سھاسي موت جي ڪاري چڪر ۾ ڦاسجي وڃن ٿا. موت جو هيءُ خطرناڪ چڪر کيرٿر کي مثل صحرا ۾ تبديل ڪري سگهي ٿو. ان مان نڪرڻ جا ڪي رستا موجود آهن. هيءَ ڪا سولي واٽ ڪونہ آهي پر ڪوپڪو پختو پروگرام ۽ زمينداريءَ جو

احساس هجي ته کيرٿر ۾ حياتياتي چڪر چڱيءَ طرح هتي وٺي يا بحال ٿي سگهي ٿو:

1-تعليم، 2- هٿرادون برساتون (جڏهن جڏهن مندائيتيون برساتون نه پون)، 3- بارڻ ۽ ماڻهن جي ٻين ضرورتن جو متبادل انتظام، 4- پاڻيءَ جي مستقل ۽ غير مستقل ذخيرن جي سنڀال، 5- وڻن جي ڇانگڻ ۽ واڌيءَ تي سخت ڏنڊ، 6- تباهه ٿيل وڻڪاريءَ جي بحالي ۽ جتي جتي ممڪن هجي نئين وڻڪاري، 7- اهڙن وڻن ۽ نت نين جنسن جي پوک جيڪي انتهائي خشڪ حالتن ۾ به زندهه رهن ۽ حياتياتي چڪر برقرار رکي سگهن، 8- ڪوهستان ۾ هنڌ هنڌ ننڍن slow action بندن جي تعمير ته جيئن جڙ ۾ پاڻيءَ جو مقدار بهتر ٿي سگهي، 9- ڌارن لاءِ ميدانن ۾ مال جي چاري جا اصول يا قانون اهي ڪم ڏکيا ضرور آهن، جيڪڏهن ڪو باختيار ادارو اهي ڪم هٿ ۾ کڻي ته کيرٿر موت جي وادي بڻجڻ کان بچي سگهي ٿو بلڪ پنهنجي ’نیشنل پارڪ‘ واري حالت بهتر ڪري سگهي ٿو.

صحرائي علائقن ۾ عام طور انساني معشيت جو بنياد مال تي هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته اتي پوکيءَ لاءِ پاڻي تمام ٿوري مقدار ۾ هوندو آهي. ان ڪري کيرٿر ۾ پاڻيءَ جون مستقل نهرون وهائڻ جو سوچڻ هڪ خوش فهم تجويز ٿي سگهي ٿي ۽ ظاهر آهي ته ايئن ممڪن به نه آهي. البت هتي کير جون نديون وهي سگهن ٿيون. ان ڪري کيرٿر کي مال جي چاري لاءِ چراگاهي دنيا طور ڏسڻو پوندو هتي پاڻيءَ جي مختلف ذخيرن کي بهتر ڪرڻو پوندو ۽ ڏڪر جي ڏينهن ۾ مختلف هنڌن تي چاري جي فراهميءَ جو بندوبست ڪرڻو پوندو آهي ٿي تجويزون ٿر لاءِ به ڏيئي سگهجن ٿيون.

کيرٿر ۾ وڏي آبپاشيءَ جو سوچڻ، وڏي پئماني تي پنيون ڪرڻ يا بجلي/جنريٽر تي ٽيوب ويل هلائڻ تمام خطرناڪ خيال آهن ڇاڪاڻ ته کيرٿر ۾ برساتي پاڻيءَ جي ايتري شرح يا سڀلا آهي ٿي ڪونه هتي وڏي زراعت جي رٿابنديءَ سان صحرائي حالت يا ڏڪر ۾ اڃا به اضافو ٿيندو. اهڙو تجربو ٿر جي ڪارونجهر واسين کي آهي. اُتي به جيستائين برساتي ندين جا مڻهن ٻڌل ڪونه هئا ۽ پاڻي ڏولن يا نار وسيلي ڪڍيو هو. نگرپارڪر ۾ ڪڏهن به ڏڪار نه آيو پر جڏهن

ماڻهن جنريٽرن تي مشينون چاڙهيون ته سڀ کوھ کڻي ويا، ۽ (ڪارونجهر جي ڏکڻ
 ۾) ڪاسبي جو سدا ساڻو پٽ به پاڻيءَ کان سڪي ۽ سڪي ويو.
 ههڄ ماڻهوءَ کي ماري ٿي. ههڄ ئي ڌرتيءَ کي غير پيداواري ماحول ڏانهن
 ڌڪي ٿي. وڌ کان وڌ نفعو وٺڻ جي لالچ ۾ هميشه جي بڪ وٺڻ ڪو سياڻپ جو
 فيصلو ڪونه آهي. اهو ئي حال گڏاپ ۽ ملير جي زمينن جو ٿيو ۽ اهو ئي حال ڪاچي
 ۾ ٿيو. هن وقت ڪن جابلو ماڻهن نئونگ، ڪاٺي، تونگ، گڏاپ، ڪانوڙ، گاج،
 ڪرچات، پوکڻ وغيره ۾ مناسب آبادي ٿئي ٿي، پر انهن زمينن جا مالڪ ايتري
 نفعي مان مطمئن ڪونه آهن. گهڻو ممڪن آهي ته اهي به جلد ئي جر ڪٽائي ڇڏين ۽
 اوسي پاسي ۾ موجود چراگاهن لاءِ گهريل قدرتي زميني نمي به ختم ڪري چراگاه
 ڦٽائي ڇڏين!

ثقافتي سفر

قدیم ثقافتی سفر

سنڌ ۽ سمنڊ جي اڳتي پوئتي ٿيڻ واري رڪارڊ جي روشنيءَ ۾ اٽڪل 12000 سال اڳ سمنڊ اتر سنڌ کان پوئتي هٽڻ لڳو هو. ميسوليٿڪ دور جو ماڻهو ان وقت سنڌوءَ مان مڇي مارڻ، درياھي ٻيلي مان پکي ڦاسائڻ، ۽ ٻيلن ۽ جبلن ۾ شڪار جي ڪم ۾ مصروف هو. ان ريت 12000 سال اڳ جو سنڌي ماڻهو مڪمل شڪاري انسان هو.

اڀڪنڊ ۾ پٿر جو وچون دور 27,000 ق.م. کان 47,000 ق.م. جي وچ ۾ پوي ٿو. سرحد صوبي جي مردان واري علائقي ۾ ”سنگهاڙ غار“، ان دور ۾ غار ۾ رهندڙ انسان جو هن مهل تائين شايد اڪيلو ثبوت آهي. پروفيسر رٽوف پٿر کڏيجي، مول، جرنلو، وٽن واري ۽ ٿڌو نڪين وٽ (ڪراچيءَ جون ملير واريون حدون) پٿر جي دور وارا ماڳ دريافت ڪيا آهن. انهن مان فقط هڪ ماڳ پٿر جي وچين دور جو آهي، جيڪو جهرڪن وٽ آهي.

پٿر جي وچين دور ۾ ان دور جي انسان پنهنجين ضرورتن موجب طور طريقا اختيار ڪيا. شڪار ۽ خوراڪ جمع ڪرڻ جا طريقا بهتر ٿيا ۽ آئنده ڪجهه ڏينهن تائين خوراڪ سنڀالڻ جا طريقا معلوم ڪيا. اهو پٿر جي آخري دور کان مختلف هو. جنهن ۾ شڪار ۽ خوراڪ جمع ڪرڻ جا طريقا وڌيڪ اثرائين هئا ۽ ان ۾ مستقبل جون ضرورتون پوريون ڪرڻ جي صلاحيت (پوريءَ طرح نه سهي) موجود هئي. پاڻيپري معاشي پيداوار ۽ مستقبل لاءِ ذخيرو ڪرڻ جي باقائدي صلاحيت نيوليٿڪ ۽ ڌاتو-پاڻي (Chalcolithic) دور جي ثقافتن جي اُسرڻ کان پوءِ ئي پيدا ٿي.

سنڌ ۾ غارن ۾ رهندڙ انسان ۽ غارن جي کوٽائي يا اڀياس اڃا تائين نه ڪيو ويو آهي، جيڪي اروڙ ۽ ڪوٽڏي جي ٽڪرين ۾، مڪلي (ديھ ڏومائي)، گنجي ٽڪري، رني ڪوٽ ۾، لڪي چشمن وٽ، بزن جهڙو (لڪي جبل) ۽ ڪاٺي ماڻري (ٻڌو جبل) وغيره ۾ موجود آهن. ان جي باوجود اروڙ ۽ ڪوٽڏي جي ٽڪرين مان 1990 واري ڏهاڪي ۾ هڪ اطالوي ٽيم چڱيون دريافتون ڪيون آهن. ٿاڻي ٻولا خان تعلقي ۾ مائڪرو لٽ اوزارن جون چڱيون صنعتي سائون مليون آهن. اڀڪنڊ ۾ پٿر جي وچين دور جو عرصو 27,000 ق.م. کان 47,000 ق.م. (Agarwal & Kusugar) ڪٽيو

ويو آهي. ان جو سنو مثال ڊاڪٽر ڊائي ۽ سنڊس ٽيم جي کوجيل 'سنگهاڙ غار' آهي.

دي تيرا (de terra) پيٽرسن (Patterson) ۽ سنڪاليا (Sankalia) هٿان کوٽائين ۾ جن جانورن جون هڏيون مليون آهن. انهن ۾ پالتو ڪُٽو ٿوڻي ڌار ڏيکي مينهن ٻڪر پالتوڙ، ۽ سوئر کان سواءِ سائين ڦاڙهي چٽيل، سهي سيڙھ ۽ گوڙ جون هڏيون مليون آهن. تقريباً 3700 ق.م ۾ گذر، رڌ، ٻڪر ڏيکي پالتو ڪيا ويا هئا ۽ گهر ڪڇ سڙا يا اوڌڪا ٺاهيا ٿي ويا. ٺڪر سادو ۽ هٿ تي ٺهيل هو.

عقيدن جي ارتقا:

جيئن ته سنڌ جو اڪثر علائقو صحرائي آهي، هتي به سڄي دنيا وانگر اهي جايون اهر ۽ ڪنهن نه ڪنهن حوالي سان اهر ٿي ويون آهن جتي جتي پاڻيءَ جو ڪو مستقل ذريعو موجود آهي. انهيءَ دستيابيءَ سبب ئي قديم وقتن کان انهن واٽن سان مسافريون ٿينديون رهيون آهن. انهن مان ڪن واٽن تي پاڻيءَ جا ذخيرا بهتر ۽ جبل جا پنڌ گهٽ اٿانگا هئڻ سبب انهن کي قديم شاهراهن جي حيثيت ملي. انهن ئي شاهراهن قديم ثقافت ۽ تهذيبن کي هڪ ٻئي سان جوڙيو. اهو سلسلو لڳ ڀڳ 4000 قبل مسيح کان شروع ٿي ويو. سنڌ ۾ ته اهو سلسلو شايد اڃا به اڳ 4000 قبل مسيح کان شروع ٿيو هوندو جڏهن مهر ڳڙھ ثقافت موجود هئي. پر ان کان به اڳ کان جابلو ماڻهن جو دشمن سان واسطو هو. چاڪاڻ ته هو پاڻين جي ويجهن علائقن ۾ رهندا ۽ اڃا اجهائڻ لاءِ ايندڙ جانورن جي شڪار لاءِ ايندا هئا. ان ريت ماڻهوءَ جا پساهه پاڻيءَ سان هئا. ۽ پاڻي پنهنجي اهميت سبب ديوتائي حيثيت ماڻي ويو.

لواڻي سماجن ۾ آبهائڻي ديوتائن جنم ورتو. سنڌ ۾ پاڻي يا پاڻيءَ جي ديوتا جي پوڄا به ان ئي وقت کان هوندي. ساڳئي وقت ڌرتي ماما، ۽ زرخيزيءَ جي ديويءَ جو تصور پڻ پٿر جي دور ۾ اڀريو. گڏوگڏ ڏاند کي به زرخيزيءَ ۽ طاقت جو ديوتا سمجهيو ويو. ۽ ڏاند کي به (گئونءَ کان گهڻو اڳ) ايئن پوڄيو ويو جيئن عراق ۽ مصر ۾ پوڄيو ويو. اهي سڀ فطرت سان لاڳاپيل ديوتا ۽ پنٿ آهن. انڪري اهو

ممڪن آهي ته سنڌو ثقافت جي ابتدائي وقت ۾ يا ان کان به اڳ (3500 قبل مسيح کان به اڳ) سنڌ ۾ پاڻيءَ جي پوڄا رائج هئي. ان کان پوءِ 1650 قبل مسيح ۾ جڏهن موسمي حالتون بدليون ۽ خشڪ مند قائم ٿي، تڏهن پاڻيءَ جي ديوتا جي اهميت ۽ پوءِ اڃا به وڌي وئي هوندي. اهو پنٿ آرين جي آمد تائين خوب رائج هوندو.

موهن جي دڙي جي تهذيب مان لڌل مهرن جو ڪهاڻيون ۽ ديوتا هڪ پڪي پختي فطرت ڏانهن راغب مذهب جي نشاندھي ڪن ٿيون. اهي ديوتا ۽ ديويون بعد ۾ آريائي ديوتائن سان گڏ وڃڻ ٿي 825-1000 قبل مسيح کان نئين صورت وٺي بيٺا ۽ انهن جو نالا ڏنو ۽ ڪالي طور سامهون آيا. وقت سان مقامي ڪارن ديوتائن ۽ ڪارين ديوين کي اڇو آريائي رنگ روپ ۽ نالا ڏنا ويا. اهو اثر اولهه کان آيل تهذيبن سان ميلاپ سبب ٿيو. سنڌ ۾ آرين جي آمد کان اڳ ئي جوڳ تهسپا، جوڳي ديوتا/ديوي، اڌ شينهن— اڌ ماڻهو ۽ جهنگلي سان ماريندڙ ديوي موجود هئي، جنهن کي هاڻي دُرگا جو نالو ڏنو ويو آهي. ان سان گڏ ٻيهر جي وڻ کي به تقدس حاصل هو. ساڳي طرح سواستيڪا جو نشان مهر ڳڙھ مان به مليو آهي. يعني ڀاڳ جو اهو نشان اولهه يا اتر جي اثر کان گهڻو گهڻو اڳ هن خطي ۾ موجود هو.

لڳ ڀڳ 1000 قبل مسيح ۾ جڏهن برهمڻ سماج پوريءَ طرح حاوي ٿي ويو، تڏهن ڳئونءَ جي قوچا کي زور وڌايو ويو. اهڙو اشارو مهاڀارت ڪتا ۾ اُٿل ديوتا ۽ شري ڪرشن جي وچ ۾ هليل تڪرار مان ملي ٿو. جڏهن شري ڪرشن عوام کي اُٿل ديوتا (جنگ جو ديوتا، جنهن جو هٿيار ڪنوڻ آهي) جي پوڄا ڪرڻ بدران ڳئونءَ جي پوڄا ڪرڻ لاءِ چيو. گوشت خوري خاص ڪري ڳئونءَ جو گوشت کائڻ تي پابندي وڌي. ان ريت ڌنارڪو زرعي سماج پوري طاقت سان اڳتي وڌيو ۽ ذات پات جو نظام اڳي کان وڌيڪ گهرو ٿي ويو.

اڳتي هلي، هندستان ۾ برهمڻن جي خلاف جين مت ۽ ٻڌ مت واريون تحريڪون اٿيون، ۽ سنڌ به ٻڌ مت جي رنگ ۾ رڳجي وئي. سنڌ ۾ ٻڌ مت جي گهڻن استوڀائين ۽ وهارن جا کنڊر ۽ ماڳ مليا آهن. جڏهن محمد بن قاسم سنڌ فتح ڪئي، ان وقت سنڌ جو عوامي مذهب ٻڌ مت هو.

سنڌ جو جابلو پاسو 500 قبل مسيح کان 325 قبل مسيح تائين ايران جي زرتشتي مذهب جي اُغر هيٺ رهيو ۽ ڪجهه وقت لاءِ يوناني قابض ٿيا، پر انهن

ڏورانهن، عاضي ۽ خارجي مذهبن سنڌ جي ثقافتي رنگ تي گهڻو اثر نه وڌو (جڏهن سڪندر سنڌ آيو، ان وقت به سنڌو ماڻهيءَ ۾ ٻڌ مت موجود هو).

ثقافتون ۽ تهذيبون:

سنڌ ڪوهستان ۾ ان وقت به انساني سرگرميون هيون، جڏهن سنڌ جا ميدان سمنڊ هيٺ هئا. اها قدرتي ڳالهه آهي ته ان زماني ۾ ماڻهو رولاڪ شڪارين واري سماج جي صورت ۾ کيرتر ۽ ان سان لاڳاپيل ٽڪرين تي رهندا هئا، ۽ برفاني دور کان پوءِ چشمن وٽ ڌارڪو ۽ ابتدائي زرعي سماج ٻڌائون سنڌ يا پرياسي ۾ هن مهل تائين لڌل قديم ترين آبادي مهر ڳڙھ (بولان، سبي) واري آهي، جيڪا لڳ ڀڳ 6000 ق م پراڻي آهي. سنڌ ۾ آمري ثقافت 3500-4000 ق م جي آهي. پر گاجي شاه وٽ واقع ماڙي ڪڙ (پياري جي ماڙي) ماڳ لاءِ ڊاڪٽر لوئس فليمر جو خيال آهي ته اهو 4000 سال اڳ جو ماڳ ٿي سگهي ٿو. اهي جابلو ثقافتون آهن، ميداني سنڌو تهذيب پوءِ جو واقعو آهي. ڪوهستان مان هن مهل تائين ڪوڙ سارا تاريخ کان اڳاٽا ماڳ لڌا ويا آهن، انهن مان ڪن جي فهرست ڪجهه هن ريت آهي:

اوائلِي سنڌو ثقافت ، آمري	3750-3350 قبل مسيح
ڪوٽ ڏيجي	3350-2500 قبل مسيح
هڙپاڻي، سنڌو تهذيب اسريل سنڌو ثقافت	3750-3350 قبل مسيح
موهن جو دڙو	3350-2500 قبل مسيح
جهڪر جو دڙو ، زوال پذير سنڌو ثقافت	1650-1300 قبل مسيح
جهانگر	1300-950 قبل مسيح

انهن ثقافتن جو عالمي طور مڃيل نشانين هن ريت آهن:

A	=	Amrian آمري
H	=	هڙپا يا موهن جو دڙو
PH	=	هڙپا کان پوءِ، جهوڪر ۽ جهانگر
K	=	ڪوٽ ڏيجي

کیرتر پر قدیر ماڳن جي فهرست: 1

ترتيب	ماڳ	بيھڪ	مالي	علاقو
1	احمد شاھ	26°0'45" N 67°24'15" E	ڏکڻ ٻارڻ	ڏکڻ ڪورھستان
2	علي مراد (ڪلڙي)	26°32' N 67°27' E	انگري	کيرتر ڪلڙو
3	اھڙ ڏنڻ نل ٻارا	24°57' N 67°18' E	ملير	ڏکڻ ڪورھستان
4	امبلاڻو	25°0'45" N 67°24'15" E	ملير	ڏکڻ ڪورھستان
5	آمري	25°10' N 68°01' E	سنڌو	سنڌو ڪنارو
6	عرب جو ٿاڻو	25°38' N 67°50' E	ڏکڻ ٻارڻ	ڏکڻ ڪورھستان
7	بھائي	25°32' N 67°50' E	ڏکڻ ٻارڻ	ڏکڻ ڪورھستان
8	آڀڻ، ٻاھڙ	27°19' N 68°01' E	سنڌو	سنڌو ميلان
9	پنٿي	26°12' N 67°42' E	پنٿي	منھڙو جو ڏکڻ
10	پنٿي چقيقي پٿر سائٽ	26°08' N 67°41' E	پنٿي	منھڙو جو ڏکڻ

منهر جو ڏکڻ	بٽئي	2613 'N 6742' E	Bandhri (H)	بٽئي	11
ڏکڻ ڪوھستان	ٻاڻ	2544 'N 6736' E	Bibi ji Bhit (A)	بيبيءَ جي ڀٽ	12
منهر جو ڏکڻ	بٽئي	2645 'N 6743' E	Chauri(H)	چورلر	13
گاڇ	گاڇ	2653 'N 6714' E	Chhuti jo Kund (A)	چٽي جي ڪُنڊ	14
منهر جو ڏکڻ	بٽئي	2617 'N 6740' E	Damb Butthi (Hot springs) (AH)	دڻب ٻٽي	15
(اتر) سنڌو ميلان	سنڌو	2610 'N 6827' E	Deh Mari Sabra (H)	ديھ ماري	16
ڏکڻ ڪوھستان	ڏکڻ ٻاڻ	2510 'N 6752' 52' E	Desoi (Bedi Kotiro) (H)	ڏيسوئي	17
لڪي-ٻيلو	مليري	2604 'N 6747' E	Dhal Butthi (A)	ڏالھ ٻٽي	18
ڏکڻ ڪوھستان	ڏکڻ ٻاڻ	2524'30"N687'3'30"E	Dhillani jo Kot (A)		19
ڏکڻ ڪوھستان	سنڌو مائر	2720'50"N6842'30"E	Diji ji Takri (H)	ڏيجي جي ٽڪري	20
ڏکڻ ڪوھستان	ننگ	2627 'N 6728' E	Ghazi Shah (Hot Spring) (A)	گاجي شاھ	21
ڀٽ، ڪيرٿر	ننگ	2624 'N 6829' E	Gorandi (a) (A)	گوراندِي	22
ڀٽ، ڪيرٿر	ننگ	2621 'N 6840' E	Gorandi (b) (H)	گوراندِي	23
ڏکڻ ڪوھستان	ملير	2500 'N 6719' E	Hasan Ali (AH)	حسن علي	24
ڏکڻ ڪوھستان	ڏکڻ ٻاڻ	2539'15"N6752'30"E	Hothiano Flint Site (H)	هوٿيانر چٽي پٿر ماڳ	25

ڪاڇ	ڪاڇ	26°54' N 67°14' E	Jaro jo Kalat (A)	جالو جي ڦلات	26
ڏکڻ منجهر	منجهر		Jhangar (PH)	جهانگر	27
سنڌو ميلان	سنڌو	27°34' N 68°07' E	Jhukar (PH)	جھڪر	28
اُتر ڪيرٿر، ڪاڇو	گهي ميلان	28°28' N 68°15' E	Judier jo Daro (H)	جھليو جو دارو	29
ڏکڻ ڪوھستان	سڪ	25°46' 50" N 67°40' E	Kachchho Butthi (A)	ڪرچات بٺي	30
منجهي بٺو	ڪاڻي	26°20' N 67°36' E	Kai Butthi (A)	ڪاڻي بٺي	31
ڏکڻ ڪوھستان	سڪ	25°45' N 67°44' E	Karchat (A)	ڪرچات	32
ڏکڻ ڪوھستان	ڏکڻ ٻارڻ	25°42' N 67°47' E	Khajur (A)	ڪجور	33
ڏکڻ ڪوھستان	ٻارڻ	25°42' N 67°38' E	Kohtrash (K)	ڪوھتراش	34
سنڌو ميلان	سنڌو	26°31' N 67°35' E	Lakhiyo (A)	لاکيو	35
منجهر	منجهر	-	Lal Chatto (A)	لال چٽو	36
اُتر ڪيرٿر	ڪينهي	-	Lalan ji Mari (A)	لال جي ماري	37
اُتر ڪيرٿر	گهي ميلان	-	Lime jo Daro (A)	ليمي جو دارو	38
سنڌو ميلان	سنڌو	26°29' N 67°34' E	Lohari (4 miles North Shah Hasan) (A)	لوهري	39
سنڌو ميلان	سنڌو	26°58' N 67°49' E	Lohum jo Daro (H)	لوهرو جو دارو	40
سنڌو ميلان	سنڌو	-	Lundi Butthi (A)	لُنڊي بٺي	41
پت-ٻڌو	ننگ	26°10' 20" N 67°32' 20" E	Lundi Butthi (A)	لُنڊي بٺي	42

ڪروستان	میلری	25°59' N 67°47' E	Mairi Landhi (6 miles south of Dhal). (A)	میلری (A)	43
				لاندی	
پت، بدو	ننگ	-	Mandhi Wahi Butti (A)	منٿي ٺاهي ٻئي	44
سندو ميدان	سندو	27°19' N 68°07' E	Mohen jo Daro (H)	مورن جو دڙو	45
ننگ	ننگ	26°17' N 67°31' E	Naing (Lakhsunir ji Mairi) (A)	لکير جي ماڻي، ننگ	46
سندو ميدان	سندو	27°25' N 68°41' E	Naru Waro Dharo (Kotaras) (H)		47
کيرتر گاج	گاج	26°18' N 67°37' E	Nazgani jo kund (H)	نزگاني جي ڪنڊ	48
ننگ	ننگ	26°18' N 67°31' E	Niaing Gar Jabal (H)	ننگ، گر جبل	49
منجهر بدو	ڪاٺي	26°18' N 67°37' E	Nuka (Naku Butti) (H)	نڪ، ٻئي	50
ڪراچي	لياڻي ڪراچي	-	Orangi (A)	اورنگي	51
ڏکڻ ڪروستان	ڏکڻ ٻاٺ	25°29' N 67°53' E	Odman jo Butti (A)	عثمان جي ٻئي	52
کيرتر گاج	گاج	26°49' 10" N 67°24' 30" E	Pai jo Kotaro (AH)	ٻئي جو ڪوٽيرو	53

کیرتر	تہی	26°40' N 67°22' E	Pandi Wahi (A)	راہی پانڈی	54
ڈکڑ کرہستان	ہاڈ	25°42' N 67°38' E	Phang (Kirihar) (A)	لنگ	55
کراچی	-	-	Pir Mangho (A)	منگھو پیر	56
ڈکڑ کرہستان	سک	25°49' N 67°44' E	Pikran (A)	پوکڑ	57
ڈکڑ کرہستان	سک	25°49' N 67°45' E	Pokhran Landi (A)	پوکڑ لاندی	58
کرہستان	گاج	26°55' N 67°23' E	Rajo Dero (A)	راہو دیرو	59
کیرتر-گاج	گاج	26°55' N 67°18' 30" E	Robel ji Khund (A)	روہیل جی کھنڈ	60
کاہر	ننگی	26°18' 50" N 67°37' 10" E	Sanasi Butti (H)	سانسی بٹی	61
ڈکڑ کرہستان	ڈکڑ ہاڈ	23°40' 10" 67°50' 45" E	Shah jo Kodiro (H)	شاہ جو کوریدو	62
کاہر	انگہی	26°30' N 67°26' E	Tando Rahim Khan (A)	تندیر رحیم	63
ڈکڑ کرہستان	ہاڈ	25°46' N 67°34' E	Taung Butti (AH)	توئنگ بٹی	64
سندر میلان	سندر	-	Tharo Gujo (Hill) (AH)	ٹارو گجو	65
سندر میلان	سندر	-	Ther (H)	ٹیر	66
اٹر کیرتر کاہر	کچی میلان	28°23' N 68°22' E		ٹیڑھی بہادر شاہ	67

کیرتر پر قدیر ماڳن جي فهرست: 2

Abbriyations			
EH	Early Harappan: early 3rd millennium BC	ابتدائي هاريپي دور : 3 هزار سال ق. م	EH
HP	Kulli-Harappan: 2nd half of 3rd millennium BC	کڻي - هاريپي دور : 2 ۽ 3 هزار سال ق. م	HP
Hi	Early historic	آڳاٽو تاريخي دور	Hi
Is	Islamic period	اسلامي دور	Is
L.I.	Late Islamic period	پويون اسلامي دور	L.I.
?	Unknown	نامعلوم دور	?

ترتيب	ماڳ	سنتي	نوعيت	ماڻھو	Longitude	Latitude	بيلارڪ
1	?	؟	گھر	ٻارڻ	26 ° 04' 36 " N	67 ° 26' 68 " E	Is
2	Tiko Waahi	ٽڪو واھي	قلمبيني	ٻارڻ	26 ° 01' 88 " N	67 ° 28' 07 " E	EH Is
3	?		ڏير سوشو	ٻارڻ	25 ° 54' 94 " N	67 ° 30' 82 " E	?
4	Taung Band	ٽوڙگ بند	ڏير سوشو	ٻارڻ	25 ° 47' 92 " N	67 ° 33' 92 " E	?
5	Taung Butti	ٽوڙگ بٽي	بستي	ٻارڻ	25 ° 46' 46 " N	67 ° 33' 07 " E	HP HI
6	Toung Tombs	ٽوڙگ مقبرا	قبرستان	ٻارڻ	25 ° 45' 70 " N	67 ° 34' 00 " E	Is
7	Haji Gul Mohd Goh	حاجي گل محمد گوت	اڏاوتن	ٻارڻ	25 ° 54' 94 " N	67 ° 30' 82 " E	L1
8	Bhulo Chato	ٻلهو چٽو	گھر	ننگ	26 ° 07' 25 " N	67 ° 32' 64 " E	L1
9	Chaika Lakra		گھر	ڪنڊي نٺ	26 ° 06' 55 " N	67 ° 32' 44 " E	Is
10	?		قلمبيني	ننگ	26 ° 01' 12 " N	67 ° 33' 33 " E	EH L1
11	Dhori	ڏوري	عاضي لڪاڻو	ڪنڊي نٺ	26 ° 03' 08 " N	67 ° 33' 61 " E	L1
12	Tigh		?	ننگ	26 ° 06' 59 " N	67 ° 33' 22 " E	? L1

13	?		پیر	?	26 ° 09' 89 " N	67 ° 30' 23" E	? LI
14	Jhano Khan		پیر	?	26 ° 08' 56 " N	67 ° 33' 14" E	?
15	?	شنگ	پیر	شنگ	26 ° 12' 91 " N	67 ° 29' 80" E	? LI
16	Naing Kotiro	شنگ	شنگ	شنگ	26 ° 16' 96 " N	67 ° 30' 72" E	HP HI Is
17	Lakhtimiji Maari	لکھیر جی	شنگ	شنگ	26 ° 17' 51 " N	67 ° 30' 71" E	EH HI LI
18	Lunda a	لنڈی 1	شنگ	شنگ	26 ° 15' 39 " N	67 ° 32' 02" E	Is?
19	Lundi b	لنڈی 2	شنگ	شنگ	26 ° 15' 20 " N	67 ° 32' 02" E	Is?
20	Hajji Jar	شنگ	شنگ	شنگ	26 ° 18' 15 " N	67 ° 32' 18" E	Is
21	Hajji Jar Takri	اٹارٹ	شنگ	شنگ	26 ° 18' 43 " N	67 ° 32' 17" E	LI
22	Kai Buti	کائی بُتی	شنگ	شنگ	26 ° 18' 56 " N	67 ° 33' 89" E	EH HP LI
23	Nuko Buti	نُکو بُتی	شنگ	شنگ	26 ° 19' 85 " N	67 ° 36' 60" E	HP
24	Nuko Band/ B andh ki	نُکو بُند / بند کی	شنگ	شنگ	26 ° 19' 08 " N	67 ° 36' 60" E	HP

25	Damb Buti	دمب بُتي	بستي	چشمه	26 ° 15' 48 " N	67 ° 41' 83" E	HP
26	Sunni		بستي	ننگ	26 ° 16' 13 " N	67 ° 30' 88" E	Hi
27	?		اڙات	لڙي	26 ° 16' 10 " N	67 ° 41' 58" E	?
28	Gourbandi	گوربندي	ڏير	لڙي	26 ° 15' 44 " N	67 ° 40' 94" E	?
29	Piavo Buti	پيلاو بُتي	ڏير	?	26 ° 13' 07 " N	67 ° 42' 74" E	?
30	Chourlo Buti	چوڙلو بُتي	بستي	بڻڻي	26 ° 07' 28 " N	67 ° 44' 48" E	EH LI
31	Barki Buti	پارڪي بُتي	اڙات	بڻڻي	26 ° 06' 54 " N	67 ° 45' 71" E	?
32	Kari Buti	ڪاري بُتي	بستي	بڻڻي	26 ° 12' 50 " N	67 ° 43' 06" E	EH
33	Darya Khan Rind	دريا خان رند	اڙاتين	جھانگرا	26 ° 12' 22 " N	67 ° 42' 22" E	Is LI
34	Dhumra		اڙاتين	انگهي	26 ° 12' 81 " N	67 ° 23' 22" E	?
35	Hizak Nai	هيزڪ نند	اڙاتين	انگهي	26 ° 13' 80 " N	67 ° 22' 75" E	?
36	Dhumri		بستي	انگهي	26 ° 14' 00 " N	67 ° 22' 96" E	Hi ?
37	Sate-Churo	سات چُورو	اڙاتين	انگهي	26 ° 16' 76 " N	67 ° 23' 22" E	LI
38	?		ڏير	ڦورو	26 ° 17' 92 " N	67 ° 22' 22" E	?

39	?		ڏير	انگري	26 ° 20' 15 " N	67 ° 21' 81" E	?
40	?		ڏير، عافى نڪارو	انگري	26 ° 20' 76 " N	67 ° 21' 52" E	?
41	?		?	انگري	26 ° 20' 77 " N	67 ° 22' 29" E	?
42	?		ڏير	انگري	26 ° 03' 66 " N	67 ° 21' 57" E	?
43	?		ڏير	انگري	26 ° 25' 93 " N	67 ° 21' 71" E	?
44	?		اڙت	انگري	26 ° 27' 00 " N	67 ° 22' 00" E	?
45	?		اڙت	انگري	26 ° 27' 08 " N	67 ° 22' 40" E	LI
46	?		ڏير	انگري	26 ° 28' 34 " N	67 ° 23' 21" E	?
47	?		اڙت	انگري	26 ° 28' 77 " N	67 ° 22' 29" E	?
48	?		ڏير	انگري	26 ° 29' 57 " N	67 ° 23' 21" E	?
49	?		اڙت	انگري	26 ° 30' 00 " N	67 ° 25' 50" E	?
50	Tando Rahim Khan	تندو رحيم	بستي	انگري	26 ° 29' 60 " N	67 ° 25' 92" E	EH HP Is
51	Kinri	ڪيرى	ڏير	ڪيرى	26 ° 21' 43 " N	67 ° 33' 05" E	LI

52	Kango Pir	ڪنگو پير	بستي	؟	26 ° 27' 38 " N	67 ° 33' 38" E	L1
53	?		آاڙئي ڪاٺيلڪس	؟	26 ° 25' 73 " N	67 ° 31' 18" E	L1
54	Gaji Shah	گاجي شاھ	بستي	ننگ	26 ° 27' 29 " N	67 ° 27' 83" E	EH HP L1
55	Sohr Dad	شور داد	ڏير	ڦڏڪ	26 ° 24' 88 " N	67 ° 27' 69" E	؟
56	?		ڏير	رامي ڦڏڪ	26 ° 23' 55 " N	67 ° 27' 70" E	؟
57	Lal di Butti	لال جي ٻٽي	بستي	رامي ڦڏڪ	26 ° 23' 37 " N	67 ° 27' 75" E	EH 1s
58	Gaji Shah jo Astan	گاجي شاھ جو آستان	بستي	ننگ	26 ° 21' 45 " N	67 ° 30' 15" E	EH L1
59	Gorandi	گوراندي	بستي	ننگ	26 ° 21' 69 " N	67 ° 29' 53" E	EH L1
60	?		ڦليليندي	چشمو	26 ° 26' 17 " N	67 ° 25' 51" E	EH L1
61	?		ڏير 2 عدد	پير گاجي	26 ° 27' 01 " N	67 ° 26' 26" E	؟
62	?		ڏير	چشمو	26 ° 22' 23 " N	67 ° 28' 26" E	؟
63	?		آاڙت	انگي	26 ° 21' 44 " N	67 ° 31' 08" E	؟
64	?		آاڙت	انگي	26 ° 21' 50 " N	67 ° 31' 50" E	؟

65	Kotino	کوئینو	الائون الائوي	جھلي پنٿي	26 ° 18' 60 " N	67 ° 43' 41 " E	Hi
66	Bardhni	پنٿي	ڪاٻيلڪس ڏير	پنٿي	26 ° 12' 69 " N	67 ° 43' 02 " E	HP
67	?				26 ° 09' 52 " N	67 ° 43' 98 " E	?
68	?		ڏير	ڏاه	26 ° 04' 65 " N	67 ° 46' 01 " E	?
69	Karo Tacki	ڪارو ٽاڪي	بستي	ڏاه	26 ° 04' 50 " N	67 ° 47' 05 " E	Hp Is
70	?		گهر	ڏاه	26 ° 05' 23 " N	67 ° 46' 37 " E	EH
71	Dureji Pir	دريجي پير	ڦيرستان	دريجي	26 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00 " E	Is
72	Colorow		گهر	دريجي	26 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00 " E	LI
73	Hikara	هڪارا	ڏير	دريجي	25 ° 51' 22 " N	67 ° 18' 30 " E	?
74	Doosh	ڏوش	ڊهار	Ubandaro	25 ° 51' 10 " N	67 ° 17' 20 " E	?
75	?		ڦيرن	نمبر 71 راجپوت	25 ° 52' 40 " N	67 ° 17' 30 " E	Is
76	?		الائون	نمبر 71 راجپوت	25 ° 52' 40 " N	67 ° 17' 31 " E	?
77	?		خاڪان ٽائين caims	سليمان جي	25 ° 52' 00 " N	67 ° 20' 15 " E	?

78	?		تیرین	?	25 ° 51' 30 " N	67 ° 20' 20" E	?
79	Sher Goth	شیر گوت	آٹاری کاہلیکس	?	25 ° 49' 45 " N	67 ° 20' 30" E	Is
80	?		عارضی نکاتر	دریعی	25 ° 50' 30 " N	67 ° 17' 00" E	Is
81	Ramzan Goth a	رمضان گوت 1	عارضی نکاتر	حب	25 ° 54' 10 " N	67 ° 17' 00" E	Is
82	Ramzan Goth b	2	برج	دریعی	25 ° 54' 10 " N	67 ° 17' 00" E	LI
83	?		اڈارت	دریعی	25 ° 52' 55 " N	67 ° 19' 62" E	
84	Ayoub Goth Pir	ایوب گوت پیر	مقبرہ	?	25 ° 52' 25 " N	67 ° 20' 16" E	HP LI
85	Ayoub Goth Buti	ایوب گوت بٹی	بستی	?	25 ° 52' 85 " N	67 ° 20' 16" E	HP
86	Ayoub Goth Band	ایوب گوت بند	ڈیر	?	25 ° 52' 85 " N	67 ° 20' 16" E	HP LI
87	Andak Buti	اندک بٹی	بستی	اندک	25 ° 52' 97 " N	67 ° 20' 17" E	HP
88	Andak Band	اندک بند	ڈیر	اندک	25 ° 53' 75 " N	67 ° 21' 38" E	?

89	Buwanvari Band	بھٹ لاري بند	ڏير	بھٹ لاري	25 ° 54' 19 " N	67 ° 20' 79" E	?
90	Tadhro Band	ٿڌڙو بند	ڏير	ٿڌڙو	25 ° 55' 10 " N	67 ° 19' 80" E	?
91	Ira Kiri	عيسيٰ ڪريهي	ڏير	گڙ ڦورو	25 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00" E	?
92	?		ڏير	دريعي ٿير	25 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00" E	?
93	?		ڏير	91 ديجهور	25 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00" E	?
94	Kariya Buti	ڪاريا ٻٽي	بستي	حب	25 ° 55' 20 " N	67 ° 16' 90" E	Eh Hpr Hii
95	Miri Buti	ميري ٻٽي	بستي	حب	25 ° 55' 20 " N	67 ° 17' 25" E	Eh Hs
96	Saindad Band	سائينداد بند	ڏير	حب	25 ° 55' 00 " N	67 ° 15' 30" E	?
97	?		ڏير	حب	25 ° 54' 30 " N	67 ° 16' 05" E	?
98	Kadri-ka Shing Band		ڏير	حب	26 ° 05' 86 " N	67 ° 17' 12" E	?
99	Karim Pir Band	ڪريم پير بند	ڏير	ڪريم ڦورو	26 ° 05' 85 " N	67 ° 17' 57" E	?
100	Bahlol Band	بھلول بند	ڏير	بھلول	26 ° 05' 08 " N	67 ° 19' 51" E	?

101	Kulri Band Talang	کُلری بند تالنگ	دیر	تلنگ	26 ° 03' 91 " N	67 ° 22' 35 " E	?
102	Mauza Ali ji decwar	موضہ علی جی دیوار	دیوار/ دیر	?	26 ° 00' 82 " N	67 ° 17' 37 " E	?
103	Lutra Dhoro Band	لُترا ڈورو بند	دیر	لُترا	26 ° 07' 39 " N	67 ° 18' 32 " E	?
104	?		دیوار	?	26 ° 02' 33 " N	67 ° 17' 63 " E	?
105	Ari Pir	آری پیر	بستی	ساروئا	26 ° 07' 98 " N	67 ° 14' 56 " E	HP
106	Karni Butli	کرنی بٹلی	بستی	بھول	26 ° 05' 77 " N	67 ° 20' 23 " E	HP
107	Kotira Butli	کوئیرد بٹلی	بستی	حب	26 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00 " E	HP
108	Kotira Musa Butli	کوئیرد موسیٰ بٹلی	بستی	حب	26 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00 " E	HP
109	Kosala Butli	کوسالا بٹلی	آڈرٹی کامپلیکس	حب	26 ° 00' 37 " N	67 ° 15' 71 " E	HP Is
110	Kosala Chasma Butli	کوسالا چشمہ بٹلی	بستی	حب	26 ° 00' 61 " N	67 ° 15' 19 " E	EH
111	Deewana grave yard	دیوانہ قبرستان	مقبرا	حب	26 ° 04' 93 " N	67 ° 17' 68 " E	Is

112	Umaid Ali Bhutani	امید علی پروانی	بستی	حب	26 ° 05' 50 " N	67 ° 15' 36" E	Eh HP
113	?		الاورین	حب	26 ° 02' 18 " N	67 ° 15' 18" E	?
114	?		ڈیر	حب	26 ° 02' 18 " N	67 ° 15' 18" E	?
	Maulvi Nizam Band	مولوی نظامر بندن	ڈیر	حب	26 ° 04' 53 " N	67 ° 14' 76" E	?
116	Maulvi Nizam Band	مولوی نظامر بندن	ڈیر	حب	26 ° 03' 61 " N	67 ° 14' 84" E	?
117	Usman Goth	عثمان گوت	ڈیر	حب	26 ° 02' 73 " N	67 ° 15' 09" E	L1
118	Mauza Ali jo Band	مرض علی جو بندن	ڈیر	حب	26 ° 00' 00 " N	67 ° 16' 40" E	?
119	Ali ji Buti a	علی جی 1 بٹی	بستی	حب	25 ° 59' 30 " N	67 ° 16' 20" E	HP
120	Ali ji b	علی جی 2 بٹی	بستی	حب	25 ° 59' 30 " N	67 ° 16' 20" E	HP
121	Ali ji c	علی جی 3 بٹی	الاورین	حب	25 ° 59' 45 " N	67 ° 16' 23" E	HP

122	Jan Mohd. Baryya	جان محمد باریا	بستی	0	25 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00" E	HP
123	Barag		بستی	حب	26 ° 10' 60 " N	67 ° 15' 70" E	HP
124	?		سواہ	حب	25 ° 54' 54 " N	67 ° 15' 76" E	LI
125	Allu	علی	ڈیر	حب	25 ° 55' 08 " N	67 ° 15' 12" E	?
126	Allu	علی	خاکدان تالپین / ڈیر	حب	25 ° 55' 47 " N	67 ° 14' 03" E	?
127	?		ڈیر	حب	25 ° 56' 31 " N	67 ° 11' 25" E	?
128	Kotiro Butti Talan	کوئیرو بٹی	بستی	تالنگا	26 ° 04' 21 " N	67 ° 21' 54" E	EH
129	?		ڈیر	تالنگا	26 ° 03' 11 " N	67 ° 21' 86" E	?
130	?		ڈیر	تالنگا	26 ° 01' 45 " N	67 ° 21' 22" E	?
131	?		ڈیر	تالنگا	26 ° 01' 97 " N	67 ° 23' 14" E	?
132	?		ڈیر	تالنگا	26 ° 01' 96 " N	67 ° 23' 40" E	?
133	?		ڈیر	بہارل	26 ° 06' 60 " N	67 ° 22' 15" E	?


134	?		ڏير	بھلل	26 ° 06' 98 " N	67 ° 21' 89" E	?
135	?		ڏير	بھلل	26 ° 07' 47 " N	67 ° 22' 29" E	?
136	Khoja Band	خوجہ بند	ڏير	بھلل	26 ° 07' 84 " N	67 ° 23' 18" E	?
137	Kilieri Band	ڪليري بند	ڏير	بھلل	26 ° 08' 39 " N	67 ° 21' 80" E	?
138	Kotiro Jannu Goth	ڪوٽيرو جانو ڳوٺ	بستي	بھلل	26 ° 06' 44 " N	67 ° 20' 88" E	EH
139	Mira Buti	ميرا بٽي	قاضي بٽي	بھلل	26 ° 05' 06 " N	67 ° 17' 23" E	HI
140	Karri Pir	ڪرڙ پير	گهوڙا	بھلل	26 ° 05' 29 " N	67 ° 17' 26" E	Is
141	?		ڏير	بھلل	26 ° 05' 50 " N	67 ° 16' 50" E	?
142	Badshah Buti	بادشاه بٽي	بستي	بھلل	26 ° 05' 20 " N	67 ° 16' 94" E	?
143	Rahmatullah Goth	رحمت الله ڳوٺ	بستي	حب	26 ° 04' 63 " N	67 ° 16' 60" E	HP
144	?		ڏير	حب	26 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00" E	?
145	Lanibad	لانيب آباد	بستي	حب	26 ° 04' 19 " N	67 ° 16' 43" E	HI ?
146	?		ڏير 2 عدد	لاني	26 ° 06' 90 " N	67 ° 18' 44 " E	?

147	Loi	لوئي	آزارت	لوئي	26 ° 06' 90 " N	67 ° 18' 27" E	EH
		لوئي بندر عداد	ذير 2 عدد	لوئي	26 ° 07' 39 " N	67 ° 18' 39" E	?
148	?						
149	Mewa	ميوا بند	ذير	لوئي	26 ° 09' 53 " N	67 ° 18' 44" E	?
150	?		ذير	لوئي	26 ° 10' 89 " N	67 ° 18' 16" E	?
151	?		قلمبينيدي	لوئي	26 ° 10' 84 " N	67 ° 17' 51" E	Is
152	Shahu Buti	شاهو بئي	بستي	لوئي	26 ° 10' 79 " N	67 ° 17' 38" E	EH
153	Toori Band	توري بند	ذير / آزارت	لوئي	26 ° 11' 36 " N	67 ° 17' 06" E	?
154	Toori Buti b,c	توري بئي	بستي	لوئي	26 ° 11' 33 " N	67 ° 16' 97" E	EH Hp
155	Khudadad	خدا داد	بستي	لوئي	26 ° 14' 51 " N	67 ° 16' 40" E	Hp
		لائين نمبرو	بستي				
156	line -9 Buti	بئي		لوئي	26 ° 15' 52 " N	67 ° 15' 55" E	HP
157	Kuniani Buti	کني بئي	بستي	حب	26 ° 03' 82 " N	67 ° 17' 09" E	EH HP
158	Kuniani b	کني بئي	آزارت	حب	26 ° 03' 83 " N	67 ° 17' 20" E	Is



159	Ahmed Band	احمد بند	ڏير	ساروئا	26 ° 12' 00 " N	67 ° 05' 90" E	?
160	Pir Munagath Buti	پير مناگاڙھ	بستي	ساروئا	26 ° 10' 73 " N	67 ° 08' 64" E	HP
161	Pir Munagath Band	پير مناگاڙھ بند	ڏير	ساروئا	26 ° 10' 80 " N	67 ° 08' 60" E	?
162	Kasoto Band	کاسوٽو بند	ڏير	ساروئا	26 ° 09' 84 " N	67 ° 10' 42" E	?
163	Kasato Qila	کاسوٽو قلعو	بستي	ساروئا	26 ° 10' 20 " N	67 ° 10' 00" E	HP
164	Sanghat Buti	سنگھي بٺي	بستي	ساروئا	26 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00" E	HP
165	Dado Goth Phair	دادو ڳوٺ ڦير	بستي	ساروئا	26 ° 20' 04 " N	67 ° 02' 36" E	EH
166	Ravithi Ufreycup		بستي	ساروئا	26 ° 21' 82 " N	67 ° 01' 45" E	HP
167	Landani	لنڊاني	بستي	ساروئا	26 ° 11' 57 " N	67 ° 10' 34" E	HP
168	Kot Gourband	کوٽ گوربند	ڏير	ساروئا	26 ° 11' 49 " N	67 ° 09' 93" E	?
169	Lait Buti.	لت بٺي	بستي	ساروئا	26 ° 14' 99 " N	67 ° 04' 81" E	EH
170	Miri-ka Band	ميريءَ جو بند	ڏير	ساروئا	26 ° 14' 99 " N	67 ° 03' 99" E	?
171	Siddiq Jamali Goth	سديق جمالي بند	بستي	ساروئا	26 ° 00' 00 " N	67 ° 00' 00" E	HP
172	Munagath Buti	مناگاڙھ بٺي	قلعي بٺي	ساروئا	26 ° 10' 82 " N	67 ° 08' 99" E	EH


ڪيرٿر جي جهنگلي جیوت


مماليہ


	سَرِہ Sindh Ibex / <i>Capra aegagrus</i> /	1.
	گُڊُ Urial, Asian Wild Sheep / <i>Ovis vignei</i> /	2.
	هَرڻ، چنڪارو غزال Chinkara Gazelle / <i>Gazella gazella</i> /	3.
	ڦاڙهو Hog Deer or Para / <i>Axis porcinus</i> / (ڦاڙهو درياھي ٻيلن جو جانور آھي، ان جو کير نرسان تعلق نہ آھي)	4.

	5. کارپل، کارو هرڻ / <i>Black Buck / Antelope cervicapra</i> (نوٽ: هي هرڻ کيرٽر ۾ نٿو رهي، ان جي ميداني چراگاهه آهي، خيرپور طرف نجي رڪن ۾ محفوظ آهي)	5.
	6. سهو صحرائي يا ميداني <i>Desert Hare</i> / <i>Lepus nigricollis dayanus</i> /	6.
	7. سيهڙ، جابلو سهو <i>Cape Har</i> / <i>Lepus capensis</i> /	7.



	8. سوئر، مرون، خنزیر Indian Wild Bor / <i>Sus scrofa</i> /
	9. چتو شینهن Leopard / <i>Panthera pardus</i> /
	10. فیکاری، هرول، سیاہ گوش Carcal / <i>felis caracal</i> /
	11. جھنگوار (صحرائی) بلو Wild Deserd Cat / <i>Felis silvestris</i> /



	Jungle Cat / جھنگراڑ ہلو <i>Felis chaus</i> /	12.
	پٹا پٹی ہاتار، چراخ Stripped Hyena / <i>Hyaena Hyaena</i> /	13.
	گڈڑ Golden Jackal / <i>Canis aureus</i> /	14.


	ناہر بگھڑ Indian Desert (Or Gray wolf) / <i>Canis lupus</i> /	15.
	لومڑ (کاري بُچ وارو) Indian (or Bengal fox) / <i>Vulpes bengalensis</i> /	16.
	صحرائي لومڑ (اچي پچڑي وارو) Desert fox (Red fox) / <i>Vulpes vulpes</i> /	17.


	Honey گوریت Badger (Ratel) / <i>Mellivora</i> <i>capensis</i> /	18.
	چلیرو چلو مرون. Pangolin or چلو Scaly Anteater / <i>Manis</i> <i>Crassicaudata</i> /	19.
	سیڑھ Porcupine / <i>Hystrix</i> <i>indica</i> /	20.

	Indian نر Gray Mongoose / <i>Herpestes</i> <i>edwardsi</i> /	21.
	Palm نریشو Squirrel / <i>Funambulus</i> <i>pennanti</i> /	22.
	بیپاھو چاھو (دگھن کنن وارو) Indian Desert Hedgehog / <i>Hemiechinus collaris</i> /	23.

	ہیپاھن، چاھو (ہیدو Indian or Pale Hedghog / <i>Paracchinus micropus</i> /	24.
	کوٹو (بجر بیج وارو ناسی) Mouse-like Hamster / <i>Calomyscus hotsoni</i> /	25.
	کوٹو (مصر جو کنڈر) Cairo Spiny Mouse / <i>Acomys</i> <i>cahirinus</i> /	26.
	کوٹو (خاکی صحرائی) Balochistan Gerbil / <i>Gerbillus nanus</i> /	27.



	Soft-furred Field Rat / <i>Millardia meltda</i> / کوئو (گھرو سرماني)	28.
	Sand — coloured Rat / <i>Millaradia</i> <i>gleadowi</i> / کوئو (ويتيلو هيديو)	29.
	کوئو (هيديو ناسي جيريل) Indian Gerbil / <i>Tatera</i> <i>indica</i> /	30.
 	House (گھريلو) Mouse / <i>Mus</i> <i>musculus</i> /	31.
	House Rat / / <i>Rattus rattus</i> کوئو (گھريلو)	32.
	Little Field Mouse / <i>Mus</i> <i>booduga</i> / کئئي (ننڍي ميداني)	33.
	Bush Rat / <i>Golunda elliot</i> / کوئو (پوڏائي)	34.

	35. چمڑو وڈو میوی خور اڈامندڑ لومڑی Indian Flyngfox <i>/ Pteropus giganteus /</i>	35.
	36. چمڑو (ترشولی پن- ٹکو) Trident leaf-nosed Bat <i>/ Asellia tridens /</i>	36.
	37. چمڑو (نڈیو کھلی) Kuhl's Pipstrelle <i>/ Pipistrellus kuhlii /</i>	37.

چمڙو (وڏن ڪٽن وارو ناسي) / <i>Pipistrellus tenuise</i> / Least Pipistrell	38.
چمڙو (عام هيڊر) / <i>Scotophilus heathii</i> / Common Yellow-bellied Bat چمڙن جا ڪي ٻيا قسم سنڌ ۽ کيرتر ۾ چمڙي جا ڪي ٻيا به قسم آهن Mouse-tailed Bats (Rhinopomatidae) ان کان سواءِ ڪجهه ٻيا ميوڙي خور چمڙا به آهن مثال طور: Egyptian Fruit Bat / <i>Rousettus egyptiacus</i> / يا Fulvous Fruit Bat / <i>Rousettus leschen aultii</i> / جن جا دونائو به ڪٽي جهڙا ٿيندا آهن. هڪ ٻيو قسم 'ننڍڙو ميوڙي خور چمڙو' / <i>Cynopterus</i> / Short-nosed Fruit Bat <i>sphinx</i> / نٽي ضلعي ۾ ڏٺو ويو آهي. هڪ قسم 'ننڍو گهڙيلو چمڙو' / <i>Scotophilus heathii</i> / Lesser House Bat آهي جيڪو سڄي سنڌ ۾ ٿئي ٿو	39.
لڏڙو / <i>lutra perspicillata</i> / Smooth-coated Otter  (هي منڇر ڪينجهر ۽ ڪاڇي جي ٻنڊن جو جانور آهي)	40.
 Indus blind Dolphin / <i>Platanista gangetica minor</i> / بلهن (درياهي جانور آهي. ان جو کيرتر سان ڪو به واسطو نه آهي)	41

نابود ٿيل مماليہ

ڊائنوتيريم (Deinotherium) 	1
هائي <i>Elephas maximus</i> 	2
 واگھ <i>Panthera tigris</i> شينهن	3

	4
	5
 © Brent Huffman www.ultimateingate.com	6
	7



کارو شينهن
Panthera pardus.
Black panther



رچ، مڙ
Ursus thibetanus


Rhinoceros
Unicornis
گيندو

رجه
(*Bosclaphus*
tragocamelus)

کرڑاڻگ


1. تلیھ پدم، کاریھ واسینگ / Indian Cobra / <i>Naja naja</i> / 	
2. تلیھ پدم - Spectacled or Binocettale Cobra / <i>Naja naja</i> / 	

سنگچوڑ، سَکچور، کلمار، بتائیں، کرٹ Krait / <i>Bungarus caeruleus</i> / Krait / <i>Bungarus sindanus</i>/ پیٹھ 	3.
ڈامٹھ، نوڑ، وٹیس / <i>Ptyas mucosus</i>/ Dhaman; Common Ratsnake / 	4.


Brahminy Blind Snake / <i>Ramphotyphlops braminus</i> / سانپڑو 	5.
Python / <i>Python moulurus</i> / ارڙو، اجگر، ازدها 	6.

Indian Sand Boa / *Eryx johnii* / بہ منہین


.7


Rough-Scaled Sand Boa / *Gongylophis conicus* / گرنڈ، میتیائی



.8



Royal snake / <i>Spalerosophis arcnarius</i>/ کورائ (سونھري) 	9.
Royal snake / <i>Spalerosophis schirrazianus</i>/ شیرازیانس کورائ	10.
Royal snake/ <i>Spalerosophis diadema</i>/ کوڈن کورائ 	11.

Royal snake لوہاری، کنہاری، جھنڈکراڑ / <i>Spalerosophis articeps</i> / 	.12
Banded Racer / <i>Argyrogena fasciolata</i> / آرگائیروچینا فیسولیٹس 	.13

لاہیکودان استرائٹس Golden Spotted Wolf snake / <i>Lycodon striatus</i> / 	.14
لاہیکودان ترٹونکوریٹس Travancore Wolf snake / <i>Lycodon travancoricus</i> / 	.15
لاہیکودان اولیٹس Common Wolf snake / <i>Lycodon aulicus</i> / 	.16

لائٹورینکس رچوائی / <i>Lytorhynchus ridgewayi</i> . 	17.
لائٹورینکس پیراڈاکس / <i>Lytorhynchus paradoxus</i> 	18.
ہلی، بوئيجا ٹرائیوگونانا Common Indian Cat Snake / <i>Boiga</i> <i>trigonata</i> / 	19.

Streaked Kukuri Snake / *Oligodon taeniolatus* / کُکُری ٹینیرلٹس

20





Oligodon arnesis / پتا پتی کُکُری

/ Common Kukri Snake, Bended Kukuri Snake


21



	22
	23 تیس
	24 سرنکھ، تانکھ / / <i>Psammophis</i> <i>condanarus</i> Indochinese Sand Snake

Sand snake / *Psammophis schokari* / گھوڑیال

Sand snake / *Psammophis leithii* / سیکھی، سرنکھ، تانکھ



.25


جوزیل. تیر سیگھی، سرنگھ، تانگھ / / Sand snake


Psammophis lineolatus

پرنانگ: Glossy-bellied Racer, Hardwicke's Rat Snake

/Coluber ventromaculatus /

.26






.27

سرنگھ، پرنانگ / *Coluber Platyiceps rhodorhachis* /

کارو س، آئرنس برسیکا / *Eirenis persica* / Dark Headed Dwarf


.28

Racer




پائی، واتزیو / *Xenochrophis sanctijohannis* / St. John's Keelback

.29

Painted Keelback / <i>Xenochrophis</i> گوراه، پائی، واتری، چنور <i>ccrasogaster</i> /	30.
Chequered Keelback / <i>Xenochrophis piscator</i> / گوراه چوکویدار	31.
	
Buff-Striped Keelback / <i>Amphipsma stolata</i> / سیٹا جی لت 	32.

.33



انڈو ہینٹر

اینہائڈرس

پاکستانیکا

Smooth water

Snake /


*Enhydris**Pakistanica* /

.34

Saw-scaled / *Echis carinatus* / کیر

35

Russells Viper, Daboia russelii / Vipera russelii/ کوزیاری لنڊي




36

سگر لنڊي

Horned viper / Pseudocerastes persicus/





.37

Leaf-nosed Viper, MacMahon's viper /*Eristicophis* / کورکٽب
macmahoi

Whitehead Black lizard /*Laudakia fusca* / کارو کرٽون

.38



Indian Fringe-fingered Lizard, /<i>Acanthodactylus cantoris</i> / گلوئی 	39.
 Brilliant نیرو کوٹون Agama / <i>Trapelus</i> <i>agilis pakistanensis</i> 	40.

ساندو ست رنگی. باغبان ساندو / Common Garden Lizard / *Calotes*

.41

versicolor /





مک جتی. ریگ ماهی / Sandfish or Sand-swimmer / *Ophiomorus*

.42

tridactylus /




	43. Fat- کٹھن tailed Gecko or Panther Gecko / <i>Eublepharis</i> <i>macularius</i> /
	44. ساندو / <i>Uromastyx hardwickii</i> /

	Bengal گوم or Indian Monitor Lizard / <i>Varanus</i> <i>bengalensis</i> /	45.
	داگر منگر Indian Muggar Crocodylus / <i>Crocodylus</i> <i>palustris</i> /	46.
	Ganges Gharial / <i>Gavialis gangeticus</i> / گیسٹر	47.

شکاری یا دوندخور


	شکرو Indian Sparrow-hawk / <i>Accipiter Badius</i> /	1.
	White-eyed Buzzard باز (اچ-اکی) / <i>Butastur teesa</i> /	2.
	Long-legged Buzzard باز (جانگھی) / <i>Butco rufinus</i> /	3.
	عقاب کُل جھنگ، قُللر عقاب Greater Spotted Eagle / <i>Aquila clanga</i> /	4.

		5.
	عقاب شهنشامي Imperial Eagle / <i>Aquila Heliaca</i> /	6.
	Bonelli's باز پرمار Eagle / <i>Hieraaetus fasciatus</i> /	7.

	8. باز کارو Booted eagle / <i>Hieraatus pennatus</i> /
	9. باز کوٹا مار، بدوار Common kestrel / <i>Falco tinnunculus</i> /
	10. باز بحري Peregrine Falcon / <i>Falco peregrinus</i> /

عقاب (میدانی روسی) Steppe Eagle / <i>Aquila</i> <i>nipalensis</i> /		11
	باز لغو باز Laggar Falcon / <i>Falco</i> <i>biarmicus</i> /	12
باز چرغ Saker Falcon / <i>Falco cherrug</i> /		13

	14 باز ٿر مڇي، چٽو ڇٽو Red-headed Merlin / <i>Falco chicquera</i> /
باز (ڪوٽا مار) Black-winged or Black-shouldered Kite / <i>Elanus caeruleus</i> /	15 
	16 عقاب پوٽي، مڇي مار، بحري عقاب Osprey / <i>Pandion haliaeetus</i> /

سیرن Black or Indian or Pariah Kite / <i>Milvus migrans</i> /		17
	ہل، گونہ خود Egyptian Vulture (Scavenger) / <i>Neophron percnopterus</i>	18
رج کچھ Cinereous or Black Vulture / <i>Aegyptius Monachus</i> . Vulture/		19
	گچھ خاکی Eurasian Griffon Vulture / <i>Gyps Fulvus</i> /	20

	گجھ (اچی پنی واری) White- backed vulture / <i>Gyps bengalensis</i> /
شاهی چب، گکھ Eagle Owl / <i>Bubo bubo</i> /	22 
	یوریشیائی نندو گکھ (چبرو) Eurasian Scops Owl / <i>Otus scops</i> / 23



چہرہ جفہ، جفل.

کھکھ

Spotted Owlet

/ *Athene brama* /

24

Common Raven / *Corvus corax*؛ کانہ، دودو، صحرائی کانہ

25

کانہ، کانگ

House Crow

/ *Corvus**splendens* /


26




خشکیء جا عام پکي

	1. چکور Chakor / <i>Alectoris chukar</i> /	1.
	2. گتر پردو Gray Partridge - / <i>Francolinus pondicerianus</i> /	2.
	3. کارو تن کارو Black Francolin Partridge / <i>Francolinus francolinus</i> /	3.


	سیسی سنگریس	4.
	گہر قلقلو	5.
پت بتر دگوش	Pin-tailed Sandgrouse / <i>Pterocles alchata</i>	6.
	ہانیپر	7.

	پونتریو 8. Common Quail / <i>Coturnix coturnix</i> /
	سیسی تتر 9. See -see Partridge / <i>Ammoperdix griseogularis</i> /
	مور 10. Common Peafowl, Peacock / <i>Pavo cristatus</i> /


	Indian Red Jungle fowl / کُکُڑو <i>Gallus gallus</i> /	.11
	/ <i>Chlamydotis undulata</i> / تلخوڙ Houbara Bustard	.12
	پارپھل Blue Rock Pigeon / <i>Columba livia</i> /	.13

	14. گاني گيرد Collared Dove Or (Indian Ring Dove) / <i>Streptopelia</i> <i>decaocto</i> /
	15. گرت، گارهي گاني گيري Red Turtle dove <i>/streptopelia tranquebarica/</i>
	16. طوطن گيري Little Brown Dove <i>/ Streptopelia</i> <i>senegalensis</i> /


	17. بارنگو اسکو Indian Courser / <i>Cursorius</i> <i>coromandelicus</i> /
	18. کبر / <i>Acridotheres tristis</i> / Common Myna
	19. کبر نندی / <i>Acridotheres ginginianus</i> / Bank myna

Coucal / مہوکا / ٹکھہ <i>Centropus sinensis</i> /		20
	بابیہں تازو مینہل کونکر بکی Pied Crested Cuckoo / <i>Clamator jacobinus</i> /	21
		22

Koel / *Eudynamys scolopaceus* / کوئل

	23. Sindh Pied Woodpecker / <i>Dendrocopos assimilis</i> / کان کُتر
هڏ هڏ Hoopec / <i>Upupa epops</i> /	 24.
	25. جنڊل (ڪاري گچي واري) Blackthroated Thrush / <i>Turdus ruficollis atrogularis</i> /

	جنجل (نیرو) Blue Rock Thrush / <i>Monticola solitarius</i> /	26
	چندول هدھدي Hoopoe Lark / <i>Alacmon alaudipes</i> /	27
	بلبل (قاريلي) Red-vented Bulbul / <i>Pycnonotus cafer</i> /	28

	29. بربل، بربل اچي گل واري بلبل White-checked Bulbul / <i>Pycnonotus Leucogenys</i> /
نڌي صحرائي Desert Wheatear / <i>Oenanthe deserti</i> /	30. 
	31. مڙيس (عامر) چنڊول Eurasian or Common Sky lark / <i>Alauda arvensis</i> /
چنڊول (گاڙھ ڪنڀي) Red-Winged Bushlark / <i>Mirafra erythroptera</i> /	32. 


Sindh or Syke's Nightjar / <i>Caprimulgus mahrattensis</i> (ڊيسي) ڇاپاڪو 	33.
Eurasian Nightjar / <i>Caprimulgus europaeus</i> / (يورشيائي) ڇاپاڪو 	34.
Purple Sunbird / <i>Nectarinia asiatica</i> / تيل وهڙو، مڙس سون ڦڏي 	35.

	36. ملهالو (سرزتي پچ وارو) Isabelline Shrike (or Rufous-tailed Shrike) / <i>Lanius</i> <i>isabellinus</i> /
Bay- backed Shrike / <i>Lanius vittatus</i> / ملهالو (ڪاري پٺيء وارو پوڙو)	37. 
	38. پوڙو وڏو (وڏو سرمائي ملهالو) Great Gray Shrike / <i>Lanius excubitor</i> <i>lahtora</i> /

	White- throated Munia / <i>lonchura</i> <i>malabarica</i> /	39
	پُڙي (ڪاري مٿي واري) Black-headed Bunting / <i>Emberiza melanocphala</i> /	40
چنڊول ڪالندرا Calandra Lark / <i>Melanocorypha</i> <i>bimaculata</i> /		41
	قُن ڦڏي Hooded wheatear (Chat) / <i>Oenanthe inonacha</i> /	42

قوسٽي (گاڙهي پٺيءَ واري) Brown Hill / Warbler (or Striated Prinia) / <i>Prinia Criniger</i>	43
	44 صحرائي ٻولير Desert Warbler / <i>Sylvia nana</i> /
پوري جابلو House Bunting / <i>Emberiza striolata</i> /	45 
پوري (سرمائي ڪنڌ واري) Gray-necked Bunting / <i>Emberiza buchanani</i> /	46 

چندولہ (قوتی) Black-crowned Finch Lark <i>Eremopterix nigriceps</i> 	47 
چندول میرانجهو (قوتی) Ashy-crowned 	48  Finch Lark / <i>Eremopterix grisca</i> /
چندول (ایرانی) Persian Short-toed Lark <i>Calandrella rufescens, cineres</i> /	49 

	چندول (تندو سندو صحرائي) Indian or Indus Sand Lark / <i>Clandrella raytel</i> /	50
ابابيل ريگستاني Plain (Indian) Sand Martin / <i>Riparia paludicola</i> /		51
	ابابيل (ميرانجهڙو نندو) Pale Crag Martin / <i>Ptyonoprogne fuligula</i> /	52
ابابيل (گاڙھ منھون نير) Barn or Common Swallow / <i>Hirundo rustica</i> /		53


	چندول نندو Richard's Pipit / <i>Anthus Richardi</i> /	54
	ملھالو (سرمائی) Grey Hypocolius / <i>Hypocolius</i> <i>ampelinus</i> /	55
	چندول (کٹک رنگو یا کٹکائون) Tawny Pipit / <i>Anthus campestris</i> /	56
	چندول (جابلو ناسی) Brown Rock or Long-billed pipit / <i>Anthus Similis</i> /	57



	58. قوسٿي (هندستاني) Lesser Whitethroat / <i>Sylvia curruca</i> /
	59. قوسٿي (يورپي) Common Whitethroat / <i>Sylvia communis</i> /
	60. ٽڪلو (ننڍو) Little Green Bee-eater / <i>Merops orientalis</i> /


	ٺڪلو Blue-checked Bee-eater / <i>Merops Superciliosus</i> /	.61
	چانهه (كشميري نير) / <i>Coracias garrulus</i> / 	.62
	Indian Roller (or Blue Jay) / <i>Coracias</i> چانهه، جاري پکي <i>benghalensis</i> / 	.63

	طوطی کنٹ طوطی چترن، مینو Rose-ringed Parakeet / <i>Psittacula krameri</i> /	.64
	Common Babbler / <i>Turdoides caudatus</i> /	.65 ہیڑھو لیلہو لیلہو
	Large Gray Babbler / <i>Turdoides malcolmi</i> /	.66 ہیڑھو (وڈو سرمائی)


	.67 جھنگلي ھيڙو Jungle Babbler/ <i>Turdoides</i> <i>striatus/</i>
	.68 ڳاڙهي ٿڌي (ڪاري) ڳاڙهي Black Redstart / <i>Phoenicurus</i> <i>ochruros /</i>
چنڊبول (ننڍي چوٽي ۽ وارو) Small sky lark / <i>Alauda gulgula</i> / 	.69



	70. چیهو کارو ابلق قَدِي Pied bush chat / <i>Saxicoloides</i> <i>caprata</i>/
	71. قوسٽي (گاڙھ ٻچي کاري) <i>Indian Robin / Saxicoloides fulicata</i> /
	72. مٽاھ. ملنگ مٽاھ Indian Treepie / <i>Dendrocitta</i> <i>Vagabunda</i>/


	کار کٹیجی Black Drongo/ <i>Dicrurus</i> <i>adsimilis</i> /	.73
	Rosy Pastor (or Starling) / <i>Sturnus roscus</i> / وهیو	.74
	Common Starling / <i>Sturnus vulgaris</i> / تلیس وهیو	.75

	ٻڪ لٽلي Spotte Flycatcher / <i>Muscicapa striata</i> /	76
 	جهرڪ/جهرڪي House sparrow / <i>Passer domesticus</i> /	77
 Common Wood-shrike Ron Saldino	ملھالو (عام وڻ) Common Wood Shrike / <i>Tephrodornis pondiccranus</i> /	78


	79. چیهو (کارو گاڑھو) Small Minivet <i>/ Pericrocotus cinnamomeus /</i>
	80. ھڑیو، جوتیر چنڈول، دولیس، چھرڈ Crested Lark <i>/ Galcrida cristata /</i>
	81. ھوڑیو رڻ- توتی Trumpeter Finch <i>/ Buzanetas githagineus, Rhodopechys githagine /</i>
	82. جھنگ قوسڑی Sindh Brown Chiffchaff <i>/ phylloscopu s collybita /</i>


Blue-headed Yellow Wagtail / (نيري مٿي واري هيڊي) پياري، ڪٽياڻي <i>Motacilla flava beema/</i> 	83.
Gray-headed Yellow Wagtail / (سرمائي مٿي واري هيڊي) پياري، ڪٽياڻي <i>Motacilla flava Thunbergi</i> 	84.
Black-headed Yellow Wagtail / (ڪاري مٿي واري پيلي) پياري، ڪٽياڻي <i>Motacilla flava amelanogrise/</i> 	85.



White-headed Yellow Wagtail / (اچي مٽي واري ٻيلي) / <i>Motacilla flava leucoccephala</i> /	86. ٻياري، کٽياڻي (اچي مٽي واري ٻيلي)
	87. ٻياري، کٽياڻي (ٻيلي مٽي واري ٻيلي) Yellow-headed Wagtail / <i>Motacilla citreola</i> /
	88. ٻياري، سرمائي کٽياڻي / <i>Motacilla cinerea</i> / Gray Wagtail
	89. ٻياري، ڌوبي، گٽي / <i>Motacilla alba</i> / White Wagtail




	Bluethroat / قوسٹی نیل کٹ <i>Luscinia svecica</i> /	90.
	Great Reed Warbler / <i>Acrocephalus stentoreus</i> / چت چر	91.
	baya weaver / <i>ploceus philippinus</i> / 1۔ ہن درزی	92.
	locus manyar / <i>Streaked Weaver</i> / 2۔ ہن درزی	93.


کیرٹر جا جھنگلي حيوت


	1. هنجر Spotbill / <i>Anas</i> <i>pocillorhyncha</i> /	1.
لوهنج منگه. 	2. کنٹین. سرخاب Brahminy Duck / <i>Tadorna</i> <i>ferruginea</i> /	2.
	3. بَرٹو White-eyed Pochard, Ferruginious Duck / <i>Aythya</i> <i>nyroca</i> /	3.

	Bar- قاز- headed Goose / <i>Anser</i> <i>indicus</i> /	4.
	هنج (گرن) Graylag Goose / <i>Anser anser</i> /	5.
	رتبو باتشاه. لال سر Red- crested Pochard / <i>Netta</i> <i>rufina</i> /	6.


Pintail or Northern Pintail / <i>Anas acuta</i> / دگوش کوکڑالی 	7.
	8. / Common کڑو چیکلو Teal / <i>Anas crecca</i>, <i>Querquedula</i>
بوش، بوشی، بشاری، بھس Gadwall بھڑ / <i>Anas</i> <i>strepera</i> /	9. 

 - josef hlasek www.hlasek.com Marmaronetta angustirostris a5292	چوٹی (بدک) Marbled Teal / <i>Marmaronetta</i> <i>a or</i> <i>Anas angustirostris</i> /	10.
	زونهارد / Tufted Duck or Pochard / <i>Aythya</i> <i>fuligula,</i> <i>Nyroca</i> <i>fuligula</i>	11.
		12.
نیرگ، نیرگی بدک / <i>Anas platyrhynchos</i> / Mallard		

	قازھائو Wigeon / <i>Anas Penelope</i> / 13.
Lesser Whistling-duck / <i>Dendrocygna javanica</i> / جیہ 	14.
Nothern Shoveller / <i>Anas clypeata</i> / لنکھو، گھٹس الیبت 	15.

	Greater برتر Scaup/ <i>Aythya marila</i> /	16.
	Garganey گھرنجی / <i>Anas</i> <i>querquedula</i> /	17.
	ٹرهانڈی ٹوراندو / Common Pochard / <i>Aythya</i> <i>ferina</i>, <i>Nyroca ferina</i>	18.

آبی پکی

	1. بیٹ، سولہ پیٹ White or Rosy Pelican / <i>Pelecanus</i> <i>onocrotalus</i>/	1.
	2. ڈالین پیٹ / <i>Pelecanus crispus</i> Dalmation or Gray Pelican / <i>Pelecanus crispus</i> /	2.
	3. کیو / <i>Phalacrocorax fuscicollis</i> Indian Shag / <i>Phalacrocorax fuscicollis</i> /	3.



Great Cormorant / کانھرو وڏو سيلی
Phalacrocorax carbo /

4.

سڀ کانھرو سڀي
کنڀي
ننڍو سيلی

Little Cormorant
/ *Phalacrocorax*
niger /



5.




بکھو اڇو عام بکھو


Cattle Egret
/ *Bubulcus ibis* /

6.

چور پائي Great Bittern / <i>Botaurus stellaris</i> /		7.
	ڪڪي Pond Heron (Paddybird) / <i>Ardcola grayii</i> /	8.
برهاڙو Little Egret / <i>Egretta garzetta</i> /		9.
	ڪڪوٽ، ٽنڊو Black-Crowned Night-Heron / <i>Nycticorax nycticorax</i> /	10.

سانھ روھاکي Grey Heron / <i>Ardea cinerea</i> / 	11.
سانھ چاھ Goliath Heron / <i>Ardea goliath</i> /  	12.
ڪانيرن ڊوڊير Glossy Ibis / <i>Plegadis falcinellus</i> / 	13.

	ڈوئیرو 14. Eurasian Spoonbill / <i>Platalea leucorodia</i> /
صَوَر (رنکي نوڙمي) Painted Stork / <i>Ibis leucocephalaus</i> /	 15.
	صَوَر اچي، حاجي لق لق 16. White Stork / <i>Ciconia</i> <i>ciconia</i> /

	17.
	18.
	19.

Greater Flamingo/ *Phoenicopterus ruber*/ لاکو جاجی

لاکو جاجی ننڍو

Lesser flamingo


/ *phoenicopterus minor* /



ٽيٽيهر (واسڪوٽي)، گل سنگ



Black-winged Stilt



/ *Himantopus*

himantopus/

ٽيٽو لادڙي، ابلق ٽيٽو Pied Avocet/ <i>Recurvirostra avosetta</i> / 	20.
	ٽيٽو ننڍو ڳائي (وارو) Little Ringed Plover / <i>Charadrius</i> <i>dubius</i> /
	ٽيٽو ننڍو Kentish Plover / <i>Charadrius</i> <i>alexandrinus</i> /



تیتھر (گازھی پاپڑیہ واری) Red-wattled Lapwing <i>/Hoplopterus indicus,</i> <i>Vanellus indicus/</i>		23.
	ٽیٽو ننڍو سادو Little Stint <i>/ Calidris</i> <i>minutatus /</i>	24.
	ٽولارو ٽاکرو Dunlin / <i>/ Calidris</i> <i>alpine</i>	25.



ٽيٽو اڇو لموسا Black-tailed Godwit / <i>Limosa limosa</i> /		26.
	ڊومر پکي، لڪڻو پکي Common Snipe / <i>Capella gallinago, Gallinago gallinago</i> /	27.
رڱ نندو، گهٽي Ruff (Reeve) / <i>Philomachus pugnax</i> /		28.

	29. ٽيٽو گيتي (اسناف) Redshank / <i>Tringa tetanuss</i> /
ٽيٽو (اسناف) Marsh Sandpiper / <i>Tringa stagnatilis</i> /	30. 
	31. ٽيٽو (اسناف) Greenshank / <i>Tringa nebularia</i> /
گھنڙي، موڱو اسناف Green Sandpiper / <i>Tringa ochropus</i> /	32. 


گھتشي، عام اسنان Common Sandpiper / <i>Tringa hypoleucos</i> / 	33.
کُرانک، قُليارو، تُوليارو Stone Curlew / <i>Burhinus oediconemus</i> / 	34.

Common Kingfisher / <i>Alcedo atthis</i> / کنگر 	35.
توبو Pied Kingfisher / <i>ceryle rudis</i> / 	36.
	37. مہتن جو کانہ Whitebreasted Kingfisher / <i>Halcyon smyrcsis</i> /

	38. تپو، نندو، تھائو. Little Grebe (Dabchick / <i>Tachybaptus</i> <i>ruficollis</i> /
	39. تپو (وڈو جوتیر)، گرب Great Crested Grebe / <i>Podiceps cristatus</i> /
	40. جھنگ ککڑ Whitebreasted waterhen / <i>Amaurornis phoenicurus</i> /

Common Moorhen / <i>Gallinula Chloropus</i> / کيڻائي 	41.
Purple Gallinule / (Moorhen) / <i>Porphyrio porphyrio</i> / کهنڱ . کونگ 	42.
Pheasant-tailed Jacana / <i>Hydrophasianus chirurgus</i> / بيهري 	43.

	Coot / <i>Fulica atra</i> / آڑی	44.
چاهو، کچر اسنان، Painted چتکمر اسنان Snipe / <i>Rostratula</i> <i>benghalensis</i>/		45.
	کرنج Common Crane / <i>Grus grus</i> /	46.

Collared Pratincole / <i>Glarcola</i> شیخ کینی کنتاتی، گروت، اُتیرڈ pratincola / 	47.
Small Indian or little Pratincole / <i>Glarcola lactea</i> اُتیرڈ ننڊي ننڊي اُتیرڈ / 	48.
Black-headed Gull / <i>Larus ridibundus</i> / جُھڊي کينا 	49.

Herring Gull / <i>Larus argentat</i> / کیناڑی، کینو، ٹوہٹی 	50.
Oystercatcher / <i>Haematopus ostralegus</i> / دویاھ 	51.
Gull-billed Tern / <i>Gelochelidon nilotica</i> / گرو (کینا، جھنب) 	52.

Caspian Tern / <i>Hydroprogne caspia</i>, <i>Sterna caspia</i> / گرو 	53.
Indian River گرو دریاهی کینو، دریاهی گرو Tern / <i>Sterna aurantia</i> / 	54.
Little Tern / <i>Sterna albifrons</i> / ننڍو گرو 	55.
Whiskered Tern / <i>Chlidonias hybridus</i> / گرو	56.

کیرتر جي نباتات

NAME	سنڌي	E. No
<i>Abutilon fruticosum</i>	گھنگي ٻوٽي	164
<i>Abutilon hirtum</i>		165
<i>Abutilon muticum</i>	ڪڙهي	166
<i>Abutilon pakistanicum</i>		167
<i>Acacia jacquemontii</i>	بھري	183
<i>Acacia nilotica</i>	بھر	184
<i>Acacia senegal</i>	ڪور ؟	185
<i>Achyranthes asper</i>	پُٺ ڪنڊا	17
<i>Acrachne racemosa</i>		339
<i>Adiantum capillis veneris.</i>	پرسشيان	422
<i>Aeluropus lagopoides</i>		340
<i>Aerva javanica</i>	ٻوھ	18
<i>Albizia lebbek</i>		186
<i>Alhagi camelorum</i>	سرينھن (وڻ)	202
<i>Amaranthus gracizans</i>	ڪانڊيرو	
<i>Amaranthus viridis</i>		20
<i>Anagallis arvensis.</i>		236
<i>Andrachne aspera</i>	ٺونڀو ڀڳڙا وڻ	140
<i>Anticharis glandulosa</i>		251
<i>Anticharis linearis</i>		252
<i>Anticharis senegalensis</i>	پنڊري	253
<i>Argyrolobium roscum</i>		203
<i>Aristida adscensionis</i>	لُنب	341
<i>Aristida funiculate</i>	لُنب	342
<i>Aristida hystricula</i>	لُنب	343

ڪيرٿر جي نباتات

کیرتر جي نباتات

NAME	سنڌي	E. No
<i>Abutilon fruticosum</i>	گھنگي ٻوٽي	164
<i>Abutilon hirtum</i>		165
<i>Abutilon muticum</i>	ڪڇهي	166
<i>Abutilon pakistanicum</i>		167
<i>Acacia jacquemontii</i>	بھري	183
<i>Acacia nilotica</i>	بھر	184
<i>Acacia senegal</i>	کور ؟	185
<i>Achyranthes asper</i>	پُٽ ڪنڊا	17
<i>Acerachne racemosa</i>		339
<i>Adiantum capillis veneris.</i>	پرسشيان	422
<i>Aeluropus lagopoides</i>		340
<i>Aerva javanica</i>	ٻوھ	18
<i>Albizia lebbek</i>		186
<i>Alhagi camelorum</i>	سرڻهن (وڻ)	202
<i>Amaranthus gracizans</i>	ڪانڊيرو	
<i>Amaranthus viridis</i>		20
<i>Anagallis arvensis.</i>		236
<i>Andrachne aspera</i>	ٺُونڀيس ڀڳڙا ول	140
<i>Anticharis glandulosa</i>		251
<i>Anticharis linearis</i>		252
<i>Anticharis senegalensis</i>	پنڌري	253
<i>Argyrolobium roscum</i>		203
<i>Aristida adscensionis</i>	لُنب	341
<i>Aristida funiculate</i>	لُنب	342
<i>Aristida hystricula</i>	لُنب	343

<i>Aristida mutabilis</i>	لُنب	344
<i>Aristida triticoides</i>	لُنب	345
<i>Aristolochia bracteolata.</i>	ڪناري ول، ايشار مول	29
<i>Arnebia hispidissima</i>	بُجهو ٻُوتي	43
<i>Asparagus dumosus</i>	ستاور، اُتي ڪنڊي	332
<i>Asparagus gharoensis</i>		333
<i>Asparagus racemosus</i>	ستاور، اُتي ڪنڊي	334
<i>Asphodelus tenuifolius</i>	هڏ ڪنڊي	35
<i>Asplenium trichomanes.</i>		
<i>Asthenatherum forskalii</i>		346
<i>Atriplex dimorphostegium</i>		32
<i>Avena fatua</i>	جهنگلي جو	347
<i>Avena sativa</i>		348
<i>Bacopa monnieri</i>	پَتر	254
<i>Barleria acanthoides</i>	ڪنڊن واري	1
<i>Barleria hochstetteri</i>	اڇي گل واري ٻُوتي (سيفل، سفيد گل؟)	2
<i>Barleria prionitis</i>	تراڪوڙ، پيلا بانسا	3
<i>Bauhinia racemosa</i>	اساندو	63
<i>Bergia aestivalis</i>		139
<i>Bergia ammannioides</i>	پاٽر	140
<i>Bidens bipinnata</i>		89
<i>Blainvillca latifolia</i>		90
<i>Blcpharis indica</i>	آست ول، اسد	4
<i>Boerhaavia procumbens</i>	پٿري ٻُوتي	
<i>Boerhaavia rubicunda</i>		105
<i>Brachiaria cruciformis</i>		349
<i>Brachiaria ramosa</i>		

<i>Brachiaria ramosa</i>	351
<i>Bulboschoenus glaucus</i>	بُلرش (ڈیر؟) 311
<i>Cadaba farinose</i>	کورڈ 67
<i>Calligonum polygonoides</i>	قوگ 228
<i>Calotropis procera</i>	اک 30
<i>Campylanthus pungens</i>	سسئي 255
<i>Campylanthus ramosissimus</i>	سسئي 256
<i>Capparis cartilaginea</i>	کونھري، پانھيرو 68
<i>Capparis deciduas</i>	کِرڈ 69
<i>Caralluma edulis</i>	بَت کتالي 31
<i>Caralluma tuberculata</i>	جبل کتالي 32
<i>Cardiospermum helicacabum</i>	ول 249
<i>Cassia holosericca</i>	گھوڑ اول 64
<i>Cassia italica</i>	سنا، صنا، ڈو وں 65
<i>Cassia senna</i>	سنا مکي 66
<i>Celosia argentea</i>	لُر 21
<i>Celtis australis</i>	بَکَر 290
<i>Cenchrus biflorus</i>	دامن، ڈامن، بيجيتي 352
<i>Cenchrus ciliaris</i>	دامن، ڈامن 353
<i>Cenchrus setigerus</i>	دامن، ڈامن 354
<i>Ceropegia bulbosa</i>	وٹ ويڑهي 33
<i>Chascanum marrubifolium</i>	نسئين واري 294
<i>Chenopodium murale</i>	نندي چهل 83
<i>Chloris barbata</i>	355
<i>Chloris virgata</i>	356
<i>Chrozophora tinctoria</i>	141
<i>Chrysopogon aucheri</i>	يتار 257
<i>Chrysopogon aucher</i>	357

<i>Cissus carnosa</i>	ڪُڙوس.	299
<i>Cissus triquetra</i>		300
<i>Cistanche tubulosa</i>	جوڳيٽو	200
<i>Citrus colocynthis.</i>	ٺوھ	129
<i>Cleome ariana</i>		70
<i>Cleome brachycarpa</i>	ڌنار ڪٽوري	71
<i>Cleome dolichostyla</i>		72
<i>Cleome fimbriata</i>		73
<i>Cleome rupicola</i>		74
<i>Cleome scaposa</i>	واھو (Waho)	75
<i>Cleome viscosa</i>		76
<i>Clerodendrum phlomidis</i>	تانڪر	295
<i>Coccinea grandis.</i>	ڪنڊوري	130
<i>Cocculus hirsutus</i>	زاهمر، زامر	181
<i>Cocculus pendulus</i>	زاهمر	182
<i>Cometes surattense.</i>	تپ واري ٻوٽي	158
<i>Commelina albescens</i>	ڪنڇارا	310
<i>Commicarpus boissieri</i>	بنڪ ول	198
<i>Commiphora stocksiana</i>	پئي	61
<i>Commiphora wightii</i>	مگر	62
<i>Convolvulus arvensis</i>		115
<i>Convolvulus glomeratus</i>		116
<i>Convolvulus prostratus</i>	ڍنڍ، ڏنھ ؟	117
<i>Convolvulus rhyniospermus</i>	بوسيري	118
<i>Convolvulus scindicus</i>		119
<i>Convolvulus sp.</i>		121
<i>Convolvulus spinosus</i>	سسئي	120

<i>Conyza canadensis</i>	91
<i>Corallocarpus epigaeus</i>	چیت، چپوتی 131
<i>Corallocarpus schimperii</i>	چیت، چیت 132
<i>Corbichonia decumbens</i>	دائی واری 11
<i>Corchorus aestuans</i> L.	ہندری 282
<i>Corchorus depressus</i>	مندیری 283
<i>Corchorus fascicularis</i>	ہندری 284
<i>Corchorus tridens</i>	ہندری 285
<i>Cordia ghraf</i>	لیار 44
<i>Cressa cretica</i>	کُک 122
<i>Crotalaria burhia</i>	سیر، دزنہو 204
<i>Ctenolepis cerasiformis</i>	چیت 133
<i>Cucumis melo</i>	گولائو 134
<i>Cucumis prophetarum</i>	کرمٹ 135
<i>Cuscuta europaea</i>	آکاس ول، امر بیل 136
<i>Cuscuta reflexa</i>	آکاس ول، امر بیل 137
<i>Cymbopogon caesius</i>	358
<i>Cymbopogon caesius</i>	358
<i>Cymbopogon commutatus</i>	359
<i>Cymbopogon jwarancusa</i>	بوئی 360
<i>Cynodon dactylon</i>	کاہار کبر 361
<i>Cyperus arenarius</i>	312
<i>Cyperus conglomerates</i>	313
<i>Cyperus difformis</i>	314
<i>Cyperus glaber</i>	315
<i>Cyperus laevigatus</i>	316
<i>Cyperus pygmaeus</i>	317
<i>Cyperus rotundus</i>	موٹا، دیلا، چیا (چیہو؟) 318

<i>Dactyloctenium aegyptiacum</i>	سنثوري	362
<i>Dactyloctenium aristatum</i>	سنثوري	363
<i>Dactyloctenium scindicum</i>	گنديير	364
<i>Danthoniopsis stocksii</i>		365
<i>Datura innoxia</i>	ڏاتورو	264
<i>Desmostachya bipinnata</i>	ڊپ	366
<i>Dicanthium annulatum</i>	ڏنھ	367
<i>Dicanthium foveolatum</i>		368
<i>Dicoma tomentosa</i>	برھر ٻوٽي. ڪوين	92
<i>Digera muricata</i>		22
<i>Digitaria ciliaris</i>		369
<i>Digitaria nodosa</i>		370
<i>Digitaria pennata</i>		371
<i>Dipcadi erythracum</i>	جھنگلي بصر	336
<i>Dodonea viscosa</i>	سنا	250
<i>Echinops echinatus</i>	پنگڙا	93
<i>Eclipta alba</i>	ڪانھر	94
<i>Ehretia obtusifolia</i>		45
<i>Eleocharis geniculata</i>		319
<i>Eleusine indica</i>		372
<i>Elionurus royleanus</i>		373
<i>Enicostemma hyssopifolium</i>		151
<i>Enneapogon brachystachyus</i>		374
<i>Enneapogon schimperanus</i>		375
<i>Ephedra ciliata</i>		420
<i>Eragrostis cilianensis</i>		376
<i>Eragrostis ciliaris</i>		377
<i>Eragrostis japonica</i>		378

<i>Eragrostis minor</i>	379
<i>Eriochloa procera</i>	380
<i>Erodium ciconium</i>	152
<i>Erodium oxyrhynchum</i>	153
<i>Euphorbia caducifolia</i>	دندا توهر 142
<i>Euphorbia clarkeana</i>	کیر ول 143
<i>Euphorbia granulata</i>	کیر ول 144
<i>Euphorbia hirta</i>	145
<i>Euphorbia prostrata</i>	146
<i>Evolvulus alsinoides</i>	سنگا پشپی، نیری گل واری 123
<i>Fagonia brugueiri.</i>	کنڊرو داماهو 301
<i>Fagonia indica.</i>	کنڊرو 302
<i>Farsetia jacquemontii</i>	58
<i>Ficus johannis</i>	هنجیر 192
<i>Fimbristylis bisumbellata</i>	320
<i>Fimbristylis dichotoma</i>	321
<i>Fimbristylis sp.</i>	323
<i>Fimbristylis turkestanica</i>	322
<i>Flacourtia indica</i>	150
<i>Flaveria trinervia</i>	95
<i>Fluggea virosa</i>	147
<i>Forskahlia tenacissima</i>	لچکڻو 293
<i>Glinus lotoidesL.</i>	کانوک 189
<i>Glossonema varians</i>	منگا 34
<i>Gossypium stocksii</i>	جهنگلي ڪپهه 168
<i>Grewia damine</i>	اٺ ڳاڙي 286
<i>Grewia optiva</i>	نر ڳاڙي 287
<i>Grewia tenax</i>	ڳاڙي 288

Grewia villosa Willd.	گدڑ باڻي	289
Gynandropsis gynandra.		77
Haloxylon recurvum	جوکار	84
Haloxylon salicornicum		85
Heliotropium bacciferum	خرسن	46
Heliotropium calcaicum	خرسن	47
Heliotropium crispum	خرسن	48
Heliotropium curassavicum	خرسن	49
Heliotropium europaeum.	خرسن	50
Heliotropium ophioglossum	خرسن	51
Heliotropium rariflorum	خرسن	52
Heliotropium strigosum	خرسن	53
Heliotropium subulatum	خرسن	54
Hibiscus aristivalvis		169
Hibiscus micranthus	جهنگ سوياري	170
Hibiscus obtusilobus		171
Hibiscus scindicus		172
Hochstetteria schimperi		96
Hydrilla verticillata		329
Imperata cylindrica		381
Indigofera articulata		205
Indigofera cordifolia	ماهوري	206
Indigofera hochstetteri	پلي، ٽولي پوتي	207
Indigofera linifolia		208
Indigofera oblongifolia	جهل	209
Indigofera sessiliflora		210
Iphiona aucheri		97
Iphiona grantioides		98

<i>Ipomoea eriocarpa</i>	پنور	124
<i>Ipomoea nil</i>	کارو دائو	125
<i>Juncus maritimus</i>	چب	331
<i>Justicia heterocarpa</i>	میخ ول	5
<i>Justicia vahlii</i>	میک ول	6
<i>Kickxia ramosissima</i>		257
<i>Kochia indica</i>		86
<i>Kohautia aspera</i>		244
<i>Kohautia retorsa</i>		245
<i>Lactuca remotiflora.</i>		99
<i>Lantana indica</i>		296
<i>Lasiurus scindicus.</i>	سین	382
<i>Launaca procumbens</i>		100
<i>Launaea resedifolia</i>		101
<i>Launaca sp.</i>		102
<i>Lepidagathis sp.</i>		7
<i>Leptadenia pyrotechnica</i>	مادی کب	35
<i>Leptothrium senegalense</i>		383
<i>Leucas nutans</i>		162
<i>Leucas urticifolia</i>		163
<i>Limeum indicum</i>		12
<i>Linaria sp.</i>		258
<i>Lindenbergia indica</i>		259
<i>Lotus garcinii</i>		211
<i>Lycium edgeworthii</i>	گرانی	265
<i>Lycium ruthenicum</i>	گرانی	266
<i>Macrura arenaria</i>	کور	78
<i>Maytenus senegalensis</i>		81

Melanocenchris abyssinica		384
Melanocenchris jacquemontii		385
Melhanian denhamii		273
Melhanian futteyporensis		274
Melilotus alba	سنجھي	212
Melilotus indica.	سنجھي	213
Merremia acgyptia		126
microphyllum		164
Mimosa hamata	هَجِيَاڙو	187
Mollugo cerviana		190
Mollugo nudicaulis	جھل	191
Monsonia heliotropioides		154
Monsonia nivea		155
Monsonia senegalensis		156
Moringa concanensis	مونا مونا	193
Moringa oleifera.	مونا مونا	194
Myriophyllum spicatum		157
Najas minor		337
Nannorhops ritcheana	پيش، قيش	338
Nasturtium officinale		59
Nerium oleander	گل رنگي، جود	27
Neurada procumbens	ميخ ول، چاهري هوتي	195
Ochradenus baccatus		237
Ochthochloa compressa	گنديں ذنه	386
Ocimum americanum	تخمران، سنگ واري	159
Ocimum basilicum	ناز بوہ	160
Olca ferruginea	کائي کائوہ ؟	199
Oligochaeta ramose		103

<i>Oligomeris linifolia</i>	238
<i>Orobanche aegyptiaca</i>	201
<i>Oropetium thomacum</i>	387
<i>Oxystelma esculenta</i>	ناڑو 36
<i>Panicum antidotale</i>	گھمبول 388
<i>Panicum turgidum</i>	گھمبول، ڈامٹ 389
<i>Paspalidium geminatum</i>	390
<i>Pavonia arabica</i>	ہنجر 173
<i>Pavonia glechomifolia</i>	174
<i>Pavonia grewioides</i>	175
<i>Pavonia procumbens</i>	176
<i>Pavonia zeylanica</i>	177
<i>Peganum harmala</i>	303
<i>Pegolettia senegalensis</i>	104
<i>Pennisetum divisum</i>	چویار 391
<i>Pennisetum orientale</i>	392
<i>Pentanema vestitum</i>	105
<i>Pentatropis spiralis</i>	ناڑو 37
<i>Pergularia daemia</i>	38
<i>Pergularia tomentosa</i>	39
<i>Periploca aphylla</i>	نرکپ 40
<i>Peristrophe paniculata</i>	8
<i>Phalaris minor</i>	پچر 393
<i>Phragmites karka</i> (Retz.)	کانگر، نر، نڑو 394
<i>Phyla nodiflora</i>	ہکن 297
<i>Phyllanthus amarus</i>	
<i>Phyllanthus amarus</i>	148
<i>Phyllanthus reticulatus</i>	149

<i>Physorrhynchus brahuicus</i>	چناکو	60
<i>Pistacia chinensis</i>		24
<i>Pistacia khinjuk</i>	خنجک	25
<i>Plantago ciliata</i>	اسپنگر اسپغول	222
<i>Plantago stocksii</i>		223
<i>Pluchea arguta</i>		106
<i>Pluchea lanceolata</i>		107
<i>Plumbago zeylanica</i>	جترا	224
<i>Polycarpha spicata</i>		79
<i>Polygala abyssinica</i>		225
<i>Polygala eriopetra</i>		226
<i>Polygala irregularis</i>		227
<i>Polygonum plebium</i>		229
<i>Polypogon monspeliensis</i>	پچر	395
<i>Portulaca oleracea</i>	انست، بچري	232
<i>Portulaca quadrifida</i>		233
<i>Potamogeton pectinatus</i>		234
<i>Potamogeton perfoliatus</i>		235
<i>Prosopis cineraria</i>	کندي (وٹ)	188
<i>Psammogeton cabulicus</i>		291
<i>Pseudogailonia hymenostephana</i>		246
<i>Pteropryum aucheri</i>	ویکو	230
<i>Pteropryum olivieri</i>	ویکو	231
<i>Pulicaria angustifolia</i>		109
<i>Pulicaria boissieri</i>	کول میر	108
<i>Pulicaria glaucescens</i>		110
<i>Pupalia lappacea</i>	جچکٹو	23
<i>Pycnocycla aucheriana</i>	سسئي	292

<i>Reseda aucheri</i>	239
<i>Reseda pruinosa</i>	240
<i>Rhamnus persica</i>	241
<i>Rhamnus virgata</i>	242
<i>Rhazia stricta</i>	شانہر، شانہار، سہیئر 28
<i>Rhus mysurensis</i>	26
<i>Rhyncosia minima</i>	تہ پتی 214
<i>Rhyncosia pulverulenta</i>	بوچھو تہ پتی 215
<i>Rivea hypocrateriformis</i>	127
<i>Ruellia jeddahica</i>	کاکوڑی ہوتی 9
<i>Ruellia scindica</i>	مونگلی گوداگو 10
<i>Saccharum benghalensis</i>	سر 396
<i>Saccharum griffithii</i>	سر
<i>Saccharum spontaneum</i>	سر 398
<i>Salsola imbricata</i>	87
<i>Salvadora oleoides</i>	چار 247
<i>Salvadora persica</i>	کبڑ 248
<i>Salvia aegyptiaca</i>	منگھیری 161
<i>Sarcostemma viminalis</i>	کریال، سوما 41
<i>Schoenfeldia gracilis</i>	399
<i>Schoenoplectus littoralis</i>	324
<i>Schoenoplectus lupulinus</i>	325
<i>Schoenoplectus mucronatus</i>	326
<i>Schoenoplectus supinus</i>	327
<i>Schoenoplectus triquetus</i>	328
<i>Schweinfurthia pterosperma</i>	261
<i>Schweinfurthia sphaerocarpa</i>	سنا ہوتی 260
<i>Scrophularia striata</i>	262

Seddera latifolia	گراگر	128
Seetzenia lanata		304
Schima ischaemoides		400
Senra incana		178
Sericostoma pauciflorum		55
Sesuvium susuvioides		13
Setaria pumila		401
Sida alii		179
Sida tiagii		180
Solanum cordatum	اکڑو	267
Solanum forskalii		268
Solanum nigrum	کیچ میچ، مکڑ	269
Solanum surattense	کتاری، ڍیڍی	270
Sonchus asper		111
Sonchus oleraceus L.		112
Spergula fallax.		80
Sporobolus arabicus	کند	402
Sporobolus diander	ڊپ	403
Sporobolus kentrophyllus		404
Sporobolus tourneuxii		405
Stipagrostis hirtigluma		406
Stipagrostis paradisca		407
Stipagrostis uniplumis		408
Striga lutca		263
Suaeda fruticosa		88
Tamarix alii	لئی	275
Tamarix aphylla	لئی	276
Tamarix dioica	لئی	277

<i>Tamarix indica</i>	لئي	278
<i>Tamarix pakistanica</i>	لئي	279
<i>Tamarix salina</i>	لئي	280
<i>Tamarix stricta</i>	لئي	281
<i>Taverniera cuncifolia.</i>	جيٺ مد	216
<i>Tecomella undulata</i>	لوهيرو	42
<i>Tephrosia purpurea</i>	ڦرئي	217
<i>Tephrosia strigosa</i>	ڦرئي	218
<i>Tephrosia subtriflora</i>	ڦرئي، ڦرئي	219
<i>Tephrosia uniflora</i>		220
<i>Tetrapogon tenellus</i>	sager	409
<i>thellungianus</i>		19
<i>Tragus berteronianus</i>		411
<i>Tragus roxburghii</i>		412
<i>Trianthema portulacastrum</i>	واهو	14
<i>Trianthema triquetra</i>		15
<i>Tribulus longipetalus</i>	گوهيند	305
<i>Tribulus pentandrus.</i>	گوهيند	306
<i>Tribulus terrestris</i>	ٽرڪندي، بکڙا	307
<i>Trichodesma africanum.</i>	گهو زبان	56
<i>Trichodesma indicum</i>		57
<i>Tricholaena teneriffae</i>		413
<i>Tridax procumbens</i>		113
<i>Typha domingensis</i>	پن	415
<i>Typha latifolia</i>		417
<i>Typha laxmanii</i>		418
<i>Typha minima</i>		419
<i>Urochondra setulosa</i>		414

Vallisneria spiralis	Eel grass, رایل گاه	330
var. agrestis		135
Vernonia cinerascens	لاسکی	114
Vigna trilobata.	جھنگلی ماش	221
Viola stocksii	ملیرو	298
Withania coagulans	پنیر	271
Withania somnifera	کپوئی	272
Zaleya pentandra		16
Ziziphus nummularia	بیر (جاگری؟)	243
Zygophyllum propinquum	لاٹی	308
Zygophyllum simplex.	لاٹی	309

حوالا:

- EGI Global Database Report- I 00288, Geology of Block 17, Southern Kirthar Mountains.
- Geology of Pakistan, website of Geological Survey of Pakistan.
- Lambrick, H.T. : Sind, a General Introduction.
- Panhwar, M.H: Divisions of Kohistan, Area, Typicality of Desert Environments.
- Panhwar, M.H. Chronological Dictionary of Sindh.
- Panhwar, M.H. 1962, Ground Water in Dadu District.
- Pithawalla, Maneck: A Physical and Geological Geography of Sind.
- Seismicity of Pakistan
- Sorley, Dr. H.T. Gazetteer of Sind: 1968.
- کیرٲر جبل گورک چوٲي : تاج صحرائي
- ذاتي مشاهدا

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:
انڌي ماءُ جڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ٻرندڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪُندڙ، پاڙي، ڪاڻو، ڀاڄوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سَگهجي ٿو، پَر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هِڪَ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻ جي آسَ رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پڻ) ڪا به تنظيم ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو ڪوڙو آهي. نه ئي وري پڻ جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

جهڙيءَ طرح وڻن جا پڻ ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پڻ به مختلف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پڻ ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پڻ جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پڻ پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غير تجارتي non-commercial رهندا. پڻن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پڻن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پڙهندڙ نسل . پڻ The Reading Generation

پَنن کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وَس پٽاندڙ وڌ
 کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليکڪن، ڇپائيندڙن ۽
 ڇاپيندڙن کي همٿائن. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ
 کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رُڪاوٽ کي نه مڃن.
 شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٺ،
 پُڪار سان تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود
 جي مد مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو ته:
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرن ٿا.

... ..

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇپن ٿا،
 ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موتي منجهه پهڙ ڇپن ٿا،

... ..

ڪالهه هُيا جي سُرخ گلن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن؛
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن.....

... ..

هي بيت اُٿي، هي بم- گولو،

جيڪي به ڪٽين، جيڪي به ڪٽين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرق نه آ، هي بيت به بم جو ساٿي آ،

جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چم جو ساٿي آ -

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته

”هاڻي ويڙهه ۽ عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه

وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني آهي.

پَن جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رڳو نصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر ڪڍي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَن نصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ نسل جا پَن سڀني کي **ڇو، ڇا، ۽ ڪيئن** جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَن پَن جو پڙلاءُ.“
- اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)

پڙهندڙ نسل . **پ ن** The Reading Generation